



272



273



274



275



276





272. *Arenaria aggregata* (L.) Loisel. subsp. *aggregata* [*A. tetraquetra* L. subsp. *condensata* Arcang.] | Arenària de coixinet. *Arenaria aglomerada*. *Sabline capitée*. *Sandwort*. PRAT(r,ca). 1800 m. rrr. VII.

273. *Arenaria grandiflora* L. subsp. *grandiflora* | Arenària de flor gran. *Hierba de la piedra*. *Sabline à grandes fleurs*. *Large-flowered sandwort*. PRAT(r,s). 1800-2780 m. cc. VI-VIII.

274. *Arenaria marschlinsii* W.D.J. Koch | -. -. *Sabline de Marschlins*. -. ROC(t). 2420-2780 m. rrr. VI-VII. PRO.

275. *Arenaria serpyllifolia* L. | Arenària. *Arenaria comú*n. *Sabline des murs*. *Thyme-leaved sandwort*. PRAT(a). 1200-2060 m. cc. IV-VI. MED.



276. *Sabulina verna* (L.) Rchb. subsp. *verna* [*Minuartia verna* (L.) Hiern] | Minuàrtia vernal. *Minuarcia de primavera*. *Sabline de printemps*. *Spring sandwort*. PRAT(ac,r). 2160-2770 m. c. VI-VIII.

277. *Cherleria laricifolia* (L.) Iamónico subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) A.J. Moore & Dillenb. [*Minuartia laricifolia* (L.) Schinz subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) Mattf.] | Herba d'en Minuart. -. *Alsine de Diomède*. *Larch-leaf sandwort*. ROC(r)/PRAT(r). 1240-2230 m. c. VII-IX.



278. *Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. | Minuàrtia recurvada. *Minuartia arqueada*. *Minuartie recourbée*. *Sickle leaved sandwort*. PRAT(si). 1500-2680 m. cc. VI-VIII.

279. *Cherleria sedoides* L. [*Minuartia sedoides* (L.) Hiern] | Herba de la penya. -. *Minuartie faux orpin*. *Ciphel*. PRAT(ac). 2230-2780 m. c. VII-VIII.







*Cariofil·làcies: 280-284*

280. *Cerastium alpinum* L. | Cerasti alpi.  
Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des  
Alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s,r). 1800-2800  
m. cc. VI-VIII.

281. *Cerastium arvense* L. | Cerasti de fulla  
estreta. Oreja de ratón. Céraiste des champs.  
Field chickweed. PRAT/MAT (ac). 1400-2200 m.  
cc. VI-VII.

282. *Cerastium fontanum* subsp. *vulgare*  
(Hartm.) Greuter & Burdet [*Cerastium fontanum*  
subsp. *triviale* (E.H.L.Krause) Jalas] | Cerasti de  
Font. -. Céraiste commun. Common mouse-ear.  
PRAT(h)/AQUA(j). 1220-2000 m. cc. VI-VII.

283. *Cerastium glomeratum* Thuill. |  
Pelovella. -. Céraiste aggloméré. Sticky mouse-  
ear. PRAT(a). 1240 m. rrr. III.

284. *Cerastium pyrenaicum* J. Gay | Cerasti  
pirinenc. -. Céraiste des Pyrénées. Pyrenean  
mouse-ear. ROC(t). 2400-2700 m. r. VII-VIII.









285. *Myosoton aquaticum* (L.) Moench | Morró d'aigua. *Cerastio acuático*. *Céraiste d'eau*. *Water starwort*. AQUA(c)/BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.

286. *Rabelera holostea* (L.) M.T. Sharples & E. Tripp [*Stellaria holostea* L.] | Rèvola. *Estrellada*. *Stellaire holostée*. *Greater stitchwort*. HERB(v,c)/MAT(g). 1200-2000 m. ccc. IV-VI. ALI(animal).

287. *Stellaria graminea* L. | Rèvola menuda. *Estelaria*. *Stellaire à feuilles de graminée*. *Common starwort*. PRAT(h)/AQUA(j). 1200-1960 m. ccc. VI-VII.

288. *Stellaria media* (L.) Vill. | Morró(s/c). *Yerba pajarrera*. *Morgeline*. *Chickweed*. RUD. 1200-2100 m. ccc. III-VIII. MED/ALI(animal).

289. *Stellaria neglecta* Weihe [*S. media* subsp. *major* Arcang.] | Morró. *Picagallina*. *Grande Stellaire*. *Greater chickweed*. RUD. 1240 m. rrr. VI.



290. *Stellaria nemorum* subsp. *montana* (Pierrat) Berher [*S. nemorum* L. subsp. *glochidisperma* Murb.] - . - . *Stellaire des montagnes*. *Wood stitchwort*. BOSC(h,br). 1260-1520 m. rrr. V-VII.







291. *Dianthus armeria* L. subsp. *armeria* | Clavell de bosc. Clavelina de muntanya. *Œillet arméria*. Deptford pink. PRAT/HERB(v)(si). 1220-1320 m. rr. VII-VIII.

292. *Dianthus deltoides* L. | Clavell deltoide. Clavelina de prado. *Œillet couché*. Maiden pink. PRAT(ac,h). 1550-2500 m. cc. VI-VIII.

293. *Dianthus hyssopifolius* L. subsp. *hyssopifolius* [*D. monspessulanus* L.] | Clavell/ Clavell de pastor. Clavel de monte. *Œillet de Montpellier*. -. PRAT/HERB(v). 1200-2550 m. cc. AUS.

294. *Dianthus seguieri* Vill. subsp. *requienii* (Godr.) Bernal, M. Lainz & Muñoz-Garm. [*D. seguieri* subsp. *gautieri* (Sennen) Tutin] | Clavell de bosc/Clavell de muntanya. -. *Œillet de Séguier*. *Seguier's pink*. PRAT. 1200-1800 m. cc.VII-VIII. MED/ALI/AUS.

295. *Petrorrhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood | Clavellet prolífer. Clavelina seca. *Œillet prolifère*. Proliferous pink. PRAT(a). 1200-1600 m. c. V-IX.

296. *Saponaria ocymoides* L. | Falsa alfàbrega. Saponaria. Saponaire des rochers. Rock soapwort. ROC(r,t). 1240-1720 m. c. V-VII. MED.

297. *Saponaria officinalis* L. | Herba sabonera/ Sabonera. Saponaria. Saponaire officinale. Bouncing bett, Soapwort. BOSC(br). 1200-1560 m. c. VI-IX. MED/AUS.

298. *Silene flos-cuculi* (L.) Clairv. subsp. *flos-cuculi* [*Lychnis flos-cuculi* L. subsp. *flos-cuculi*] | Flor de cucut. Flor de cucillo. *Silène fleur de coucou*. Ragged Robin. PRAT(h). 1240 m. rrr. VI-VII.









Cariofil·làcies: 299-306

299. *Herniaria glabra* L. | Herba de les mil granes/Cent-en-grana. *Hierba de la piedra*. *Herniaire glabre*. Rupture wort. PRAT(a)/RUD(t). 1230-1480 m. r. V-IX. MED/ALI.

300. *Holosteum umbellatum* L. | Holosti. *Estrellada*. *Holostée en ombelle*. *Umbellate chickweed*. PRAT(a)/ARV. 1240-1280 m. rrr.

301. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. | Herba prima. *Arenaria trinervia*. *Sabline à trois nervures*. *Three-nerved sandwort*. BOSC(h). ROC(r,m). 1240-1670 m. c. V-VII.

302. *Moehringia muscosa* L. | Herba prima. -. *Sabline des mousses*. -. ROC(r,m). 1200-1980 m. c. VI-VII. MED/ALI.

303. *Paronychia kapela* subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebn. | Sanguinària/Herba sanguinària. -. *Paronyque à feuilles de serpolet*. -. PRAT(s,r). ROC. 1240-2560 m. c. MED/ALI(animal).

304. *Sagina procumbens* L. | Sagina procumbent. *Sagina tendida*. *Sagine couchée*. *Procumbent pearlwort*. RUD(t). 1220-2100 m. r. V-VII.

305. *Scleranthus annuus* L. | Esclerant. *Esclerant anual*. *Escleranto anual*. *Gnavelle annuelle*. *Annual knawel*. PRAT(a). 1220-1540 m. c. IV-VI.

306. *Scleranthus perennis* L. | Esclerant. -. *Scléranthe vivace*. *Perennial knawel*. PRAT(a). c. VI-VII.







308

307. *Silene ciliata* Pourr. subsp. *ciliata* | Herba ronyonera/Patacs. *Silene ciliada*. *Silène cilié*. -, PRAT(ac). 1460-2700 m. VII-VIII. MED.

308. *Silene latifolia* Poir. [*Silene alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *divaricata* (Reichb.) McNeill et Prentice] | Colitxos. *Cabaciñas*. *Compagnon blanc*. *White campion*. RUD(h). 1200-2000 m. VI-IX. ALI.

309. *Silene nutans* L. subsp. *nutans* [*S. nutans* subsp. *brachypoda* (Rouy) Graebn. & P. Graebn.] | *Silene nutant*. *Silene colgante*. *Silène penché*. *Nottingham catchfly*. HERB(v). 1200-1980 m. ccc. VI-VIII.



309

310. *Silene vulgaris* (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* | Pets, esclafidors/Colitxos. *Collejas*. *Silène enflé*. *Bladder campion*. HERB(v)/RUD(h)/ROC(t). 1200-2200 m. ccc. VI-VIII. ALI. AUS.



310








313

311. ***Atocion rupestre*** (L.) Oxelman [*Silene rupestris* L.] | Patacs petits. *Silene rupestre*. *Silène des rochers*. *Rock campion*. ROC(r,t)/PRAT(a)(si). 1420-2760 m. cc. VI-VIII.

312. ***Silene dioica*** (L.) Clairv. | Melandri vermell. *Silene dioica*. *Compagnon rouge*. *Red campion*. HERB(c,v)/RUD(h). 1200-2060 m. c. VI-VII.

313. ***Silene gallica*** L. | Molinets. *Carmentilla*. *Silène de France*. *Small-flowered catchfly*. PRAT(a). 1240-1380 m. rrr. V.

314. ***Silene saxifraga*** L. | Herba prima. -. *Silène saxifrage*. -. ROC(r). 1300-1800 m. rrr. VI-VIII.



312







317



319

*Cariofil·làcies: 315-318; Celastràcies 319*


315. *Silene acaulis* (L.) Jacq. | *Silene acaule*. *Silene musgo*. *Silène acaule/Silène sans tiges*. *Moss campion*. PRAT(a). 2000-2900 m. cc. VI-VIII.

316. *Spergula arvensis* L. | *Espèrgula de camp*. -. *Spergule des champs*. *Corn spurrey*. ARV(si). 1230-1400 m. r. VII.

317. *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl | *Herba passarella*. *Arenaria roja*. *Spergulaire rouge*. *Sandwort*. RUD(t). 1220-2040 m. c. V-VIII. MED.

318. *Viscaria alpina* (L.) Don [*Lychnis alpina* L.] | *Licnis alpina*. -. *Silène de Suède*. *Alpine catchfly*. PRAT(si). 2270 m. rrr. VII.

319. *Parnassia palustris* L. subsp. *palustris* | *Fetgera blanca*. *Parnasia*. *Parnassie des marais*. *Grass of Parnassus*. AQUA(f,m)/PRAT(h). 1200-2700 m. cc. VII-IX.



319







*Cistàcies 320-322; Convolvulàcies: 323-324*

320. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.  
[*H. nummularium* subsp. *pyrenaicum* (Janch.)  
Hegi; *H. nummularium* subsp. *tomentosum* auct.]  
| Morenella/Helianthem nummular. *Jarilla*  
*europaea*. *Hélianthème jaune*. Common rockrose.  
MED. PRAT. 1200-2700 m. ccc. V-VIII.

321. *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.  
Cours. subsp. *alpestre* (Jacq.) Ces. [*H.*  
*oelandicum* subsp. *italicum* sensu O. Bolòs & Vigo;  
*H. oelandicum* var. *hirtum* sensu O. Bolòs & Vigo] |  
-. -. *Hélianthème alpestre*. -. PRAT(s)/ROC (ca).  
1700-2480 m. rr. VII-VIII.

322. *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum.  
Cours. subsp. *italicum* (L.) Ces. | *Herba*  
*passerella*. *Jarilla*. *Hélianthème d'Italie*. Hoary  
rockrose. PRAT(s,r). 1220-1980 m. c.V-VII.  
MED.

323. *Convolvulus arvensis* L. | Corretjola(s/c).  
*Campanilla europea*. *Liseron des champs*. Field  
bindweed. 1200-1680 m. c. V-VIII. MED/ALI/  
TOX(animal).

324. *Convolvulus sepium* L. [*Calystegia sepium*  
(L.) R. Br.] | Corretjola gran. *Correhuela mayor*.  
*Liseron des haies*. Hedge bindweed. 1200-1280 m.  
rrr. VI-VIII. MED.











*Convolvulàcies:* 325-326; *Cornaceae:* 327;  
*Crassulàcies:* 328-330

325. *Cuscuta epithymum* (L.) L. | Cabells. Cabello de monte. Cuscute. Great dodder. PRAT/MAT. 1220-1880 m. cc. VI-X. MED/AUS.

326. *Cuscuta europaea* L. | Cabells. Cabello de monte. Cuscute d'Europe. Greater dodder. RUD(h). 1220-2020 m. c. VI-VIII.

327. *Cornus sanguinea* L. | Sanguinyol. Cornejo. Cornouiller sanguin. Dogwood. BOSC/MAT(b). 1200-1440 m. c. VI-VII. MED/ALI/AUS/TOX.

328. *Sempervivum arachnoideum* L. | Matafoc teranyinós. Siempreviva de telarañas. Joubarbe-araignée. Cobweb house-leek. ROC(m)/PRAT(a). 1200-2300 m. c. VII-IX. AUS.

329. *Sempervivum montanum* L. subsp. *montanum* | Matafoc/Cebes. Siempreviva. Joubarbe des montagnes. Mountain hens and chickens, Mountain houseleeks. ROC(m)/PRAT(a). 1300-2800 m. c. VII-VIII. MED.



330. *Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum* | Matafoc (s/c). Siempreviva de muros. Joubarbe des toits. Common houseleek, Jupiter's beard. ROC(m). 1200-2560 m. r. VII-VIII. MED.











*Crassulàcies: 331-339*

331. *Sedum album* L. | Arròs de paret/Arròs. Pan de cuquiello. Orpin blanc. White stonecrop. ROC(m)/PRAT(r). 1220-2060 m. cc. VI-VII. MED/AUS.

332. *Sedum anglicum* Huds. [*S. anglicum* subsp. *pyrenaicum* Lange] | Crespinell. Pampajarito pirenaico. Orpin d'Angleterre. English stonecrop. ROC(t)/PRAT(a). 2000-2700 m. r. VII-VIII.

333. *Sedum dasyphyllum* L. | Arròs de paret (s/c). Pampajarito glauco. Orpin à feuilles épaisses. Corsican stonecrop. ROC(m). 1200-2100 m. c. VI-VIII. MED/ALI(animal)/AUS.

334. *Petrosedum sediforme* (Jacq.) Grulich subsp. *sediforme* [*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau] | Crespinell gros. Trigo pollo. Orpin de Nice. Pale stonecrop. ROC(m,t)/PRAT(a). 1200-1560 m. cc. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

335. *Sedum hirsutum* All. subsp. *hirsutum* | Crespinell pelut. Pampajarito peloso. Orpin hirsute. Hairy stonecrop. ROC(r). 1200-2200 m. c. V-VII.

336. *Sedum brevifolium* DC. | Crespinell. Pampajarito rojo. Orpin à feuilles courtes. Short-leaved stonecrop. ROC(m,r)/PRAT(a). 1200-2500 m. VI-VIII. MED.

337. *Sedum villosum* L. | Crespinell pilós. Pampajarito de humedal. Orpin velu. Hairy stonecrop. AQUA(f,m). 1600-1300 m. r. VII-VIII.

338. *Sedum candolleianum* G. López [*Mucizonia sedoides* (DC.) D.A. Webb] | Crespinell de congestera. -. Orpin de candolle. -. AQUA(c). 2300-2800 m. c. VII-IX.

339. *Sedum atratum* L. | Crespinell fosc. Pampajarito oscuro. Orpin noirâtre. Dark stonecrop. ROC(t)/PART(a) (ca). 2100-2780 m. c. VII-VIII.









*Crassulàcies: 340-347*

340. *Sedum alpestre* Vill. | Crespinell alpestre. Pampajarito alpino. Orpin des Alpes. Alpine stonecrop. AQUA(c)/ROC(t,h). 2200-2600 m. r. VII-VIII.

341. *Sedum cepaea* L. | Cepea. -. Orpin paniculé. -. ROC(si). 1300 m. rrr. VI.

342. *Petrosedum reflexum* (L.) Grulich [*Sedum rupestre* subsp. *reflexum* (L.) Hegi & Em. Schmid, S. *rupestre* L.] | Crespinell rupestre. Siempreviva menor. Orpin des rochers. Reflexed stonecrop. ROC(m,t)/PRAT(a). 1200-2100 m. cc. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

343. *Petrosedum montanum* (E. P. Perrier & Sonjeon) Grulich [*S. rupestre* subsp. *montanum* (E. P. Perrier & Sonjeon) Hegi & Em. Schmid.] | Crespinell muntanyenc. Siempreviva de muntanya. Orpin des montagnes. -. ROC(m,t) PRAT(r). 1200-2100 m. r. VII-VIII. MED/ALI/AUS.


344. *Sedum acre* L. subsp. *acre* | Crespinell groc. Siempreviva picante. Orpin âcre. Common stonecrop, Wallpepper. PRAT(a,)/ROC(m). 1200-1560 m. c. VI-VIII. MED/ALI/TOX.

345. *Sedum annuum* L. | Crespinell anual. Uva de moro. Orpin annuel. Annual stonecrop. PRAT(r). 1380-2100 m. c. VI-VII.

346. *Hylotelephium telephium* (L.) H. Ohba [*Sedum telephium* L.; *S. telephium* L. subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl.] | Herba grassa/Bàlsam. -. Orpin à feuilles de fève. Orphine. ROC(r)/HERB(v). 1600-1980 m. r. VII-IX. MED/AUS.

347. *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris* | Barretets de paret. Ombligo de Venus. Omblig de Vénus. Pennywort, Navelwort. ROC(m). cc. 1200-1500 m. c. VI-VII. MED/ALI(animal).









351



352

*Cucurbitàcies: 348-349; Dipsacàcies: 350-352*

348. *Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin [*B. dioica* Jacq.] | Carabassina. Nueza. *Bryonie dioïque*. *White bryony*. RUD(h)/MAT(b). 1200-1540 m. c. V-VIII. MED/ALI/AUS/TOX.

349. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai | Xindria. *Sandia*. *Melon d'eau*. *Watermelon*. ARV/RUD/BOSC(br). 1240-1380 m. rr. VIII. AL/AC.

350. *Scabiosa columbaria* L. subsp. *columbaria* | Escabiosa/Escapiosa. *Escabiosa*. *Scabieuse colombaire*. *Small scabius*. PRAT. 1200-2200 m. cc. VI-IX. MED.

351. *Dipsacus fullonum* L. | Escardot/Cardó. *Cardencha*. *Cardère cultivée*, *Cardère à foulon*. *Teasel*. RUD(h). 1200-1560 m. c. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

352. *Dipsacus pilosus* L. | -. *Triquittraco*. *Cardère poilue*. *Small teasel*. RUD(h)/BOSC(br). 1200-1320 m. rrr. VII-VIII.



352







356

*Dipsacàcies: 353-357*

353. *Knautia collina* (Guérin) Jord. [*K. arvensis* subsp. *collina* (Duby) Schübl. & G. Martens; *K. arvensis* subsp. *meridionalis* (Briq.) O. Bolòs & Vigo] | Escabiosa borda. Escabiosa. Knautie des collines. Field scabious. HERB(r). 1220 m. rrr. VII. MED/ALI(animal)/TOX.

354. *Knautia subscaposa* Boiss. & Reut. [*K. arvensis* (L.) Coult. subsp. *subscaposa* (Boiss. & Reut.) Maire] | Escabiosa. Escabiosa mayor. -. -. PRAT(h). 1200-18040 m. r. VI-IX.

355. *Knautia lebrunii* J. Prudhomme [*K. godetii* subsp. *lebrunii* (J. Prudhomme) O. Bolòs & Vigo; *K. dipsacifolia* subsp. *font-queri* Carrillo Ortuño & Ninot; *K. godetii* auct.] | Escabiosa boscana. -. Knautie de Le Brun. -. HERB(m). 1760-2040 m. rr. VI-IX.

356. *Knautia nevadensis* (Szabó) Szabó [*K. dipsacifolia* Kreutzer subsp. *arvernensis* (Briq.) O. Bolòs et Vigo; *K. arvernensis* (Briq.) Szabó subsp. *arvernensis*] | Escabiosa negra. Escabiosa de bosque. Knautie. -. BOSC/HERB(v)/PRAT 1200-2000 m. cc. VI-IX. MED.



357

357. *Succisa pratensis* Moench | Escabiosa/ Escabiosa mossegada. Escabiosa mordida. Mors-du-diable. Devil's bit scabious. AQUA(j,m)/ PRAT(h). 1220-2020 m. ccc. VII-IX. MED.



357





358



358



359



360



361



361



362

358. *Calluna vulgaris* (L.) Hull | Brossa/Bruguerola. Brecina. Callune. Heather/Ling. MAT/PRAT (ac). 1200-2620 m. VIII-X. ccc. MED/ALI/AU/TOX.

359. *Empetrum nigrum* L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher | Empetrum. -. Camarine hermaphrodite. Crowberry. MAT. 2180-2270 m. VI. rrr.

360. *Kalmia procumbens* (L.) Galasso, Bansi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] | Herba pedrera (s/c). Azalea alpina. Azalée couchée. Alpine azalea. MAT. 2080-2600 m. r. VI-VII. MED.



363

361. *Rhododendron ferrugineum* L. | Neret (s/c). Rododendro. Rhododendron ferrugineux. Alpenrose. 1200-2750 m. cc. VI-VII. MED/ALI/AUS/TOX.

362. *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. | Boixerola. Gayuba. Raisin-d'ours commun. Bearberry. MAT(n)/BOSC(per). 1400-2400 m. r. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

363. *Vaccinium myrtillus* L. | Nabiu (s/c). Arándano. Myrtille. Bilberry, European blueberry. MAT(n)/BOSC(per) (si). 1200-2800 m. cc. VI-VII. MED/ALI/AUS.

364. *Vaccinium uliginosum* L. | Nabiu uliginós. -. Myrtille des marais. Bog bilberry. MAT/BOSC (h). 1800-2800 m. c. VI-VII.



364





365



366



367



366



368

Ericàcies: 365-368 Escrofulariàcies: 369

365. *Monea uniflora* (L.) A. Gray [*Pyrola uniflora* L.] | *Pírola uniflora*. -. *Pirole à une fleur*. *One-flowered wintergreen*. BOSC(per,ca). 1320-1780 m. r. VI-VII.

366. *Pyrola minor* L. | *Pírola petita*. *Peralito menor*. *Petite pirole*. *Lesser wintergreen*. BOSC(per,h). 1420-2000 m. r. VI-VIII.

367. *Pyrola chlorantha* Sw. | *Pírola de flor verda*. -. *Pirole verdâtre*. *Pale-green wintergreen*. BOSC(per). 1340-1720 m. c. VI-VII.

368. *Hypopitys hypophegea* (Wallr.) G. Don [*Monotropa hypophegea* Wallr.; *M. hypopitys* var. *glabra* Roth] | *Xuclapins*. -. *Monotrope du hêtre*. *Dutchman's pipe*, *Yellow birdsnest*. BOSC(h). 1340 m. rr. VI.

369. *Buddleja davidii* Franch. | *Budlèia*. *Lila de verano*. *Buddléia de David*. -. ROC. 1200-1960 m. cc. VII-IX. AUS. AL/INV.



369



369







374

370. *Scrophularia alpestris* Benth. | Escrofulària alpestre. *Escrofularia alpina*. *Scrofulaire des Alpes*. -. BOSC(br,h)/HERB(m). 1200-2000 m. c. VI-VIII. MED/AUS.

371. *Scrophularia auriculata* subsp. *valentina* (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. [*S. auriculata* subsp. *pseudoauriculata* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] | Escrofulària aquàtica. *Escrofularia acuática*. *Scrofulaire aquatique*. *Water figwort*. AQUA(j,cr). 1240-1280 m. rrr. VI.

372. *Scrophularia crithmifolia* Boiss. [*S. canina* subsp. *crithmifolia* (Boiss.) O. Bolòs & Vigo] | Escrofulària de ca. *Escrofularia de montaña*. *Scrofulaire à feuilles de criste marine*. -. ROC(t). 1240-1680 m. c. V-VII.

373. *Scrophularia nodosa* L. | Escrofulària nodosa. *Hierba de San Pedro*. *Scrofulaire noueuse*. *Figwort*. BOSC(h)/HERB(v,c). 1200-1560 m. c. VII-IX. MED/AUS.

374. *Verbascum chaixii* Vill. | Cua de Guilla/Trepó. *Berbasco*. -. *Nettle-leaved Mullein*. HERB(v,c)/MAT(g)/PRAT. 1340 m. rrr. VII.

375. *Verbascum lychnitis* L. | Cua de guilla/Trepó candeler. *Gordolobo hembra*. *Molène lychnite*. -. HERB(v,c). 1200-2200 m. cc. VI-IX. MED/AUS.



375









380



381



382

Escrofulariàcies: 376-377; Euforbiàcies: 378-382

376. *Verbascum pulverulentum* Vill. | Cua de guilla/Trepó pulverulent. Gordolobo de muntanya. Molène floconneuse. -, RUD(h). 1240-1500 m. r. VI-VIII. MED/AUS/TOX.

377. *Verbascum thapsus* L. [*V. thapsus* subsp. *crassifolium* (Lam.) Murb; *V. thapsus* subsp. *montanum* (Schr.) Bonnier & Layens] | Cua de guilla/Trepó joanal. Gordolobo. Molène des montagnes. Aaron's rod. RUD(h). 1200-2180 m. c. VII-IX. MED/AUS.

378. *Mercurialis annua* L. | Murcarola/Melcoratge. Malcoraje. Mercuriale annuelle. Annual mercury. ARV/RUD. 1200-1780 m. c. III-VI. MED/ALI(animal)/TOX.

379. *Mercurialis perennis* L. | Melcoratge de bosc. Berza perruna. Mercuriale vivace. Dog's mercury. 1220-1980 m. c. IV-VI. MED.

380. *Euphorbia peplus* L. | Llet de bruixa. Lecherina. Euphorbe des jardins. Petty spurge. RUD(t). 1240-1320 m. r. VI-IX. MED.

381. *Euphorbia prostrata* Aiton [*Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small] | -, -. Euphorbe prostrée. Prostrate spurge. RUD(t). 1220-1250 m. r. VI. MED. AL/NAT.

382. *Euphorbia lathyris* L. | Herba talpera. Tàrtago. Euphorbe épurge. Caper spurge. ARV. 1220-1260. rr. VI. MED/AUS/TOX. AL/AC.



382







383. *Euphorbia amygdaloides* L. subsp. *amygdaloides* | Lleteresa de bosc. *Lechetrezna del bosque*. *Euphorbe des bois*. Wood spurge. BOSC/HERB(v). 1200-1600 m. c. V-VI. TOX.

384. *Euphorbia cyparissias* L. | Lletera de fulla estreta. *Lechetrezna común*. *Euphorbe petit-cyprés*. *Cypress spurge*. PRAT. 1200-2200 m. cc. V-VI. MED/AUS/TOX.

385. *Euphorbia exigua* L. subsp. *exigua* | -. *Lechetrezna romeral*. -. -. PRAT(a)/ARV. rrr. VI.

386. *Euphorbia helioscopia* L. subsp. *helioscopia* | Lleterola d'hort. *Lechetrezna*. *Euphorbe réveille-matin*. *Sun spurge*. ARV/RUD. 1200-2000 m. c. IV-IX. MED/TOX.

387. *Euphorbia nicaeensis* All. subsp. *nicaeensis* | Lleteresa. *Lechetrezna común*. *Euphorbe de Nice*. -. PRAT(s). 1340-1580 m. rr. VI-VII. MED/AUS.

388. *Euphorbia villosa* Willd. | Lleteresa pilosa. -. *Euphorbe poilue*. *Hairy spurge*. HERB(c). 1220-1240 m. rrr. VI.











*Fabàcies: 389-395*

389. *Anthyllis montana* L. | Antil·lis de muntanya. -. *Anthyllide des montagnes*. Mountain kidney vetch. ROC/PRAT. 1450-2225 m. r. V-VI.

390. *Anthyllis vulneraria* subsp. *sampaiouana* (Rothm.) Vasc. [*A. vulneraria* subsp. *forondae* (Sennen) Cullen] | *Vulnerària* (s/c). *Vulneraria*. *Anthyllide de Foronda*. Common kidney-vetch. PRAT 1200-1920 m. c. VI-VII. MED.

391. *Anthyllis vulneraria* subsp. *vulnerarioides* (All.) Arcang. | *Vulnerària alpina*. *Vulneraria*. *Anthyllide fausse vulnéraire*. -. PRAT(s,ca). 1670-2660 m. c. VI-VII.

392. *Astragalus monspessulanus* L. | Herba de Sant Llorenç. *Astrágalo espigado*. *Astragale de Montpellier*. False vetch.

*a.* subsp. *gypsophyllus* Rouy [subsp. *chlorocyaneus* (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja] PRAT(s)/ROC(r). 1240-1820 m. c. V-VI.

*b.* subsp. *monspessulanus* | PRAT(s)/ROC(r). 1280 m. rrr. VII.

393. *Astragalus sempervirens* Lam. [*A. sempervirens* subsp. *catalaunicus* (Braun-Blanq.) M. Laínz] | *Tragacant de muntanya*. -. *Astragale aristé*. -. PRAT/ROC(ca). 1600-2550 m. r. VI-VII.

394. *Oxytropis campestris* (L.) DC. subsp. *campestris* | *Oxítrop campestre*. -. *Oxytropis des Alpes*. Yellow meadow-vetch. PRAT (s,r,ca). 1600-2500 m. cc. VI-VIII.

395. *Oxytropis halleri* Bunge subsp. *halleri* [*O. halleri* Bunge subsp. *halleri* var. *ochroleuca* Costa] | *Oxítrop de Haller*. *Oxytropis de Haller*. *Oxytropis de Haller*. Silky oxytropis. PRAT(s,r,ca). 1900-2800 m. c. VI-VIII.







401



402



400

Fabàcies: 396-402

396. *Astragalus glycyphyllos* L. | Regalíssia borda. Regaliz borde. Astragale réglisse. Wild liquorice. HERB(v).1340 m. rrr. VI.

397. *Coronilla minima* L. subsp. *minima* | Coroneta de fulles menudes. -. Coronille naine. -. PRAT(s,ca). 1400-2020 m. r. VI. ALI(animal).

398. *Hippocrepis emerus* (L.) Lassen subsp. *emerus* [Coronilla emerus L.] | Coronil-la boscana. Aliaguetó. Coronille des jardins. False senna. BOSC(s). 1220-1560 m. c. V-VI. ALI(animal).

399. *Hippocrepis comosa* L. | Desferracavalls. Herraduras. Hippocrépide chevelue. Horseshoe vetch. PRAT(s). 1220-2450 m. c. V-VI.

400. *Lotus alpinus* (DC.) Ramond [Lotus corniculatus L. subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.] | Corona de rei. Cuernecillo alpino. Lotier des Alpes. Alpine bird's-foot trefoil. PRAT. 1940-2750 m. cc. VI-VIII.

401. *Lotus corniculatus* L. | Banya de cabra/Corona de rei. Corona de rey. Lotier corniculé. Bird's foot trefoil. PRAT. 1200-2100 m. ccc. MED/ALI(animal).

402. *Lotus pedunculatus* Cav. | Lot d'aiguamoll. Cuernecillo de turbera. Lotier des marais. Greater bird's-foot-trefoil. AQUA(j,m). 1320-1800 m. c. VI-VIII.





403



404



403



404





*Fabàcies: 403-407*

403. *Cytisus oromediterraneus* (G. López & C.E. Jarvis) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas [*Genista balansae* (Boiss.) Rouy subsp. *europaea* (G. López et C. E. Jarvis) O. Bolòs et Vigo] | Bàlec (s/c). Piorno. Genêt purgatif. Pyrenean broom. MAT(s). 1600-2400 m. cc. V-VII. MED/ALI(animal)/AUS.



404. *Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *scoparius* [*Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. subsp. *scoparius*] | Ginesta/Ginestell. Retama de escobas. Genêt à balais. Broom. MAT(b,g). 1200-1600(1950) m. cc. IV-VII. AUS.

405. *Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O. Lang [*Cytisus sessilifolius* Mill.] | Ginesta sessilifòlia. -. Cytise à feuilles sessiles. -. ROC(ca). 1700 m. rrr. VI.

406. *Genista sagittalis* L. [*Chamaespartium sagittale* (L.) P.E. Gibbs subsp. *sagittale*] | Itjol/Gaiol. Abulaga. Genistrelle. Winged greenweed. PRAT/MAT(ac). 1200-2260 m. c. V-VII. TOX.

407. *Genista pilosa* L. | Ginestola pilosa. Ginestola. Genêt velu. Hairy greenweed. PRAT/ MAT/ROC(ac). 1220-2000 m. cc. V-VII. ALI (animal).





409



408



410



411b



411a



411a



408. *Trifolium alpinum* L. | Regalèssia/Regalíssia de muntanya. Regaliz de puerto. Trèfle alpin. Alpine clover. PRAT(h). 1650-2850 m. cc. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

409. *Trifolium arvense* L. | Peu de llebre. Pata de liebre. Trèfle pied-de-lièvre. Stone clover. PRAT(a). 1200-1560 m. c. VI.

410. *Trifolium medium* L. subsp. *medium* | Trèvol mitjà. Trèbol de bosque. Trèfle flexueux. Zigzag clover. HERB(v). 1200-1800 m. c. VI-VII.

411. *Trifolium pratense* L. | Trèfola/Trèvol de prat. Trèbol de prado. Trèfle des prés. Broad-leaved clover.

a. var. *pratense* | PRAT(h). 1200-2200 m. ccc. V-IX. MED/ALI(animal)/AUS/TOX.

b. var. *villosum* DC. in Lam. et DC. [var. *alpinum* Hoppe in Sturm; var. *nivale* Koch] | PRAT(h, ca). 1890-2400 m. c. VII-IX.

412. *Trifolium thalii* Vill. | Trefolet/Trevolet rosat. -. Trèfle de Thal. -. PRAT(ca). 1920-2670 m. rr. VII-VIII.

413. *Trifolium repens* L. | Trefolet/Trevolet de prat. Trèbol blanco. Trèfle blanc. White clover. PRAT(h)/RUD(t). 1200-2400 m. ccc. V-X. MED/ALI(animal) /AUS.







415




418




416



419



417



421



414. *Onobrychis viciifolia* Scop. | Trepadella. Esparceta. Esparcette. Sainfoin. HERB(r). 1260 m. rrr. VI. AL/AC.

415. *Robinia pseudoacacia* L. | Escàcia. Falsa acàcia. Robinier faux acacia. Black locust. BOSC/PRAT. 1200-1450 m. r. V-VI. MED/ALI/AUS/TOX. AL/AC.

416. *Trifolium aureum* Pollich | Trèvol daurat. Trèbol de prado. Trèfle doré. Hop clover. PRAT/HERB(v). 1240-1800 m. r. VI-VII.

417. *Trifolium campestre* Schreb. | Fenarola. Trèbol campesino. Trèfle des champs. Low hop clover. PRAT(s,a). 1200-1860 m. cc. V-VIII.

418. *Trifolium dubium* Sibth. | Trèvol menut. Trèbol amarillo. Petit trèfle jaune. Lesser trefoil. PRAT(h). 1200-1560 m. r. V-VI.

419. *Trifolium montanum* L. | Trèvol de muntanya. Trèbol de montaña. Trèfle des montagnes. Mountain clover. PRAT. 1230-2000 m. c. VI-VIII.



420. *Trifolium ochroleucon* Huds. | Trèvol ocreleuc. Trèbol pàlido. Trèfle jaune pâle. Sulphur clover. PRAT/HERB(v). c. V-VII.

421. *Trifolium scabrum* L. | Trèvol escabre. Trèbol áspero. Trèfle scabre. Rough clover. PRAT(a). 1240 m. rrr. VI.







422. *Melilotus albus* Medik. | Almegó blanc. Meliloto blanco. Mélilot blanc. White melilot. RUD(h). 1220-2000 m. c. VI-VII.

423. *Melilotus altissimus* Thuill. | Melilot altíssim. -. Grand mélilot. -. RUD(h). 1200-1470 m. r. VI-VIII.

424. *Melilotus officinalis* (L.) Pall. | Almegó oficial. Meliloto oficial. Mélilot officinal. Common melilot. RUD(h). c. VI-VIII. MED/ALI(animal)/TOX.

425. *Ononis cristata* Mill. | Gavó alpi. Garbancilla. Bugrane à crête. -. PRAT(r)/ROC(t) (ca). 1700-2300 m. rr. VII-IX.

426. *Ononis natrix* L. | Gavó groc. Pegamoscas. Bugrane fétide. Yellow restharrow. PRAT(s,r)/ROC(t) 1450-2000 m. r. VI-VIX.

427. *Ononis spinosa* L. | Gavó espinós. Gatuña. Bugrane épineuse. Spiny rest harrow. PRAT. 1220-1600 m. c. VI-VII. MED/ALI(animal)/AUS/TOX.

428. *Ononis striata* Gouan | Gavó estriat. -. Bugrane striée. -. PRAT(r)/ROC(r). 1450-2100 m. r. VII-IX.









429. *Lathyrus aphaca* L. | Gerdell. Arvejo. Gesse aphaca. Yellow vetchling. ARV. 1240-1280 m. rr. V-VI.

430. *Lathyrus latifolius* L. | Pèsol bord. Albejana basta. Gesse à larges feuilles. Broad-leaved everlasting pea. HERB(v). 1240-1280 m. rr. VI-VII. ALI.

431. *Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler [*L. montanus* Bernh.] | Guixó de muntanya. -. Gesse à feuilles de lin. -. BOSC/MAT/HERB(v)(ac). 1220-2080 m. cc. V-VIII.

432. *Lathyrus occidentalis* (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch [*L. laevigatus* (Waldst. et Kit.) Gren.] | Guixó groc. -. Yellow pea. BOSC(h)/HERB(v,m). 1340-1980 m. r. VI-VII.

433. *Lathyrus pratensis* L. | Guixó de prat. Latiro de prado. Gesse des prés. Meadow pea. PRAT(h)/AQUA. 1200-2080 m. cc. VI-VIII.

434. *Lathyrus tuberosus* L. | -. Alverja tuberosa. Gesse tubéreuse. Earth-nut Pea. MAT(b)/HERB(v). 1250 m. rrr. VII.

435. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. | Guixó vernal. -. Gesse de printemps. Spring vetchling. BOSC(h)/HERB(v). 1430-1780 m. rr. V-VI.









439

436. *Medicago arabica* (L.) Huds. [*M. maculata* Willd.] | Herba de la taca. Mielga pintada. Luzerne tachetée. Spotted bur-clover. PRAT/ARV/RUD(t). 1230-1460 m. rr. V. AL/NAT.

437. *Medicago lupulina* L. | Fenarola menuda. Carretón. Luzerne lupuline. Black medick. PRAT(h). 1200-2080 m. cc. V-VIII. ALI(animal)/TOX.

438. *Medicago minima* (L.) L. | Melgó mínim. Carretilla menor. Luzerne naine. Bur medick. PRAT(a). 1230-1620 m. r. V-VI. ALI(animal).

439. *Medicago sativa* L. subsp. *sativa* | Userda/Alfals. Alfalfa. Luzerne cultivée. Alfalfa, Lucerne. RUD/ARV/HERB. 1200-1560 m. c. V-X. MED/ALI/AUS/TOX. AL/NAT.

440. *Medicago suffruticosa* DC. | Melgó fruticós. -. Luzerne sous-ligneuse. Sprawling medick. PRAT. 1260-2450 m. c. V-VIII.



440









Fabàcies: 441-449



441. *Ervilia hirsuta* (L.) Opiz [*Vicia hirsuta* (L.) Gray] | Veça. Alberjón. *Vesce hirsute*. *Hairy tare*. HERB(v)/RUD(h). 1220-1980 m. cc. VI-VII.

442. *Lotus maritimus* L. [*Tetragonolobus maritimus* (L.) Rothm.] | Lot siliquós. *Loto de flor alargada*. *Lotier maritime*. *Dragon's-teeth*. AQUA(m,j). 1240-1650 m. r. V-VII.

443. *Vicia angustifolia* L. [*V. sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh.] | Veça (s/c). *Veça*. *Vesce à feuilles étroites*. *Common vetch*. PRAT/ARV/RUD(h). 1240- 1780 m. c. V-VI. MED/ALI(animal) AUS.

444. *Vicia dasycarpa* Ten. [*V. villosa* Roth subsp. *varia* (Host.) Corb.] | *Garlanda pilosa*. -. *Vesce bigarrée*. *Hairy vetch*. ARV/RUD(h). 1200-1680 m. c. V-VII.

445. *Vicia incana* Gouan [*V. cracca* subsp. *incana* (Gouan) Rouy; *V. incana* subsp. *gerardii* Gaudin] | *Garlanda*. *Alverja*. *Vesce blanchâtre*. *Tufted vetch*. HERB(v). 1460 m. r. VII.

446. *Vicia onobrychioides* L. | Veça trepadellera. -. *Vesce fausse esparcette*. -. HERB(v)/PRAT. 1260-1480 m. rr.VII.

447. *Vicia orobus* DC. | -. -. *Orobe des landes*. -. HERB(m). 1600 m. rrr. VI.


448. *Vicia pyrenaica* Pourr. | *Arvellola pirinenca*. *Arveja de los Pirineos*. *Vesce des Pyrénées*. *Pyrenean vetch*. PRAT(s,ca). 1560-2460 m. cc. VI-VII.

449. *Vicia sepium* L. | Veça de bosc. *Arveja silvestre*. *Vesce des haies*. *Bush vetch*. HERB(v). 1200-2040 m. cc. V-VII. ALI(animal).





450



450



450



452



452



*Fagàcies: 450-452; Gencianàcies: 453*

450. *Fagus sylvatica* L. | Faig (s/c). Haya. Hêtre. Beech. BOSC(h). 1240-1700 m. r. IV-V. MED/ALI/AUS/TOX.

451. *Quercus petraea* (Matt.) Liebl. | Roure de fulla gran. Roble albar. Chêne sessile. Durmast oak, Sessile oak. BOSC(s). 1220-1800 m. cc. V-VI. MED/ALI/AUS.

452. *Quercus pubescens* Willd. [*Q. humilis* Mill.] | Roure martinenc. Roble común. Chêne pubescent. Downy oak. BOSC(s). 1450-1580 m. rr. IV-V. MED/ALI/AUS.

453. *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata* | Centaura groga. Centaurea amarilla. Chlore perfoliée. Yellow-wort. PRAT(h)/AQUA(j). 1240-1600 m. rr. VI-VII.









454. *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea* | Herba de Santa Margarida. *Centaura menor*. *Petite-centaurée commune*. *Common centaury*. PRAT. 1540 m. rrr. VI. MED/ALI.

455. *Gentiana acaulis* L. | Genciana/Genciana acaule. *Genciana acaule*. *Gentiane acaule*. *Trumpet gentian*. PRAT(h). 1440-2400 m. cc. IV-VII. MED.

456. *Gentiana alpina* Vill. *Genciana alpina*. -. *Gentiane des Alpes*. -. PRAT(ac). 1760-1900 m. c. VI-VIII.

457. *Gentiana nivalis* L. | Genciana nival. *Genciana nival*. *Gentiane des neiges*. *Snow gentian*. PRAT. 1940-2400 m. rr. VII-X.

458. *Gentiana pyrenaica* L. | Genciana pirinenca. *Genciana pirenaica*. *Gentiane des Pyrénées*. *Pyrenean gentian*. PRAT(h). 1640-2400 m. cc. V-VIII.

459. *Gentiana verna* L. | Pastorella. *Genciana azul*. *Gentiane de printemps*. *Spring gentian*. PRAT. 1200-2840 m. cc. IV-IX. MED.

460. *Swertia perennis* L. | Esvèrtia. *Genciana morada*. *Swertie vivace*. *Marsh felwort*. AQUA(m). 1980-2350 m. r. VII-IX.









461. *Comastoma tenellum* (Rottb.) Toyok.  
[*Gentiana tenella* Rottb.] | -. -. *Gentiane délicate*. -.  
AQUA(c,ca). 1980-2740 m.rr. VII-IX.

462. *Gentiana burseri* Lapeyr. subsp. *burseri*  
| Genciana de Burser. *Genciana amarilla*.  
*Gentiane de Burser*. *Burser's gentian*. MAT(n)/  
HERB(m). 1500-2400 m. c. VII-VIII. MED/ALI.

463. *Gentiana cruciata* L. | Genciana  
cruciada. *Genciana cruciada*. *Gentiane croiset*.  
*Cross gentian*. PRAT(h)/HERB(v). 1500-1680  
m. r. VII-VIII.

464. *Gentiana lutea* L. subsp. *lutea* |  
Genciana/Genciana groga. *Genciana amarilla*.  
*Gentiane jaune*. *Great yellow gentian*. PRAT(h).  
1200-2280 m. cc. VI-VII. MED. PRO.

465. *Gentianella campestris* (L.) Börner  
subsp. *campestris* [*Gentiana campestris* L. subsp.  
*campestris*] | Genciana/Genciana campestre.  
*Gencianela alpina*. *Gentiane des champs*. *Field*  
*gentian*. PRAT(h). 1200-2800 m. cc. VI-IX.



466. *Gentianopsis ciliata* (L.) Ma subsp.  
*ciliata* [*Gentianella ciliata* (L.) Borkh.] | Genciana  
ciliada. *Genciana ciliada*. *Gentiane ciliée*. *Fringed*  
*gentian*. PRAT(h). 1300-1880 m. r. VIII-X.





467



468



469



470



473



474



467. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. | Agulles de bruixa. Aguja de pastor. Bec-de-grue à feuilles de ciguë. Common storks bill. ARV/RUD(t)/PRAT(a). 1200-2100 m. c. III-VII. MED/ALI/AUS.

468. *Geranium columbinum* L. | Gerani de colom. Geranio pie de paloma. Pied-de-pigeon. Long-stalked crane's-bill. RUD(h)/ARV/PRAT. 1200-1750 m. c. V-VIII.

469. *Geranium dissectum* L. | Gerani de fulles retallades. Geranio recortado. Géranium découpé. Cut-leaf geranium. RUD(h). 1200-1500 m. r. V-IX.

470. *Geranium molle* L. | Suassana blana. Geranio peloso. Géranium à feuilles molles. Dove's-foot crane's-bill. RUD. 1200-1450 m. IV-VI.

471. *Geranium nodosum* L. | Gerani nuós. Geranio nodoso. Géranium à tige noueuse. Knotted cranesbill. BOSC(h). 1200-1380 m. rrr. VI-VII.




472. *Geranium phaeum* L. | Gerani obscur. Geranio oscuro. Géranium brun. Dusky cranesbill. HERB(v,cl)/BOSC(h). 1250 m. rrr. VI-VII.

473. *Geranium pyrenaicum* Burm. f. subsp. *pyrenaicum* | Suassana pirinenca. Geranio pirenaico. Géranium des Pyrénées. Pyrenean cranesbill. RUD/ HERB(v). 1200-2120 m. cc. V-IX.

474. *Geranium rotundifolium* L. | Suassana rotundifolia. Geranio redondo. Géranium à feuilles rondes. Round-leaved cranesbill. RUD. 1200-1520 m. c. V-VII. MED/TOX.







Geraniàcies: 475-478; Gesneriàcies: 479;  
Grossulariàcies: 480-481

475. *Geranium pratense* L. | Gerani de prat. Geranio de prado. Géranium des prés. Meadow geranium. PRAT(h)/HERB(m). 1550-1600 m. rrr. VI-VII.

476. *Geranium robertianum* L. | Cicuta/Herba de Sant Robert. Geranio de San Roberto. Herbe à Robert. Herb Robert. ROC/HERB(v)(h). 1200-2000 m. cc. V-VIII.MED/ALI(animal)/TOX.

477. *Geranium sanguineum* L. | Gerani sanguini. Geranio sanguíneo. Géranium rouge sang. Bloody cranesbill. HERB(v). 1520-1700 m. rrr. VI. ALI(animal).

478. *Geranium sylvaticum* L. subsp. *sylvaticum* | Gerani de bosc. Geranio de bosque. Géranium des forêts. Wood cranesbill. HERB(m,cl,v)/PRAT(h). 1340-1980 m. c. VII-VIII.

479. *Ramonda myconi* (L.) Rchb. | Orella d'os. Oreja de oso. Ramondie des Pyrénées. Ramonda. ROC(r). 1720-1800 m. rrr. VI. MED/ALI/AUS.

480. *Ribes alpinum* L. | Cirerola. Grosellero de montaña. Groseillier des Alpes. Alpine currant. MAT(n)/HERB(cl,m). 1250-1880 m. c. V.VI. ALI.

481. *Ribes petraeum* Wulfen | Grosella/Riber silvestre. Groseillero pirenaico. Groseillier des rochers. Rock red currant. BOSC/MAT(h). 1260-1540 m. rr. V-VI. MED/ALI







Hipericàcies: 482-486; Juglandàcies: 487

482. *Hypericum humifusum* L. | Hipèric humifús. -. Millepertuis couché. -. AQUA(j). 1500 m. rrr.

483. *Hypericum maculatum* Crantz subsp. *maculatum* | Hipèric maculat. Hipèric no perforado. Millepertuis taché. Imperforate St. John's-wort. HERB(m,v,cl)/PRAT/MAT(g). 1200-2200 m. ccc. VI-VII. MED.

484. *Hypericum montanum* L. | Hipèric muntanyenc. -. Millepertuis des montagnes. Mountain St. John's wort. HERB(v)/BOSC. 1240-1620 m. c. VI-VII.

485. *Hypericum perforatum* L. | Flor de cop/ Herba de Sant Joan. Hipericón. Millepertuis perforé. Perforate St. John's wort. HERB(v)/PRAT(s). ccc. 1200-2000 m. VI-VIII. MED/ALI/AUS/TOX.

486. *Hypericum tetrapterum* Fr. | Hipèric tetràpter. -. Millepertuis à quatre ailes. -. AQUA(j,c). 1220-1660 m. c. MED.



487. *Juglans regia* L. | Noguer. Nogal. Noyer. Walnut. BOSC(h). 1240 m. rr. V. MED/ALI/AUS/TOX. AL/NAT.







*Labiades: 488-494*

488. *Ajuga pyramidalis* L. subsp. *pyramidalis*  
| Búgula piramidalis. Búgula piramidal. Bugle  
pyramidale. Pyramidal bugle. PRAT/MAT(n).  
1560-2330 m. c. VII-VIII.

489. *Ajuga reptans* L. | Búgula. Consuelda  
media. Bugle rampante. Common bugle.  
BOSC(h). 1220-1780 m. r. IV-V.

490. *Mentha aquatica* L. | Menta d'aigua.  
Menta acuática. Menthe aquatique. Water mint.  
AQUA(cr). 1240 m. rrr. VII.

491. *Mentha arvensis* L. | Menta arvense.  
Menta. Menthe des champs. Wild mint.  
AQUA(j,cr). 1200-1480 m. rr. VII. MED/ALI.

492. *Mentha longifolia* (L.) Huds. | Menta  
de llop/menta boscana. Mastranzo silvestre.  
Menthe des bois. Horse mint. AQUA(j,cr,m).  
1220-2100 m. cc. VII-VIII. MED/ALI/AUS.

493. *Mentha spicata* L. | Menta de bou.  
Hierbabuena. Menthe verte. Spear mint.  
AQUA(h). 1240 m. rrr. VII. AL/NAT.

494. *Mentha suaveolens* Ehrh | Menta borda.  
Hierbabuena de burro. Menthe suave. Round-  
leaved mint. AQUA(j). 1240 m. rrr. VII.









495. *Galeopsis angustifolia* Hoffm. [G. *ladanum* subsp. *angustifolia* (Hoffm.) Celak.] | Galeopsis de fulla estreta. -. Galéopsis à feuilles étroites. Red hemp-nettle. ROC(t). 1380-1680 m. rr. VI-VII.

496. *Galeopsis ladanum* L. subsp. *ladanum* | Galeopsis vermella. -. Galéopse intermédiaire. Large pink hemp-nettle. ARV/ROC(t). 1220-1450 m. r. VI-VII.

497. *Galeopsis pyrenaica* Bartl. [Galeopsis *ladanum* L. subsp. *pyrenaica* (Bartl.) O. Bolòs] | Galeopsis pirinenca. -. Galéopse des Pyrénées. Pyrenean hemp-nettle. ROC(t). 1320-2680 m. cc. VIII-IX.

498. *Galeopsis tetrahit* L. subsp. *tetrahit* | Tetrahit. Galéopside de bosque. Galéopse tétrahit. Common hemp-nettle. RUD(h)/HERB(c). 1240-2040 m. c. VII-VIII.



499. *Teucrium chamaedrys* L. | Camedris. Camedrio. Germandrée petit-chêne. Wild germander. ROC. 1220-1560 m. r. VI-VIII. MED/ALI.

500. *Teucrium pyrenaicum* L. subsp. *guarensis* P. Monts. | Angelins. Zamarrilla pirenaica. Germandrée des Pyrénées. Pyrenean germander. PRAT(s). 1220-1880 m. c. VI-VII.

501. *Teucrium scorodonia* L. | Escorodònia. Camedrio de los bosques. Germandrée scorodoine. Wood sage. BOSC/MAT(g,ac). 1200-1700 m. cc. VI-VIII.







502. *Lamium album* subsp. *album* | Ortiga morta blanca. *Ortiga muerta blanca*. *Lamier blanc*. *White deadnettle*. RUD(h). 1620-2120 m. r. VI-VIII. MED.

503. *Lamium amplexicaule* L. | Flor-rubí. *Patica de gallo*. *Lamier à feuilles embrassantes*. *Hen-bit deadnettle*. ARV. 1220-1430 m. c. IV-VI. MED/TOX.

504. *Lamium galeobdolon* (L.) Crantz subsp. *montanum* (Pers.) Hayek [*L. galeobdolon* auct.] | Ortiga morta groga. *Ortiga muerta amarilla*. *Lamier jaune*. *Yellow archangel*. BOSC(h,br). 1220- 1720 m. r. V-VI.

505. *Lamium hybridum* Vill. | Lami incís. -. *Lamier découpé*. *Cut-leaved dead-nettle*. ARV/ RUD(t). 1260 m. rrr. VI.

506. *Lamium maculatum* L. | Lami maculat. -. *Lamier tacheté*. *Spotted dead-nettle*. HERB(cl,v)/ RUD(h). r. 1200-1850 m. V-VII.

507. *Salvia glutinosa* L. | Sàlvia de flor groga. -. *Sauge glutineuse*. *Jupiter's distaff*, *Sticky sage*. HERB(c,v) 1240-1480 m. rr. VIII-IX. AUS.

508. *Lycopus europaeus* L. | Malrubí d'aigua. *Menta de lobo*. *Lycope*. *Gypsywort*. AQUA(j,cr). 1220-1250 m. rrr. VII-VIII.









*Labiades: 509-515*

509. *Clinopodium nepeta* subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F. Conti [*Calamintha nepeta* subsp. *sylvatica* (Bromf.) R. Morales] | -. -. -. HERB(v)/ROC(m). 1230-1250 m. rrr.

510. *Clinopodium vulgare* L. [*Satureja vulgaris* (L.) Fritsch; *Calamintha clinopodium* Benth.] | Orenga borda. *Clinopodio*. *Calament clinopode*. Wild basil. HERB(v,s)/PRAT(s). 1200-1600 m. ccc. VII-VIII.

511. *Satureja montana* L. subsp. *montana* | Sajolida. *Ajedrea salvaje*. *Sarriette des montagnes*. *Perennial Savory*. ROC(r). 1450-1800 m. rr. VII-IX.

512. *Sideritis hirsuta* L. | Herba de la feridura. *Sajareña*. *Crapaudine hirsute*. -. PRAT/ROC (s). 1380 m. rrr. VII. MED/ALI.

513. *Sideritis hyssopifolia* L. | Herba del bàlsam. *Rabogato pirenaico*. *Crapaudine à feuilles d'hysope*. *Sideritis*. 1420-2620 m. ccc. VI-VIII. MED/ALI.

514. *Ziziphora granatensis* (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *alpina* (L.) Bräuchler & Gutermann [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze; *Acinos alpinus* (L.) Moench] | Calament alpi. *Albahaca silvestre*. *Calament des Alpes*. *Alpine calamint*. ROC(t,ca). 1500-2300 m. c. VI-VII.

515. *Ziziphora granatensis* (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *granatensis* [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze subsp. *meridionale* (Nyman) Govaerts; *Satureja acinos* subsp. *meridionalis* (Nyman) O. Bolòs & Vigo] | Calament alpi. -. *Calament méridional*. -. PRAT(s,a). 1240-1700 m. c. VI-VII.











*Labiades: 516-522*

516. *Betonica officinalis* L. [*Stachys officinalis* (L.) Trevisan] | Betònica (s/n). *Betónica*. *Bétoine officinale*. *Betony*. MAT/BOSC/PRAT(ac). 1200-2000 m. VI-VII. MED/ALI.

517. *Salvia verbenaca* L. | Tàrrec. Gallocresta. *Sauge verbénacée*. *Vervain*. PRAT(s). 1280 m. rrr. V.

518. *Salvia pratensis* L. | Sàlvia silvestre/Sàlvia de prat. *Salvia de prado*. *Sauge des prés*. *Meadow clary*. PRAT(s). 1220-1720 m. c. V-VII. MED/AUS.

519. *Stachys alpina* L. | Estaquis alpina. -. *Épiaire des Alpes*. *Alpine woundwort*. HERB(cl,m). 1500-1980 m. rrr. VI-VII.

520. *Stachys palustris* L. | Estaquis palustre. *Ortiga hedionda*. *Épiaire des marais*. *Marsh woundwort*. AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI-VII.

521. *Stachys recta* L. | Herba de Sant Antoni. *Hierba de la perlesia*. *Épiaire droite*. *Yellow woundwort*. PRAT(s). 1240-1680 m. c. VI-VIII. MED/ALI.

522. *Stachys sylvatica* L. | Ortiga pudent. *Betónica mayor*. *Épiaire des bois*. *Hedge woundwort*. HERB(cl,v). c. 1200-1780 m. VI-VII. MED.





523



524



526



527



528



523. *Ballota nigra* L. [*B. nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek] | Malrubí negre. *Manrubio bastardo*. *Ballote fétide*. *Black horehound*. RUD(h). 1240-1620 m. c. VI-VII. MED/ALI/TOX.

524. *Marrubium vulgare* L. | Marrubí. *Marrubio*. *Marrube comun*. *White horehound*. RUD(s). 1300-1450 m. rr. V-IX.

525. *Origanum vulgare* L. | Orenga/Moradui. *Orégano*. *Origan*. *Marjoram*. HERB(v,s), PRAT(s). 1200-1600 m. cc. VII-IX. MED/ALI/AUS.

526. *Nepeta latifolia* DC. [*N. nuda* subsp. *latifolia* (DC.) O. Bolòs & Vigo] | Nepta violàcia. -. *Népéta à feuilles larges*. *Broad-leaved catmint*. RUD(h). 1300-1780 m. rr. VII-VIII.

527. *Thymus nervosus* Willk. [*Th. serpyllum* subsp. *nervosus* (Benth.) Nyman] | Farigoleta de pastor/Serpoll. -. *Thym à nervures saillantes*. *Wild thyme*. PRAT/ROC. 1820-2740 m. cc. VI-VIII.

528. *Thymus pulegioides* L. [*Th. chamaedrys* Fr.; *Thymus serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fr.) Vollm.; *Th. froelichianus* Opiz; *Th. serpyllum* L. subsp. *carniolicus* (Borbás) P. Schmidt.] | Farigoleta de pastor/Serpoll. *Tomillo de prado*. *Thym de bergère*. *Larger wild thyme*. PRAT. 1200-2200 m. ccc. VI-IX. MED/ALI/AUS.

529. *Thymus vulgaris* subsp. *vulgaris* L. | Farigola (s/c). *Tomillo*. *Thym comun*. *Common thyme*. PRAT(s)/ROC. 1240-1800 m. MED/ALI.









*Labiades: 530-536*

530. *Prunella grandiflora* (L.) Scholler [*P. grandiflora* (L.) Scholler subsp. *pyrenaica* (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs] | Herba del traïdor/Prunel·la grandiflora. Consuelda mayor. Brunelle à grandes fleurs. Large self-heal. MAT(g)/PRAT,HERB(v)(h). 1200-2275 m. cc. VI-IX. MED/ALI/AUS.

531. *Prunella laciniata* (L.) L. | Prunel·la blanca. Prunela blanca. Brunelle blanche. Cut-leaved self-heal. PRAT(s). 1200-1620 m. c. VI-VIII. MED/ALI.

532. *Prunella vulgaris* L. | Prunel·la vulgar. Hierba de las heridas. Brunelle commune. Self-heal. PRAT(h), AQU(m,j). 1200-2180 m. cc. MED/ALI/AUS/TOX.

533. *Prunella ×bicolor* Beck [*P. grandiflora* × *P. laciniata*] PRAT(ac). 1460 m. rrr. VII.

534. *Prunella ×intermedia* Link [*P. laciniata* × *P. vulgaris*] PRAT. 1560 m. rrr. VII.

535. *Scutellaria alpina* L. subsp. *alpina* | Escutel·lària alpina. Tercianera alpina. Scutellaire des Alpes. Alpine skullcap. ROC(t,ca). 1580-2580 m. r. VII-VIII. MED/ALI.

536. *Melittis melissophyllum* L. | Melissot. Melisa bastarda. Mélitte à feuilles de mélisse. Bastard balm. HERB(v,s)/BOSC(s). 1240 m. rrr. VI.





537



538



538



538



539





540



542



541

*Lentibulariàcies: 537-538; Linàcies: 539-541;  
Litràcies: 542*

537. *Pinguicula grandiflora* Lam. | Viola d'aigua. Grasilla mayor. Grassette à grandes fleurs. Large-floewed butterwort. AQUA(m,f,ca). 1220-2100 m. c. VI-VII. MED.

538. *Pinguicula vulgaris* L. | Pingüicula. Grasilla. Grassette commune. Common butterwort. AQUA(m,f,ca). 1400-2380 m. r. VII-VIII. MED/TOX.

539. *Linum bienne* Mill. [*L. usitatissimum* subsp. *bienne* (Mill.) Stank.; *L. usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell.] | Lli. Lino. Lin à feuilles étroites. Pale flax. PRAT(s). 1220-1480 m. r. V-VII. MED.

540. *Linum catharticum* L. | Llinet purgant. Lino purgante. Lin cathartique. Purgung flax. PRAT(h,ac)/AQUA(j). 1220-1880 m. ccc. VI-VII.

541. *Linum narbonense* L. subsp. *narbonense* | Lli de Narbona. Lino. Lin de Narbonne. Beautiful flax. PRAT(ca). 1700 m. rrr. VI. MED.

542. *Lythrum salicaria* L. | Salicària. Salicaria. Salicaire commune. Purple loosestrife. AQUA(j). 1200-1280 m. rr. VI-VIII. MED.









*Malvaciés: 543-549*

543. *Alcea rosea* L. [*Althaea rosea* (L.) Cav.] | Malva reial. Malva real. Passe-rose. Hollyhock. RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/AC.

544. *Malva alcea* L. [*M. alcea* subsp. *fastigiata* (Cav.) O. Bolòs & Vigo] | Alcea. Malvavisco salvaje. Mauve alcée. Cut-leaved mallow. RUD(h). 1260 m. rrr. VII.

545. *Malva moschata* L. | Malva moscada. -. Mauve musquée. Musk-mallow. PRAT. 1340 m. rrr. VII.

546. *Malva neglecta* Wallr. | Malva de fulla petita. Malva enana. Petite mauve. Dwarf mallow. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VI-X. MED/ALI/AUS.

547. *Malva setigera* K.F. Schimp. & Spenn. [*Althaea hirsuta* L.] | Altea hirsuta. Cañamera azul. Guimauve hérissée. Hairy Marshmallow. ROC(m). 1380 m. rrr. VI.

548. *Malva sylvestris* L. | Malva (s/c). Malva. Grande mauve. Common mallow. RUD (h). 1200-1700 m. cc. V-VIII. MED/ALI/AUS.

549. *Tilia platyphyllos* Scop. | Tell/Tell de fulla gran. Tilo común. Tilleul à grandes feuilles. Large-leaved lime. BOSC(h,br). 1200-1650 m. c. VI-VII. MED/ALI/AUS/TOX.







Montiàcies: 550; Oleàcies: 551-552; Onagràcies: 553-555

550. *Montia fontana* L. subsp. *fontana* [*M. fontana* subsp. *variabilis* Walters] | Mòntia. Verdolaga de agua. Montie des fontaines. Blinks. AQUA(f). 1350-2000 m. c. VI-VII. ALI.

551. *Fraxinus excelsior* L. subsp. *excelsior* | Freixe/Freixe de fulla gran. Fresno. Frêne commun. Large-leaved ash. BOSC(h,br). 1200-1780 m. ccc. V. MED/ALI/AUS/TOX.

552. *Ligustrum vulgare* L. | Olivereta. Aligustre. Troène commun. Common privet. BOSC(s)/MAT(b). 1340 m. rrr. VI.

553. *Circaea lutetiana* L. | Herba de les encantades. Hierba de la bruja. Circée commune. Broad-leaved enchanter's nightshade. BOSC(h,br). 1200-1460 m. rr. VI-VII.

554. *Oenothera biennis* L. [*O. suaveolens* Desf.; *O. biennis* subsp. *suaveolens* (Pers.) Rouy & Camus] | Enotera groga. Enotera. Onagre bisannuelle. Common evening-primrose. RUD(h)/ROC(t,h). 1220-1780 m. c. VII.VIII. MED/ALI/AUS. AL/NAT.

555. *Oenothera rosea* Aiton | Onagra rosada. Yerba del golpe. Onagre rosée. Pink evening primrose. RUD(h). 1240-1280 m. r. VI. AL/NAT.









556



556

*Onagràcies: 556-561*



557

556. *Epilobium alsinifolium* Vill. | Epilobi alsinifoli. Epilobio alpino. Épilobe à feuilles d'alsine. Chickweed willowherb. AQUA(f). 1400-2600 m. c. VII-VIII.

557. *Epilobium angustifolium* L. subsp. *angustifolium* | Cameneri. Epilobio de hojas estrechas. Épilobe en épi. Rosebay willow herb. HERB(cl,v). 1200-2400 m. c. VII-VIII. MED.

558. *Epilobium collinum* C.C. Gmel. | Epilobi roquer. -. Épilobe des collines. Hill willowherb. ROC(r,t). 1200-2620 m. c. VI-VIII.

559. *Epilobium hirsutum* L. | Epilobi hirsut. Hierba de San Antonio. Épilobe hirsute. Greater willow herb. AQUA(j,cr,b). 1200-1520 m. c. VI-VIII.



561

560. *Epilobium montanum* L. | Epilobi muntanyenc. -. Épilobe des montagnes. Broad-leaved willowherb. HERB(c,v)/BOSC(h). 1240-1780 m. cc.VI-VII.

561. *Epilobium parviflorum* Schreb. | Epilobi de flor petita. -. Épilobe à petites fleurs. Hoary willowherb. AQUA(j,cr,b). 1240-1600 m. c. VII-VIII.





562



565



563



568



564



568



Orobancàcies: 562-568

562. *Bartsia alpina* L. | Bàrstia alpina.  
*Bartsia alpina*. *Bartsie des Alpes*. *Alpine bartsia*  
AQU(m,f). 1820-2400 m. c. VI-VII.

563. *Euphrasia alpina* Lam. subsp. *alpina* [*E. alpina* subsp. *pulchra* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] |  
Eufràsia. *Eufrasia alpina*. *Euphraise des Alpes*.  
*Alpine eyebright*. PRAT(si). 2400 m. rrr. MED.

564. *Euphrasia hirtella* Reut. | Eufràsia.  
*Eufrasia*. *Euphraise hérissée*. -. PRAT(h). 1450-  
1710 m. c. VII-VIII.

565. *Euphrasia pectinata* Ten. [*E. stricta* var.  
*pectinata* (Ten.) O. Bolòs & Vigo] | Eufràsia.  
*Eufrasia*. *Euphraise pectinée*. -. PRAT(h). 1260-  
1550 m. r. VI-VIII.

566. *Lathraea squamaria* L. | Esquamària.  
*Escuamaria*. *Clandestine écaïlleuse*. *Great*  
*toothwort*. BOSC(h). 1340 m rrr. VI.

567. *Odontites cebennensis* Coste & Soulié  
[*O. lanceolatus* subsp. *olotensis* (Cadevall) O. Bolòs  
& Vigo] | -. -. *Euphraise d'Olot*. -. PRAT(ca).  
1200.1480 m. r. VIII-IX.

568. *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort.  
subsp. *vernus* | -. -. *Euphraise rouge*. *Red*  
*bartsia*. PRAT(h)/AQUA(j). 1230-1480 m. c.  
VI-VIII.







569. *Orobanche hederae* Duby | Frare de l'heura. Espàrrago de lobo. Orobanche du lierre. Ivy broomrape. BOSC/ROC(m) (*Hedera helix*). 1220-1430 m. r. VII.

570. *Orobanche rapum-genistae* Thuill. | Frare de ginesta. Espàrrago de lobo. Orobanche du genêt. Greater broomrape. MAT(g,bg)/PRAT (*Cytisus scoparius*, *Cytisus oromediterraneus*) 1220-1720 m. c. VI-VII. MED.

571. *Orobanche reticulata* Wallr. | Frare de cardassa. Jopo. Orobanche réticulée. Thistle broomrape. RUD/PRAT (*Cirsium eriophorum*). 1620-1780 m. rrr. VII. AM.









572. *Orobanche amethystea* Thuill. | Frare.  
-. *Orobanche couleur d'améthyste*. -. PRAT  
(*Eryngium*). 1340 m-1380 m. r. VI-VII.

573. *Orobanche gracilis* Sm. [*O. crinita* auct.]  
| Frare gràcil. -. *Orobanche grêle*. -. PRAT  
(fabàcies). 1230-1880 m. cc. VI-VII.

574. *Orobanche minor* Sm. | Frare. *Rabo de lobo*. *Orobanche du trèfle*. *Common Broomrape*. PRAT (*Trifolium*). 1240-1520 m. cc. VI-VII.

575. *Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják  
subsp. *purpurea* [*Orobanche purpurea* Jacq.]  
| Frare. *Dedal azul de viuda*. *Orobanche pourpre*. *Purple broomrape*. PRAT(t) (*Achillea millefolium*). 1240 m. rrr. VI.









576. *Pedicularis comosa* L. subsp. *comosa*

| *Pedicularis comosa*. Gallarito amarillo.

*Pédiculaire chevelue*. Crested lousewort

PRAT(s)/HERB(m). 1550-2300 m. c. VI-VII.

577. *Pedicularis foliosa* L. subsp. *foliosa* |

*Pedicularis foliosa*. Gallarito folioso. *Pédiculaire*

*feuillée*. Leafy lousewort. HERB(m). 1560-2000

m. rr. VI-VII.

578. *Pedicularis pyrenaica* J. Gay |

*Pedicularis pirinenca*. Felguera de puerto.

*Pédiculaire des Pyrénées*. Pyrenean lousewort.

PRAT(ac). 1660-2800 m. cc. VI-VIII.

579. *Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica*

| *Pedicularis selvàtica*. Gallarito. *Pédiculaire*

*des bois*. Common lousewort. PRAT(h)/

AQUA(m). 1300-1880 m. r. VI-VII.

580. *Melampyrum pratense* L. subsp. *pratense*

[*M. pratense* subsp. *alpestre* Ronniger, nom. illeg]

| Xuclador. Trigo de vaca. *Mélampyre des prés*.

Cow-wheat. BOSC(ac). 1200-2140 m. cc. VI-VIII.



581. *Rhinanthus pumilus* (Sterneck) Pau

subsp. *pumilus* [*Rh. mediterraneus* (Sterneck) Sen-

nen] | Esquellada. Cascabelera. *Rhinanthe nain*.

-. PRAT(h). 1200-1880 m. cc. VI-VIII. MED/

ALI(animal)/AUS/TOX.







582. *Oxalis acetosella* L. subsp. *acetosella*  
| Pa amb peixet. *Acederilla*. *Pain de coucou*.  
*Cuckoo bread*, *Woodsorrel*. BOSC(h,br). 1230-  
2020 m. ALI.

583. *Oxalis corniculata* L. | Agrella.  
*Acederilla*. *Oxalide corniculée*. *Procumbent*  
*yellow-sorrel*. RUD/ROC(m). 1200-1420 m. c.  
VI-VII.

584. *Oxalis debilis* Kunth [*O. debilis* subsp.  
*corymbosa* (DC.) O. Bolos & Vigo] | -. -. *Oxalide*  
*chétive*. *Pink shamrock*. ARV/RUD. 1260-1320  
m. rr. VI. AL/AC.

585. *Oxalis latifolia* Kunth | Pa de cucut de  
fulla ampla. *Aleluya*. *Oxalide à larges feuilles*.  
*Garden pink-sorrel*. RUD(t). 1240 m. rrr. VI.  
AL/NAT.

586. *Oxalis vallicola* (Rose) R. Kunth | -. -. -. -.  
RUD(t). 1240-1360 m. rr. VI. AL/NAT.









587. *Chelidonium majus* L. | Lletdeteresa/Herba de les orenetes. *Celidonia*. Grande chélidoine. Greater celandine. RUD(h). 1200-1450 m. c. V-VII. MED/ALI(animal)/TOX.

588. *Corydalis solida* (L.) Clairv. subsp. *solida* | Estisores, Estisorettes, Tisorettes Coridal. *Corydale à bulbe plein*. Fumewort. BOSC(h)/HERB(v). 1500 m. rrr. IV-V.


589. *Fumaria officinalis* L. subsp. *officinalis* | Fumària. Palomilla. Fumeterre officinale. Fumitory. ARV/RUD/ROC(m). 1240-1380 m. rr.

590. *Papaver alpinum* L. [*P. aurantiacum* Loisel., *P. rhaeticum* Leresche; *P. lapeyrousianum* Greuter & Burdet; *P. alpinum* subsp. *suaveolens* P. Fourn.) O. Bolòs & Vigo]. | Paramà alpí. -. *Pavot des Alpes*. *Alpine poppy*. ROC(t). 1920-2700 m. c. VI-VIII. PRO.

591. *Papaver rhoeas* L. | Galleret, rosella. *Amapola*. *Coquelicot*. *Common poppy*. ARV/RUD. 1200-2000 m. c. VI-VIII. MED/ALI/AUS/TOX.









*Plantaginàcies: 592-595*

592. *Antirrhinum majus* L. subsp. *majus*  
| Gossos, cucuts. Conejitos. Grand mufler.  
Snapdragon. ROC(r,m). 1200-1680 m. c. VI-  
VIII. MED/ALI/AUS.

593. *Asarina procumbens* Mill. [*Antirrhinum*  
*asarina* L.] | Asarina. Asarina. Asarine couchée.  
Creeping snapdragon. ROC(r,si). 1220-2460 m.  
IV-IX. TOX.

594. *Chaenorhinum minus* (L.) Lange subsp.  
*minus* | -. -. Petite linare. Small toadflax.  
ROC(t)/ARV. 1220-2080 m. c. VI-VIII.

595. *Misopates orontium* (L.) Raf.  
[*Antirrhinum orontium* L.] | -. -. Mufler des  
champs. Weasel's snout. RUD(t). 1230 m. rrr.  
VI.









596. *Cymbalaria muralis* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. *muralis* | Picardia. *Palomilla de muro*. *Cymbalaire des murs*. *Ivy-leaved toadflax*. ROC(m). 1230-1260 m. r. V-VIII. AL/NAT.

597. *Digitalis lutea* L. subsp. *lutea* | Didalera groga. *Digital amarilla*. *Digitale jaune*. *Yellow foxglove*. HERB(v,cl,m,h). 1200-1960 m. cc. VI-VIII. MED/TOX.

598. *Erinus alpinus* L. | Erinus. -. *Érine des Alpes*. *Fairy foxglove*. ROC(ca). 1420-2200. rr. VI-VII.


599. *Globularia cordifolia* L. | Lluqueta. *Hierba negra*. *Globulaire à feuilles cordées*. *Matted globularia*. ROC(r,ca). 1200-2200 m. cc. V-VII. MED.

600. *Globularia repens* Lam. [*G. cordifolia* subsp. *repens* (Lam.) Wettst.] | Lluqueta de roca. *Hierba negra*. *Globulaire naine*. *Creeping globularia*. ROC(r,ca). 1230-2650 m. cc. V-VIII. MED.



601. *Globularia vulgaris* L. | Senet de pobre. *Globularia mayor*. *Globulaire commune*. *Common globularia*. PRAT(s). 1450 m. rrr. V. MED/AUS.









606



609

*Plantaginàcies: 602-609*

602. *Plantago argentea* Chaix | Plantatge argentí. -. *Plantain argenté*. -. PRAT(s,ca). 1740-1800 m. rr. VI-VII.

603. *Plantago lanceolata* L. | Plantatge, plantatge llarg, plantatge estret/Plantatge de fulla estreta. *Llantén de hojas estrechas*. *Plantain lancéolé*. *Ribwort plantain*. RUD/PRAT(t). 1200-2150 m. cc. V-X. MED/ALI.

604. *Plantago major* L. subsp. *major* | Plantatge, plantatge rodó/Plantatge gros. *Llantén mayor*. *Grand plantain*. *Greater plantain*. RUD(t)/PRAT(t). ccc. 1200-2000 m. VII-X. MED/ALI.

605. *Plantago media* L. | Plantatge/Plantatge mitjà. *Llantén medio*. *Plantain blanc*. *Hairy plantain*. PRAT(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII. MED/ALI.

606. *Plantago monosperma* Pourr. subsp. *monosperma* | Plantatge monosperm. *Llantén pirenaico*. *Plantain à une graine*. *Buckhorn plantain*. PRAT/ROC(t). 1720-2750 m. cc. VI-VIII.

607. *Plantago maritima* L. subsp. *serpentina* (All.) Arcang. | *Pedrenca serpentina*. -. *Plantain serpentant*. *Fleshy plantain*. ROC(h)/PRAT(h). 1560 m. rrr. VI.

608. *Plantago sempervirens* Crantz [*P. cynops* L.] | Plantatge de ca. *Zaragatona mayor*. *Plantain toujours vert*. *Evergreen plantain*. PRAT(s). 1460-1980 m. rrr. V-VIII. MED/ALI(animal)/AUS.

609. *Plantago subulata* L. [*P. holosteum* Scop., *P. subulata* subsp. *holosteum* (Scop.) O. Bolòs & Vigo] | *Pedrenca de prat*. -. *Plantain à feuilles en alène*. -. PRAT(a)/ROC(r). 1300-1780 m. r. VI-VII. MED/ALI(animal).



608





610



611



611



612



614



613



617

*Plantaginàcies: 610-617*



615



616

610. *Veronica alpina* L. | Verònica alpina. -. Véronique des Alpes. -. AQUA(c). 2000-2600 m. r. VII-VIII.

611. *Veronica anagallis-aquatica* L. subsp. *anagallis-aquatica* | Herba de folls. Berula. Véronique mouron d'eau. Water speedwell. AQUA(cr). 1200-1520 m. rr. V-VIII. ALI.

612. *Veronica arvensis* L. | Verònica arvense. -. Véronique des champs. Wall speedwell. ARV/ PRAT(a). 1240-2080 m. cc. V-VIII.

613. *Veronica beccabunga* L. subsp. *beccabunga* | Creixen de cavall. Verònica de agua. Véronique des ruisseaux. Brooklime. AQUA(cr). 1200-2280 m. cc. V-IX.

614. *Veronica bellidioides* L. | Verònica bel-lidioide. -. Véronique fausse pâquerette. Violet speedwell. PRAT(s). 1940-2740 m. c. VI-VIII.

615. *Veronica chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys* | Verònica camedris. Verònica de bosque. Véronique petit-chêne. Germander speedwell. BOSC(h)/HERB(h,v,m). 1220-2080 m. cc. VI-VIII.

616. *Veronica fruticans* Jacq. subsp. *fruticans* [*Veronica fruticulosa* L. subsp. *saxatilis* (Scop.) Arcang.] | Verònica fruticulosa. Verònica de las rocas. Véronique des rochers. Rock speedwell. PRAT(s). 1550-2760 m. cc. VII-VIII.

617. *Veronica montana* L. | Verònica de muntanya. -. Véronique des montagnes. Wood speedwell. 1200-1600 m. rr. V-VI.





618



622



619



624



620



620



618. *Veronica officinalis* L. | Herba de Santa Caterina/Verònica oficinal. *Verónica macho*. *Véronique officinale*. *Common speedwell*. BOSC/MAT/PRAT(ac). 1220-2120 mm. cc. VI-VIII. MED.

619. *Veronica orsiniana* Ten. [*V. austriaca* subsp. *teucrium* sensu O. Bolòs & Vigo] | Verònica austriaca. -. *Véronique germandrée*. -. PRAT(s). 1220-1920 m. cc. VI-VIII.

620. *Veronica persica* Poir. | Blauet/Verònica pèrsica. *Borroncillo*. *Véronique commune*. *Common field speedwell*. ARV/RUD. 1220-1380 m. r. IV-VI. MED. AL/NAT.

621. *Veronica pona* Gouan | Verònica de Pona. *Verónica pirenaica*. *Véronique de Gouan*. *Spiked Pyrenean speedwell*. AQUA(f). 1680-2180 m. c. VI-VIII.

622. *Veronica serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia* [*V. serpyllifolia* subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme] | Herba de l'ull, herba del mal d'ull/Verònica serpil·lifòlia. *Verónica de prado*. *Véronique à feuilles de serpolet*. *Thymeleaf speedwell*. RUD(t). 1320-2080 m. c. VI-VII. MED.


623. *Veronica spicata* L. subsp. *spicata* | Verònica d'espiga. -. *Véronique en épi*. *Spiked speedwell*. PRAT(s). 1900-2380 m. rrr. VII-VIII. AME.

624. *Veronica urticifolia* Jacq. | Verònica latifòlia. -. *Véronique à feuilles d'ortie*. *Nettle-leaved speedwell*. BOSC(h)/ROC(h). 1220-1800 m. cc. VI-VIII.









625. *Veronica triphyllos* L. | Verònica trifil·la. -. Véronique digitée. Fingered speedwell. ARV. 1260 m. rrr. V. AL/AC.

626. *Linaria alpina* L. subsp. *alpina* | Linària alpina. *Linaria alpina*. *Linaire des Alpes*. *Alpine toadflax*. ROC(t). 1880-2680 m. c. VI-VIII.

627. *Linaria arvensis* (L.) Desf. | Linària arvense. -. *Linaire des champs*. -. ARV/PRAT(r). 1420 m. rrr. VI.

628. *Linaria repens* (L.) Mill. | Linària estriada. *Linaria blanca*. *Linaire rampante*. *Striped toadflax*. ROC(t). 1550-2120 m. c. VI-VIII.

629. *Linaria supina* (L.) Chaz. subsp. *supina* | Linària supina. Mosquitas doradas. *Linaire couchée*. *Prostrate toadflax*. ROC(t)/ARV. 1340-2020 m. r. VI-VIII.









*Plumbaginàcies: 630-632; Poligalàcies: 633-634;  
Poligonàcies: 635-636*

630. *Armeria alpina* Willd. [*A. maritima* subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva] | Gasó alpi. *Mermasangre. Arméria des Alpes. Alpine thrift.* PRAT(ac). 2040-2700 m. c. VI-VIII.

631. *Armeria arenaria* (Pers.) Schult. subsp. *arenaria* [*A. alliacea* subsp. *bupleuroides* (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo; *A. alliacea* subsp. *plantaginea* (All.) O. Bolòs & Vigo] | Gasó al·liaci. *Armeria arenaria. Arméria faux buplèvre. Plantain-leaved thrift.* PRAT. 1280-2100 m. cc. VI-VIII. MED.

632. *Armeria muelleri* Huet [*A. maritima* subsp. *muelleri* (A. Huet) O. Bolòs & Vigo] | Gasó alpi. -. *Arméria de Müller. -. PRAT(si). 2220-2700 m. c. VII-VIII.*

633. *Polygala calcarea* F.W. Schultz | Herba blava (s/c). *Lechera amarga. Polygale du calcaire. Chalk milkwort.* PRAT(s). 1450-2200 m. c. V-VI. MED/ALI/AUS.


634. *Polygala vulgaris* L. | Polígala vulgar. -. *Polygale commun. Common milkwort.* PRAT(ac). 1240-2100 m. cc. VI-VIII. MED.

635. *Persicaria bistorta* (L.) Samp. subsp. *bistorta* [*Polygonum bistorta* L. subsp. *bistorta*] | Bistorta. *Bistorta. Bistorte. Bistort.* PRAT(h)/AQUA/HERB(m). 1300-2180 m. cc. VI-VIII. MED/ALI.

636. *Persicaria vivipara* (L.) Ronse Decr. [*Polygonum viviparum* L.] | Bistorta vivípara. *Bistorta vivípara. Renouée vivipare. Viviparous bistort.* PRAT/HERB/MAT. 1700-2720 m. c. VI-VII.











*Polygonàcies: 637-642*



637. *Koenigia alpina* (All.) T.M.Schust. & Reveal [*Polygonum alpinum* L.] | Presseguera alpina. *Polígono alpino*. *Renouée des Alpes*. Alpine knotweed. HERB(c,si). 1520-2460 m. c. VI-VIII.

638. *Persicaria amphibia* (L.) Delarbre [*Polygonum amphibium* L.] | Presseguera amfibia. *Persicaria anfibia*. *Renouée amphibie*. Willow grass. AQUA(cr). 1260 m. rrr. VII.

639. *Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre | Pebre d'aigua. *Persicaria picante*. *Poivre d'eau*. Water pepper. AQUA(j,cr). 1240-1480 m. rr. VII-VIII.

640. *Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre [*Polygonum lapathifolium* L.] | Presseguera borda. -. *Renouée à feuilles d'oseille*. Curlytop knotweed. AQUA. 1220-1280 m. rr. VII.

641. *Persicaria maculosa* Gray [*Polygonum persicaria* L.] | Herba presseguera. *Persicaria*. *Persicaire*. Willow weed. RUD/ARV. 1220-1780 m. r. VI-VIII.

642. *Oxyria digyna* (L.) Hill | Oxíria. -. *Oxyria à deux styles*. Mountain sorrel. ROC(t). 2020-2700 m. r. VII-VIII.









- Polygonàcies: 643-648*
643. *Polygonum aviculare* L. | Passacamins. Centinodia. Renouée des oiseaux. Common knotgrass. RUD(t). 1200-2020 m. cc. VI-VIII. MED/ALI(animal).
644. *Fallopia baldschuanica* (Regel) Holub [F. aubertii (L. Henry) Holub] | Vinya del Tibet. -. Renouée de Chine. -. MAT(b). 1220-1240 m. rrr. VI. AL/INV.
645. *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve [Polygonum convolvulus L.] | Fajol bord. Albohol. Renouée liseron. Russian vine. ARV/RUD. 1220-1500 m. c. VI-VII. MED.
646. *Fallopia dumetorum* (L.) Holub | Fajol de bardissa. Polígono trepador. Renouée des haies. Copse-bindweed. MAT(b). 1230-1490 m. rr. VI-VII.
647. *Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr. [Reynoutria japonica Houtt.] | -. Hierba nudosa japonesa. Renouée à feuilles pointues. Japanese knotweed. AQUA(h). 1240 m. rrr. AL/INV ER.
648. *Rumex scutatus* L. | Badola/Agrella. Acedera romana. Oseille ronde. Shield dock. ROC(t). 1220-2050 m. cc. VI-VIII. MED/ALI.











649. *Rumex acetosa* L. subsp. *acetosa* | Xiscoll/Agrella. *Acedera*. *Grande oseille*. *Common sorrel*. PRAT(h). 1240-2080 m. cc. V-VII. MED/ALI/AUS.

650. *Rumex acetosella* L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. | Agrelleta. *Acederilla*. *Petite oseille des Pyrénées*. *Sheep's sorrel*. PRAT(a). 1240-2480 m. c. V-VII. MED/ALI.

651. *Rumex arifolius* All. [*R. acetosa* subsp. *amplexicaulis* (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo] | Agrella. *Ruibarbo bastardo*. *Oseille à feuilles d'arum*. *Mountain dock*. HERB(m). 1780-2200 m. r. VI-VIII.

652. *Rumex conglomeratus* Murray | Paradella conglomerada. *Romaza*. *Oseille agglomérée*. *Clustered dock*. AQUA(j,cr)/RUD(h,h). 1240-1540 m. r. VI-VIII. MED.

653. *Rumex crispus* L. | Paradella crespa. *Romaza*. *Oseille crépue*. *Curled dock*. RUD(t)/HERB(rud). 1220-2080 m. ccc. VI-VIII. MED/ALI/AUS/TOX.



654. *Rumex obtusifolius* L. | Llengua de bou. *Romaza de hoja grande*. *Patience sauvage*. *Broad-leaved dock*. RUD(h). 1220-2000 m. cc. VII.VIII. MED/ALI.

655. *Rumex pulcher* L. subsp. *pulcher* | Paradella mollerosa. *Romaza menor*. *Oseille gracieuse*. *Fiddle dock*. RUD(t). 1220-1350 m. rr. VII-VIII. MED/ALI.

