



Portulacàcies: 656; *Primulàcies:* 657-664

656. *Portulaca oleracea* L. | Verdolaga (s/c). Verdolaga. Pourpier maraîcher. Green purslane. RUD(t). 1220-1450 m. r. V-VI.
657. *Androsace argentea* (C.F. Gaertn.) Lapeyr. [*A. vandellii* auct., non Chiov.] | Androsace imbricada. -. *Androsace imbriquée*. -. ROC(r,si). 1700-2380 m. c. VI-VII.
658. *Androsace halleri* L. subsp. *nuria* Schönsw. & Schneew. [*A. halleri* auct., non L.] | Androsace càrnia. -. -. PRAT. 1980-2750 m. r. VI-VII. AM.
659. *Androsace villosa* L. subsp. *villosa* | Androsace pelosa. -. *Androsace velue*. Rock jasmin. PRAT(r,ca). 1600-2640 m. cc. V-VII.
660. *Primula integrifolia* L. | Primula integrifòlia. Primula alpina. Primevère à feuilles entières. Entire-leaved primrose. PRAT(si). 1740-2640 m. cc. V-VII.
661. *Primula intricata* Gren. & Godr. [*P. elatior* (L.) L. subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer] | Primula gran. Primavera. Primevère intriquée. Oxslip. PRAT. 1220-2200 m. c. V-VI.
662. *Primula latifolia* Lapeyr. subsp. *latifolia* | Primula latifòlia. Primavera de hojas grandes. Primevère à larges feuilles. Viscid primrose. ROC(si). 1500-2700 m. cc. VI-VII.
663. *Primula veris* L. [*P. veris* L. subsp. *columnae* (Ten.) Maire et Petitm.] | Cucut/Primula vera. Primula común. Primevère de Colonna. Cowslip. BOSC(s)/HERB(v,s). cc. 1300-1980 m. V-VI. MED/AUS.
664. *Soldanella alpina* L. subsp. *alpina* | Soldanel·la alpina. Soldanella alpina. Soldanella des Alpes. Alpine snowbell. AQU(c,m)/PRAT(h). 1520-2500 m. c. V-VII.





670



667

Primulàcies: 665; Rannàcies: 666-668; Ranunculàcies: 669-671

665. *Lysimachia foemina* (Mill.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis foemina* Mill.; *A. arvensis* subsp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell.] | Morró blau. Morrón. Mouron des champs. Common pimpernel. RUD. 1200-1540 m. c. V-X. MED/ALI(animal)/AUS/TOX.

666. *Atadinus alpinus* (L.) Raf. [*Rhamnus alpina* L.] | Púdol. - Nerprun des Alpes. Alpine buckthorn. ROC(r,t,ca).1400-2200 m. c. V-VI. MED/ALI(animal)/AUS.

667. *Atadinus pumilus* (Turra) Hauenschild [*Rhamnus pumila* Turra] | Púdol menut. - Nerprun nain. Dwarf buckthorn. ROC(ca).1600-2500 m. rr. V-VII. MED.

668. *Frangula alnus* Mill. subsp. *alnus* | Fràngula. Arraclán. Bourdaine. Alder buckthorn. BOSC(h,br)/MAT(b). 1220-1400 m. rr. V-VI. MED.

669. *Aconitum anthora* L. | Tora groga (s/c). Acónito amarillo. Aconit anthere. Yellow monkshood. HERB(m)/PRAT(h)(ca). 1620-1840 m. rr. VIII-IX. TOX.

670. *Aconitum napellus* L. subsp. *vulgare* Rouy & Foucaud. | Tora, tora blava (s/c). Acónito azul. Aconit commun. Common monkshood. HERB(m). 1380-2600 m. ccc. VII-IX. MED/AUS/TOX.

671. *Aconitum lycoctonum* L. [*A. vulparia* subsp. *ranunculifolium* (Rchb.) M. Lainz; *A. pyrenaicum* subsp. *lamarckii* (Rchb.) O. Bolós & Vigo] | Tora pirinenca. Hierba lobuna. Aconit tue-loup. Wolfsbane. HERB(m,c). 1200-2500 m. c. VII-IX. TOX.



671





673

672. *Actaea spicata* L. | Herba de Sant Cristòfol. Yerba de San Cristóbal. Herbe de Saint Christophe. Baneberry. BOSC(h). 1440-1720 m. rr. VI-VII.

673. *Aquilegia vulgaris* L. | Campana/ Corniol. Aguileña. Ancolie commune. Columbine. BOSC(h)/HERB(v,m). 1200-2140 m. cc. V-VII. MED/AUS/TOX.

674. *Clematis recta* L. | Herba bormera. Clemátide recta. Clématite dressée. -. HERB(v,h)/ BOSC(br). 1225 m. rrr. VI-VII.

675. *Clematis vitalba* L. | Ridorta/Vidalba. Hierba de los pordioseros. Clématite des haies. Evergreen clematis. 1200-1500. c. VI-VII. MED/ ALI/AUS/TOX.

676. *Delphinium montanum* DC. [*D. elatum* subsp. *montanum* (DC.) Nyman; *D. elatum* auct.] | Esperó de muntanya. -. Dauphinelle des montagnes. Mountain larkspur. ROC(t)/ HERB(m). 1640-2650 m. rr. PRO.

677. *Helleborus foetidus* L. Marxívol. Heléboro común. Ellébore fétide. Stinking hellebore. BOSC(s). 1200-1880 m. cc. IV. MED/AUS/TOX.

678. *Helleborus viridis* L. subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffn. El-lèbor verd. Eléboro verde. Ellébore vert. Green hellebore. BOSC(h,br). 1240-2020 m. cc. III-IV. MED/AUS/TOX.



676



676





Ranunculàcies: 679-685



679. *Adonis aestivalis* L. subsp. *aestivalis* | Ull de perdiu. -. *Adonis d'été*. Pheasant's-eye. ARV. 1300 m. rrr. VI. AL/AC.

680. *Adonis pyrenaica* DC. | Adonis pirinenc. -. *Adonis des Pyrénées*. -. ROC(r,t). 1800-2500 m. rr. VI-VII.

681. *Anemone nemorosa* L. | Búixol. *Anémone de los bosques*. *Anémone des bois*. Wood anemone. BOSC(h,br). 1250-1580 m. r. IV-VI.

682. *Anemone ranunculoides* L. | Búixol groc. *Anémone fausse renoncule*. Yellow anemone. BOSC(h,br). 1250-1400 m. rrr. IV-V.




683. *Hepatica nobilis* Schreb. [*Anemone hepatica* L.] | Herba fetgera/Viola de llop. *Hepática*. *Anémone hépatique*. *Hepatica*, *Kidneywort*. BOSC. 1200-2000 m. cc. IV-VI. MED/ALI/AUS/TOX.

684. *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman [*Anemone alpina* L. subsp. *apiifolia* (Scop.) O. Bolòs & Vigo] | Herba del vent. *Pulsatilla*. *Pulsatille souffrée*. *Alpine pasqueflower*. PRAT/BOSC(si). 1620-2650 m. cc. VI-VII.

685. *Pulsatilla vernalis* (L.) Mill. [*Anemone vernalis* L.] | Anèmone vernal. -. *Pulsatille printanière*. *Spring pasqueflower*. PRAT(si). 1800-2720 m. c. V-VI. AUS.





Ranunculàcies: 686-692

686. *Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Laínz
 | Gata rabiosa/Botó d'or. Botón de oro de bosque. -. Meadow
 buttercup. PRAT/AQUA(h). 1200-2080 m. cc. V-VII. TOX.

687. *Ranunculus bulbosus* L. subsp. *bulbosus*
 | Gata rabiosa/Ranuncle bulbós. Botón de oro
 peloso. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup.
 PRAT. 1200-2180 m. ccc. V-VIII. TOX.

688. *Ranunculus envalirensis* Grau [R.
auricomus auct., p.p.] | Ranuncle daurat. -.
 Renoncule d'Envalira. Goldilocks buttercup.
 PRAT/BOSC(h). 1600-2450 m. cc. V-VII.

689. *Ranunculus flammula* L. | Mataanyells.
 -. Renoncule flammette. Lesser spearwort.
 AQUA(f)/BOSC(br). 1320-1380 m. rrr. VIII.

690. *Ranunculus repens* L. | Botó d'or repent.
 Botón de oro reptante. Renoncule rampante.
 Creeping buttercup. PRAT(t)/RUD(t). 1200-
 2080 m. ccc. V-VII.

691. *Ranunculus tuberosus* Lapeyr. [R. *serpens*
 Schrank subsp. *nemosus* (DC.) G. López] | -.
 Botón de oro tuberoso. Renoncule des bois. -.
 BOSC(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.

692. *Trollius europaeus* L. | Cloclou o flor
 de Sant Pere/Rovell d'ou. Calderones. Trolle.
 Globeflower. PRAT(h)/HERB(m)/AQUA(f).
 1220-2230 m. c. VI-VII. MED/AUS/TOX.





Ranunculàcies: 693-700

693. *Caltha palustris* L. | Calta. Calta. *Caltha des marais*. Marsh marigold. AQUA(f,m). 1220-2200 m. cc.V-VI.

694. *Ficaria verna* Huds. subsp. *verna* [*Ranunculus ficaria* L.] | Gatassa. *Celidonia menor*. Ficaire. Lesser celandine. BOSC(h,br). 1220-1600 m. rr. IV-V. MED.

695. *Ranunculus arvensis* L. | Ranuncle arvense. -. *Renoncule des champs*. Field buttercup. ARV. 1260-1280 m. r. VI-VII. MED.




696. *Ranunculus gramineus* L. | Ranuncle de codina. -. *Ranuncule à feuilles de graminée*. Grass-leaved buttercup. 1720 m. rrr. VI.

697. *Ranunculus hederaceus* L. | -. -. *Renoncule lierre*. Ivy-leaved crowfoot. AQUA(f). 1480 m. rrr. VI. AME.

698. *Ranunculus parnassifolius* L. subsp. *parnassifolius* | Herba del mal gra/Herba del mal gra. -. *Renoncule à feuilles de parnassie*. Parnassus-leaved buttercup. 1920-2780 m. c. VI-VII. MED/ALI(animal).

699. *Ranunculus pyrenaicus* L. | Ranuncle pirinenc. -. *Renoncule des Pyrénées*. Pyrenean buttercup. PRAT(h,si). 2000-2640 m. cc. V-VII.

700. *Ranunculus platanifolius* L. [*R. aconitifolius* subsp. *platanifolius* (L.) Rikli] | Ranuncle platanifoli. *Ranúnculo hoja de platanero*. *Renoncule à feuilles de platane*. Large white buttercup. HERB(m). 1430-1890 m. r. VI-VII.





705



706



707



708

Ranunculàcies: 701-703; Resedàcies: 704-708

701. *Thalictrum aquilegifolium* L. | Talictre aquilegífoli. Talictro de bosque. Colombine panachée. Great meadow-rue. HERB(m)/PRAT(h). 1280-2040 m. r. VI-VII. TOX.

702. *Thalictrum minus* L. subsp. *saxatile* [T. minus L.] | Gata rabiosa. Talictro de pedregal. Pygamon des Pyrénées. Lesser meadow-rue. HERB(v)/PRATS. 1200-2040 m. cc. VI-VIII.

703. *Thalictrum simplex* L. subsp. *simplex* [*Th. flavum* subsp. *simplex* (L.) O. Bolòs & Vigo; *Th. flavum* subsp. *flavum* sensu O. Bolòs & Vigo] | Ruibarbe de pobre. Ruibarbo de los pobres. Pigamon des rives. Common meadow rue. AQUA(j)/PRAT(h). 1470 m. rrr. VII. AME.

704. *Reseda glauca* L. | Reseda glauca. -. Réséda glauque. -. ROC(t,ca). 1900-2550 m. c. VI-VII.

705. *Reseda lutea* L. subsp. *lutea* | Gandaia. Gualdón. Réséda jaune. Wild mignonette. RUD(h). 1240-1480 m. r. VI-VIII. MED/TOX.


706. *Reseda luteola* L. subsp. *luteola* | Galda. Gualda. Réséda des teinturiers. Weld. RUD/ROC(t). 1230-1550 m. r. VI-VIII.

707. *Reseda phyteuma* L. subsp. *phyteuma* | Pebrots de ruc. Gualdilla. Réséda raiponce. Corn mignonette. ARV. 1240-1260 m. rrr. V-VI.

708. *Sesamoides interrupta* (Boreau) G. López [*Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze] | Astrocarp. -. Astérocarpe. -. ROC(t),PRAT(r). 2000-2660 m. r. VI-IX.



711



715



712




713



714



716



Rosàcies: 709-716

709. *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria* | Herba cuquera, herba del mal estrany/Agrimònia. -. *Aigremoine eupatoire*. *Agrimony*. HERB(v,c)/PRAT. 1200-1600 m. cc. VI-IX. MED/ALI/AUS.

710. *Agrimonia procera* Wallr. | -. -. *Aigremoine élevée*. *Fragrant agrimony*. HERB(v,h). 1240-1480 m. rr. VI-VII.

711. *Alchemilla alpina* L. | Peucrist o peu de rei/Alquemil-la alpina. *Pie de león alpino*. *Alchémille des Alpes*. *Alpine lady's mantle*. MAT(n)/PRAT(si). 1800-2600 m. c. VI-VII. MED.

712. *Alchemilla coriacea* Buser [*A. vulgaris* subsp. *coriacea* (Buser) E.G. Camus] | Pota de lleó. *Pie de león coriáceo*. *Alchémille coriace*. -. AQUA(f). 1500-2100. c. VI-VII.

713. *Alchemilla fissa* Günther & Schummel | -. -. *Alchémille fendue*. *Hairless lady's mantle*. AQUA(c). 2150-2500 m. rr. VIII-IX.

714. *Alchemilla flabellata* Buser [*A. hybrida* subsp. *flabellata* (Buser) Gams] | Pota de lleó. -. *Alchémille en éventail*. -. PRAT(h). 1200-2500 m. cc. VI-VIII.

715. *Alchemilla saxatilis* Buser [*A. alpina* subsp. *saxatilis* (Buser) E.G. Camus; *A. alpina* auct.] | Herba de plata. -. *Alchémille des rochers*. -. ROC(R)/PRAT/MAT(L). 1200-2700 m. cc. VI-VIII.

716. *Sibbaldia procumbens* L. | Sibàldia. -. *Sibbaldie couchée*. -. AQUA(c). 2100-2740 m. rr. VII-VIII.





717



718



717



720



719



719



721



723

Rosàcies: 717-723



721



722

717. *Aria edulis* (Willd.) M. Roem. [*Sorbus aria* (L.) Crantz] | Moixera (s/c). Mostajo. Alisier blanc. Whitebeam. BOSC(s). 1200-2050 m. V-VI. cc. MED/ALI.

718. *Sorbus aucuparia* L. subsp. *aucuparia* | Moixera de guilla. Serbal de cazadores. Sorbier des oiseleurs. Mountain ash. BOSC(per). 1280-2020 m. c. V-VII. MED/ALI/AUS.


719. *Crataegus monogyna* Jacq. | Arç blanc. Majuelo. Aubépine à un style. Hawthorn. MAT(b)/BOSC. 1200-1760 m. ccc. V-VI. MED/ALI/AUS/TOX.

720. *Malus sylvestris* (L.) Mill. [*Pyrus malus* L.] | Pomer. Manzano. Pommier des bois. Crab apple. MAT(b). 1200-1460 m. r. V-VI. MED/ALI/AUS.

721. *Prunus avium* (L.) L. | Cirer/Cirerer. Cerezo. Merisier. Wild cherry BOSC(h). 1200-1500 m. cc. IV-V. MED/ALI/AUS.

722. *Prunus domestica* L. | Pruner (s/c). Ciruelo. Prunier. Common plum. MAT(b). 1240-1450 m. r. IV-V. MED/ALI/AUS. AL/AC.

723. *Prunus spinosa* L. | Aranyoner. Espino negro. Épine noire. Blackthorn. MAT(b). 1200-1500 m. cc. IV-V.





Rosàcies: 724-729

724. *Aruncus dioicus* (Walter) Fernald | Barba de boc. Barba de cabra. Barbe de bouc. Buck's-beard. HERB(v). 1500 m. rrr. AM.

725. *Cotoneaster integerrimus* Medik. | Cornera. -. *Cotonéaster commun.* Wild cotoneaster. MAT(bg)/PRAT. 1450-2080 m. c. VI.

726. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. | Reina dels prats. Reina de los prados. Reine-des-prés. Meadow sweet. HERB(h,m). 1200-1680 m. cc. VII-VIII. MED/ALI/AUS.


727. *Filipendula vulgaris* Moench | Filipèndula. Filipèndula. Filipèndule commune. -. PRAT(h). 1640 m. rrr. VII.

728. *Poterium sanguisorba* L. subsp. *sanguisorba* [*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*] | Pimpinella (s/c). Pimpinella menor. Petite pimprenelle. Salad burnet. PRAT. 1200-2000 m. ccc. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

729. *Sanguisorba officinalis* L. | Pimpinella major. Sanguisorba mayor. Grande pimprenelle. Great burnet. PRAT(h). 1240-2100 m. c. VII-VIII. MED.







730. *Aphanes arvensis* L. | -. -. *Alchémille des champs. Parsley-piert.* PRAT(a)/ARV. 1020-1040 m. rrr. V.

731. *Dryas octopetala* L. subsp. *octopetala* | *Drias. -. Chênette. Mountain avens. ROC(t)/PRAT(r)/AQUA(c)* (ca). 2000-2750 m. c. VI-VII.

732. *Fragaria vesca* L. | *Maduixera (s/c). Fresa silvestre. Fraisier des bois. Wild strawberry.* HERB(v,cl). 1200-1840 m. ccc. V-VII. MED/ALI/AUS.

733. *Potentilla micrantha* DC. | *Fragassa de flor petita. -. Potentille à petites fleurs. -. MAT(g)/HERB(v).* 1260-1880 m. c. V-VII.

734. *Potentilla sterilis* (L.) Garcke | *Fragassa de bosc. Cincoenrama fresal. Potentille stérile. Pink barren strawberry.* BOSC(h). 1300-1400 m. r. IV-V.

735. *Geum montanum* L. | *Gèum muntanyenc. -. Benoîte des montagnes. Alpine avens.* PRAT(ac). 2000-2600 m. r. VII-VIII.

736. *Geum rivale* L. | *Gèum de ribera. -. Benoîte des ruisseaux. Water avens.* AQUA(f). 1780-1980 m. rr. VII-VIII.

737. *Geum urbanum* L. | *Herba de Sant Benet (s/c). Cariofilada común. Benoîte commune. Herb Bennet.* RUD(h)/BOSC(cl,br). 1200-2000 m. ccc. V-VIII. MED.







742

738. *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] | Potentil·la fruticosa. -. *Potentille arbustive*. *Shrubby cinquefoil*. AQUA(f,m). 1780-2180 m. r. VI-VIII. PRO.

739. *Potentilla argentea* L. | Potentil·la argentina. *Cincoenrama recortada*. *Potentille argentée*. *Hoary cinquefoil*. PRAT(r). 1260-1850 m. r. V-VIII.

740. *Potentilla crantzii* (Crantz) Fritsch | Potentil·la estipular. *Cincoenrama alpina*. *Potentille de Crantz*. *Alpine cinquefoil*. PRAT(s). 1600-2700 m. cc. VI-VIII.

741. *Potentilla erecta* (L.) Raeusch. | Tormentil·la. *Siete en rama*. *Potentille tormentille*. *Common tormentil*. PRAT/MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.

742. *Potentilla neumanniana* Rchb. | Flors de la fam. *Cincoenrama vernal*. *Potentille de Neumann*. -. PRAT(s). 1200-2000 m. cc. MED.

743. *Potentilla nivalis* Lapeyr. subsp. *nivalis* | Potentil·la nival. *Cincoenrama nival*. *Potentille des neiges*. *Snow cinquefoil*. ROC(r,t). 2220-2680 m. c. VII-IX.

744. *Potentilla recta* L. | Potentil·la recta. *Cincoenrama erguida*. *Potentille dressée*. *Sulphur cinquefoil*. PRAT(s,a). 1240-1440 m. rr. VI-VII. MED.

745. *Potentilla reptans* L. | Gram negre. *Cincoenrama*. *Potentille rampante*. *Creeping cinquefoil*. RUD. 1200-2000 m. cc. VI-VIII. MED.




743



744



745





752

746. *Rosa canina* L. | Roser de pastor/Roser caní. *Rosal silvestre*. *Églantier des chiens*. *Dog rose*. MAT(b). 1200-1880 m. c. VI-VIII. MED/ALI/AUS/TOX

747. *Rosa pendulina* L. [*R. alpina* L.] | Roser alpi. *Rosal alpino*. *Églantier des Alpes*. *Alpine rose*. MAT(n)/BOSC(per)/HERB(m). 1500-2200 m. cc. VI-VII. MED/ALI.

748. *Rubus caesius* L. | Romeguero (s/c). *Zarzamora reptante*. *Ronce bleu*. *Dewberry*. BOSC(br). 1200-1970 m. cc. V-VII. MED/ALI/AUS.

749. "*Rubus amplistipulus* Sudre [*R. godronii* Lecoq. & Lamotte subsp. *amplistipulus* Sudre]"⁽¹⁾ | -. -. -. MAT(b)/BOSC(h). 1220-1600 m. c. VI-VII.

750. *Rubus hirtus* Waldst. & Kit. [R. ser. *Glandulosi sensu* Bolòs & Vigo] | Esbarzer glandulós. -. *Ronce hérissée*. -. MAT(b)/BOSC(h). 1280-1480 m. rrr. VII-VIII.

751. *Rubus idaeus* L. | Jordonera/Gerdera. *Frambueso*. *Framboisier*. *Raspberry*. MAT(b)/HERB(c). 1200-2200 m. cc. V-VII. MED/ALI.

752. *Rubus saxatilis* L. | Esbarzer saxàtil. -. *Ronce des rochers*. -. BOSC(ca). 1725 m. rrr. VII. AM.

753. *Rubus ulmifolius* Schott [*R. discolor* auct., non Weihe et Nees] | Romeguera/Esbarzer. *Zarzamora*. *Ronce à feuilles d'orme*. *Bramble*. MAT(b). 1200-1575 m. cc. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

(1) Tàxon mal definit, inclòs dins de ser. *Discolores* (P.J. Mull.) Focke



750



753





754. *Asperula cynanchica* L. subsp. *cynanchica* [incl. *A. cynanchica* subsp. *brachysiphon* (Lange) O. Bolòs & Vigo] | Herba prima. *Esquinancia*. *Aspérule à l'esquinancie*. *Squinancywort*. ROC(r)/PRAT(R). 1340-1580 m. r. VII-VIII.

755. *Galium album* Mill. [*G. mollugo* subsp. *erectum* Syme] | Espunyidera blanca. -. *Caille-lait commun*. *White bedstraw*. PRAT(h). 1200-1480 m. r. VI-VIII.

756. *Galium aparine* L. | Rèvola/Apegalós. *Amor de hortelano*. *Gaillet accrochant*. *Cleavers*. ARV/RUD. 1200-2000 m. cc. V-VIII. MED/ALI(animal).

757. *Galium estebanii* Sennen [*G. pumilum* Murray subsp. *pinetorum* (Ehrend.) Vigo; *G. pinetorum* Ehrend.] | Espunyidella prima. -. -. *Slender bedstraw*. PRAT/MAT/BOSC. 1200-1900 m. cc. VI-VIII. MED.

758. *Galium lucidum* All. subsp. *lucidum* | Espunyidella blanca. -. -. HERB(v)/PRAT(a). 1200-1760 m. c. VI-VIII.



759. *Galium palustre* L. | Espunyidella palustre. *Galio de río*. *Gaillet des marais*. *Marsh bedstraw*. AQUA. 1340-1720 m. r. VI-VIII.






760. *Galium cometerhizon* Lapeyr. | Espunyidella de pedrusca. -. *Gaïllet à racines chevelues*. -. ROC(t). 2200-2870 m. c. VI-VIII.

761. *Galium maritimum* L. | Espunyidella peluda. -. *Gaïllet maritime*. -. HERB(v). 1200-1810 m. cc. VI-VIII.

762. *Galium odoratum* (L.) Scop. [*Asperula odorata* L.] | Espunyidella d'olor. -. *Aspérule odorante*. *Woodruff*. BOSC(h). 1700 m. rrr. VI. AM.

763. *Galium pyrenaicum* Gouan | Espunyidella pirinenca. -. *Gaïllet des Pyrénées*. *Pyrenean bedstraw*. PRAT, ROC(ca). 1850-2720 m. c. VI-VIII.





764




766



765



767



Rubiàcies: 764-767; Salicàcies: 768-770

764. *Cruciata glabra* (L.) Ehrend. [*Galium vernum* Scop.] | Te de bosc. *Cruciada glabra*. *Croisette glabre*. *Smooth crosswort*. PRAT/ROC/BOSC(h). 1200-2700 m. cc. V-VII.

765. *Cruciata laevipes* Opiz [*Galium cruciata* (L.) Scop.] | Creuera. *Cruzada*. *Croisette commune*. *Crosswort*. RUD. 1220-2020 m. c. V-VI.

766. *Galium verum* L. subsp. *verum* | Espunyidella groga. *Cuajaleche*. *Gaillet jaune*. *Lady's bedstraw*. PRAT(h). 1200-2290 m. cc. VI-IX. MED/AUS.

767. *Sherardia arvensis* L. | Rèvola borda. -. *Shérardie des champs*. *Field madder*. PRAT(a)/ROC(m). 1200 m. rr. VI.

768. *Salix herbacea* L. | Salenca herbàcia. -. *Saule herbacé*. *Dwarf willow*. AQUA(c). 2100-2680 m. r. VI-VII.

769. *Salix pyrenaica* Gouan | Salenca dels Pirineus. -. *Saule des Pyrénées*. *Pyrenean willow*. AQUA(c,f, ca). 2040-2200 m. rr. VI-VII.

770. *Salix retusa* L. | Salenca retusa. -. *Saule à feuilles rétuses*. *Blunt-leaved willow*. AQUA(c). 2000-2680 m. cc. VI-VII.





771



772



773



772



775



Salicàcies: 771-775


771. *Salix atrocinerea* Brot. [*S. cinerea* subsp. *oleifolia* Macgreith] | Gatsaule/Gatell. *Salguera*. Saule roux-cendré. Grey willow. BOSC(br). 1260-1700 m. c. IV-V. MED/AUS.

772. *Salix caprea* L. | Gatsaule (s/c). *Sauce cabruno*. Saule des chèvres. Goat willow. BOSC(h)/HERB(c)/ROC(t). 1200-2000 m. c. III-IV. AUS.

773. *Salix elaeagnos* Scop. | Sarga. *Sargatillo*. Saule drapé. Olive willow. BOSC(br)/AQUA. 1200-1600 m. r. IV-V. AUS.


774. *Salix purpurea* L. | Saucic. *Sauce rubión*. Saule pourpre. Purple willow. BOSC(br)/AQUA. 1220-1640 m. c. IV-V. MED/AUS/TOX.

775. *Salix* ×*fragilis* L. [*S. alba* × *S. euxina* I.V. Belyaeva; *S. x rubens* Schrank] | Salze blanc. *Sauce*. Saule fragile. Crack willow. BOSC(br). 1220-1680 m. r. IV-V. MED/AUS. AL/NAT.






777



776



777




776




776. *Populus ×canadensis* Moench. | Aure poll, pollangre/Pollancre. Álamo negro. *Peuplier noir*. *Canadian poplar*. BOSC(br). 1260-1620 m. cc. AUS. AL/INV.

777. *Populus nigra* L. | Pollancre. Álamo negro. *Peuplier noir*. *Black poplar*. BOSC(br). 1200-1550 m. r. III-IV. MED/ALI(animal)/AUS.

778. *Populus tremula* L. subsp. *tremula* | Trèmol (s/c). Álamo temblón. *Peuplier tremble*. *Aspen*. BOSC(h)/HERB(cl). 1240-1980 m. cc. IV-V. MED/ALI(animal)/AUS.







784



785



786



781

Santalàcies: 779-781; Sapindàcies: 782-786

779. *Thesium alpinum* L. subsp. *alpinum* | Tèsium alpi. Mimbrera roja. Thesium des Alpes. Alpine bastard toadflax. PRAT(h)/ROC(r). 1530-2120 m. r. VI-VII.

780. *Thesium humifusum* DC. [*T. divaricatum* Jan et Mert. et Koch in Röhling] | Tèsium divaricat. Tesio comú. Thesium couché. Branched bastard toadflax. PRAT/ROC(s). 1400-1720 m. VI-VII.

781. *Viscum album* L. subsp. *album* | Escarçí, Vesc. Muérdago. Gui des feuillus. Mistletoe. BOSC(h, sobre *Fraxinus excelsior*). 1340 m. rrr. VII.


782. *Acer campestre* L. | Auró blanc. Arce comú. Érable champêtre. Field maple. BOSC(h). 1200-1560 m. c. IV-V. AUS.

783. *Acer negundo* L. | Negund. Arce negundo. Érable negundo. Box elder. BOSC(br). 1200-1420 m. r. IV-V. AL/NAT.

784. *Acer opalus* Mill. subsp. *opalus* | Blada. Acirón. Érable à feuilles. Italian maple. BOSC(s). 1340-1450 m. rrr. IV-V.

785. *Acer platanoides* L. | Erable. Arce real. Érable plane. Norway maple. BOSC(br). 1200-1440 m. rr. IV. AL/NAT.

786. *Acer pseudoplatanus* L. | Fals plàtan. Arce sicómoro. Érable sycomore. Sycamore. BOSC(br). 1220 m. rrr. V. AL/NAT.





Saxifragàcies: 787-794

787. *Chrysosplenium oppositifolium* L. | Crisospleni. Hepática dorada. Dorine à feuilles opposées. Opposite-leaved golden-saxifrage. AQUA(f). 1200-1840 m. c. IV-V.

788. *Heuchera sanguinea* Engelm. | -. Flor de coral. Heuchère rouge sang. Coral flower. ROC(r). 1240 m. rrr. VII. AL/AC.

789. *Saxifraga aizoides* L. | Saxifraga groga. Saxifraga amarilla. Saxifrage faux orpin. Yellow mountain saxifrage. AQUA(f)/ROC(h). 1200-2760 m. c. VI-VIII.

790. *Saxifraga bryioides* L. | Saxifraga brioiide. -. Saxifrage d'Auvergne. Mossy saxifrage. ROC(r,t). 2100-2750 m. c. VII-VIII.

791. *Saxifraga granulata* L. subsp. *granulata* | Saxifraga granulosa. Saxifraga común. Saxifrage granulée. Meadow saxifrage. HERB(v). 1200-2200 m. cc. V-VII. MED.

792. *Saxifraga moschata* Wulfen [S. *moschata* subsp. *fastigiata* (Luizet) P. Fourn.] | Saxifraga moscada. -. Saxifrage musquée. White musky saxifrage. ROC(r,t)/PRAT(r). 2000-2780 m. cc. VII-VIII.

793. *Saxifraga pentadactylis* Lapeyr. subsp. *pentadactylis* | Saxifraga de cinc dits. -. Saxifrage à cinq doigts. Hairless mossy saxifrage. ROC(r,si). 2600-2750 m. r. VII-VIII.

794. *Saxifraga pubescens* Pourr. subsp. *pubescens* | Saxifraga pubescent. -. Saxifrage pubescente. Hairy saxifrage. ROC(r,t,si). 1550-2770 m. cc. VI-VII.








795. *Micranthes clusii* (Gouan) Fern. Prieto, V. Vázquez, Vallines & Cires [*Saxifraga clusii* Gouan] | -. -. *Saxifrage de Clusius*. French saxifrage. ROC(r,h). 2550 m. rrr. VIII. AM.

796. *Micranthes stellaris* (L.) Galasso, Banfi & Soldano subsp. *stellaris* [*Saxifraga stellaris* L.] | Saxifraga estelada. -. *Saxifrage étoilée*. Starry saxifrage. AQUA(f,m). 1600-2550 m. c. VI-VIII.

797. *Saxifraga aquatica* Lapeyr. | Enciam de font. -. *Saxifrage aquatique*. Water saxifrage. AQUA(f). 1900-2400 m. c. V-VIII. MED/ALI.

798. *Saxifraga geranioides* L. | Herba de les set sagnies/Saxifraga geranioides. -. *Saxifrage faux géranium*. Geranium-like saxifrage. ROC(t)/MAT(n)(si). 1900-2700 m. cc. VI-VIII. MED.



799. *Saxifraga media* Gouan | Saxífraga mitjana. -. *Saxifrage intermédiaire*. Reddish saxifrage. ROC(r,ca). 1550-2650 m. r. VI-VII.

800. *Saxifraga oppositifolia* L. subsp. *oppositifolia* | Saxífraga opositifòlia. *Saxifraga àrtica*. *Saxifrage à feuilles opposées*. Purple saxifrage. ROC(t,ca). 1840-2700 m. cc. V-VII.

801. *Saxifraga paniculata* Mill. subsp. *paniculata* | Corona de rei/Saxífraga paniculada. -. *Saxifrage paniculée*. Livelong saxifrage. ROC(r). 1200-2720 m. cc. VI-VIII. MED/TOX.






802



805



806



803



804



Solanàcies: 802-806; Timelaècies: 807-809

802. *Atropa belladonna* L. | Belladona. *Belladona*. *Belladone*. *Deadly nightshade*. RUD(t). 1250 m. rrr.
803. *Datura stramonium* L. | Herba talpera. *Estramonio*. *Datura officinal*. *Thorn apple*. ARV/RUD. 1260 m. rrr. AL/AC.
804. *Hyoscyamus niger* L. | Herba queixalera. *Beleño negro*. *Jusquiame noire*. *Henbane*. RUD(s). 1540 m. rrr. VI.
805. *Solanum dulcamara* L. | Dolçamara (s/c). *Dulcamara*. *Morelle douce-amère*. *Bittersweet*. BOSC(br,cl)/HERB(h). 1220-1420 m. rr. VI-VII. MED/TOX.
806. *Solanum nigrum* L. | Morella. *Hierba mora*. *Morelle noire*. *Black nightshade*. ARV/RUD(h). 1200-1600 m. rr. VI-IX. MED/ALI/TOX.
807. *Daphne laureola* L. subsp. *laureola* | Senet, senet bord/Lloreret. *Lauréola*. *Daphné lauréole*. *Spurge laurel*. BOSC(s). 1200-1540 m. c. IV-V. MED/AUS/TOX.
808. *Daphne mezereum* L. subsp. *mezereum* | Senet/Tintorell. *Lauréola hembra*. *Daphné bois-gentil*. *Mezereum*. BOSC(h)/HERB(m). 1400-2350 m. cc. V-VII. MED/TOX.
809. *Thymelaea dioica* (Gouan) All. | Bufalaga de roca. -. *Passerine dioïque*. -. ROC(r). 1370-2100 m. r. V-VII.





812

Ulmàcies: 810-811; Urticàcies: 812-813

810. *Ulmus glabra* Huds. | Om/Oma.
Olmo de montaña. Orme de montagne. Wych elm. BOSC(h,br). 1200-1460 m. r. IV. MED/ALI(animal)/AUS.



811. *Ulmus minor* Mill. | Om (s/c). Olmo. Petit orme. Field elm. BOSC(h,br). 1200-1480 m. rr. III-IV.

812. *Parietaria judaica* L. [*P. officinalis* L susp. *judaica* (L.) Béguinot] | Blet de paret/Morella roquera. *Parietaria*. *Pariétaire couchée*. Pellitory of the wall. RUD/ROC(m). 1200-1460 m. rr. MED/ALI/AUS/TOX.

813. *Urtica dioica* L. subsp. *dioica* | Otriga/Ortiga gran. *Ortiga mayor*. Grande ortie. Stinging nettle. RUD(h). 1200-2200 m. ccc. VI-VIII. MED/ALI/AUS/TOX.



813





814. *Valeriana apula* Pourr. [*V. globulariifolia* Ramond ex DC. in Lam. et DC.] | *Valeriana globularifolia*. - *Valériane à feuilles de globulaire*. - ROC(r, ca). 1800-2750 m. c. VI-VIII.

815. *Valeriana montana* L. | *Valeriana muntanyenca*. - *Valériane des montagnes*. - ROC(t,r,ca). 1200-2010 m. c. VI-VII.


816. *Valeriana officinalis* L. | *Valeriana (s/c)*. *Valeriana*. *Valériane*. *Common valerian*. HERB(v,h). 1200-2150 m. cc. V-VII. MED/AUS/TOX.

817. *Valeriana pyrenaica* L. | *Valeriana pirinenca*. - *Valériane des Pyrénées*. *Pyrenean valerian*. HERB(m)/AQUA. 1270-1700 m. rr. VII-VIII.

818. *Valeriana tripteris* L. subsp. *tripteris* | *Valeriana trisecta*. - *Valériane à trois folioles*. *Three-lobed valerian*. ROC(r,t,si). 1340-2320 m. c. VI-VII.



819. *Centranthus ruber* (L.) DC. subsp. *ruber* | *Herba de Sant Jordi*. *Centrantho*. *Centranthe rouge*. *Red valerian*. ROC(m)/HERB(v). 1220-1560 m. c. VI. AL/NAT.





823

820. *Verbena officinalis* L. | Berbena (s/c).
Verbena. *Verveine officinale*. *Vervain*. RUD(t).
1220-2000 m. c. VI-IX. MED/ALI/AUS.

821. *Viola alba* Besser subsp. *denhardtii*
(Ten.) W. Becker | Viola/Viola boscana.
Violeta. *Violette blanche*. *White violet*. BOSC(s)/
HERB(v). 1240-1550 m. c. IV. MED/ALI/AUS.

822. *Viola canina* L. [*V. canina* subsp. *montana*
(L.) Hartm.; *V. canina* subsp. *silvensis* (Font Quer)
O. Bolòs & Vigo] | Viola/Viola canina. *Violeta*
de robledal. *Violette des chiens*. *Heath dog violet*.
PRAT/MAT(ac). 1360-2120 m. c. V-VI.

823. *Viola hirta* L. | Viola/Viola hirta. -.
Violette hérissée. *Hairy violet*. PRAT(s). 1260-
1540 m. r. IV-V. MED

824. *Viola mirabilis* L. | Viola de fulla gran. -.
Violette admirable. -. BOSC(h). 1380 m. rrr. IV.

825. *Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp.
rupestris | Viola/Viola rupestre. *Violeta de*
roca. *Violette rupestre*. *Teesdale violet*. PRAT(s).
1280-2020 m. r. V-VI. MED.



825



828



827



829



830



831



826. *Viola arvensis* Murray [*V. tricolor* subsp. *arvensis* (Murray) Gaudin] | Pensament de camp. *Pensamiento*. *Pensée des champs*. *Heartsease*. ARV/RUD. 1200-2450 m. c. IV-V. MED/ALI. AL/NAT.

827. *Viola biflora* L. subsp. *biflora* | *Viola groga*. -. *Violette jaune*. *Yellow wood violet*. HERB(m)/MAT(n). 1820-2400 m. c. VI-VII.

828. *Viola diversifolia* (Ging.) W. Becker [*V. cenisia* L. subsp. *lapeyrousiana* Rouy & Foucaud] | Pensament alpí. -. *Pensée de Lapeyrouse*. *Diverse-leaved violet*. ROC(t). 2100-2760 m. r. VII-VIII.

829. *Viola palustris* L. subsp. *palustris* | *Viola/Viola palustre*. *Violeta palustre*. *Violette des marais*. *Bog violet*. AQUA(m,f). 1700-1880 m. rr. IV-V.

830. *Viola reichenbachiana* Jord. [*V. sylvestris* Lam., nom. illeg.] | *Viola/Viola silvestre*. *Violeta elevada*. *Violette des bois*. *Early dog violet*. BOSC/HERB(v,cl). 1260-2100 m. cc. IV-VI.

831. *Viola riviniana* Rchb. [*V. sylvestris* Lam. subsp. *riviniana* (Rchb.) Tourlet] | *Viola/Viola silvestre*. -. *Violette de Rivinus*. *Common dog violet*. BOSC/HERB(v,cl). 1300-2120 m. cc. V-VI.

832. *Viola tricolor* L. subsp. *subalpina* Gaudin | Pensament subalpí. *Pensamiento*. *Pensée subalpine*. -. RUD/PRAT/MAT. 1460-2460 m. cc. V-VII. MED/ALI.







836

833. *Allium oleraceum* L. | All de serp. Ajo de cigüeña. Ail des jardins. Field Garlic. PRAT/ROC(m) (s). 1220-1620 m. rr. VII-VIII. MED.

834. *Allium schoenoprasum* L. | All junciforme. Cebollino. Ciboulette. Chives. AQUA(f,m). 1600-2250 m. c. VI-VIII. MED/ALI/AUS.

835. *Allium sphaerocephalon* L. | All vermell. Ajo de cabeza redonda. Ail à tête ronde. Round-headed leek. PRAT(s)/ROC. 1260-1980 m. r. VII-VIII. MED/ALI.

836. *Allium ursinum* L. subsp. *ursinum* | All de bruixa. Ajo de oso. Ail des ours. Ransoms. BOSC(h,br). 1320 m. rrr. VI.

837. *Allium victorialis* L. | All victorial. Ajo victorial. Ail des cerfs. Pyrenean leek. HERB(m). 1600-2200 m. c. VI-VIII.

838. *Galanthus nivalis* L. | Llàgrimes de Sant Josep/Lliri de neu. Campanilla de nieve. Perce-neige. Snowdrop. BOSC(r)/HERB(m). 1200-1760 m. r. I-V. ALI(animal)/AUS.

839. *Narcissus moschatus* subsp. *molerói* (Fern. Casas) Aedo [*N. moleroi* Fern. Casas] | Narcís de muntanya. -. Jonquille de montagne. -. PRAT. 1430-2500 m. cc. V-VII.



838



839





846

840. *Lemna minor* L. | Llentia d'aigua. Lenteja de agua. Petite lentille-d'eau. Common duckweed. AQUA. 1220-1260 m. rr. VI.

841. *Lemna minuta* Kunth | Llentia d'aigua. Lenteja de agua. -. Least duckweed. AQUA. 1680 m. rrr. AL/INV.

842. *Anthericum liliago* L. | Lliri de Sant Bru. Antérico. Anthéricum à fleurs de lis. St. Bernard's lily. 1240-2000 m. c. VI-VIII. MED.

843. *Aphyllanthes monspeliensis* L. | Jonça. Junquillo. Aphyllanthe de Montpellier. Blue aphyllanthes. 1300-1600 m. c. IV-VI. MED/ALI/AUS.



848

844. *Convallaria majalis* L. | Muguet. Muguet. Lily of the valley. HERB(m). 1600-1700 m. rrr. VI. MED/AUS/TOX. AM.

845. *Dipcadi serotinum* (L.) Medik. subsp. *serotinum* | Marçet. Jacinto bastardo. Dipcadi. Dipcadi. PRAT(a)/ROC. 1280-1770 m. rr. VI-VII.



846. *Loncomelos pyrenaicum* (L.) J. Holub subsp. *pyrenaicum* [*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *pyrenaicum*] | Ornitògal pirinenc. -. *Ornithogale des Pyrénées*. Bath asparagus. PRAT(r)/ROC(r). 1780 m. rrr. VII.

847. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt | Maiàntem. -. Maiàntème à deux feuilles. May lily. BOSC/HERB(c). 1500 m. rrr. VI-VII. PRO.



847

848. *Ornithogalum divergens* Boreau [*O. umbellatum* auct., non L.] | Llet d'ocell. Leche de gallina. *Ornithogale divergent*. Star of Bethlehem. RUD/PRAT. 1200-1420 m. r. VI-VII.





Asparagàcies: 849-856; Asfodelàcies: 857

849. *Muscari neglectum* Ten. | Calabruixa petita. Penitentes. Muscari à grappe. Grape hyacinth. PRAT/RUD. 1200-1780 m. r. V-VI. MED/ALI/AUS/TOX.

850. *Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. | Lliri blanc/Paradísia. -. Lis des Alpes. St. Bruno's lily. PRAT(s,h). 1220-2080 m. r. VI-VIII. MED/AUS.

851. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. | Segell de ram. -. Sceau-de-Salomon multiflore. Common Solomon's seal. 1380 m. rrr. VI.

852. *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce | Segell de Salomó. Lágrimas de David. Sceau-de-Salomon odorant. Scented Solomon's seal. BOSC/HERB(m). 1240-1980 m. r. VI-VII. MED/ALI.


853. *Polygonatum verticillatum* (L.) All. | Segell verticil·lat. Sello de Salomón verticilado. Sceau-de-Salomon verticillé. Whorled Solomon's seal. BOSC(h)/HERB(cl). 1430-2100 m. VI-VII.

854. *Puschkinia scilloides* Adams | -. Escila de rayas. -. -. RUD. 1320 m. rrr. VI. AL/AC.

855. *Scilla lilio-hyacinthus* L. | Joliu. -. Scille lis-jacinte. Pyrenean squill. BOSC(br). 1340 m. rrr. VI.

856. *Streptopus amplexifolius* (L.) DC. | Strèptopus. -. Sceau-de-Salomon noueux. -. HERB(m). 1960-2080 m. rrr.

857. *Asphodelus macrocarpus* Parl. subsp. *macrocarpus* [A. *albus* subsp. *villarsii* (Billot) I.B.K. Richardson & Smythies] | Albó de muntanya. -. Asphodèle de Villars. Asphodel. PRAT/MAT(s). 1500-2050 m. r. MED/ALI.





862



858



864

Asfodelàcies: 858; *Ciperàcies:* 859-864

858. *Hemerocallis fulva* (L.) L. | Assutzena rossa. Lirio de dia. Lis rouge. Orange day-lily. ROC(m)/PRAT(s). 1240 m. rrr. AL/AC.

859. *Carex atrata* L. subsp. *atrata* | Càrex negre. -. Làiche noirâtre. Black alpine sedge. PRAT/AQUA(c)/MAT(c)/HERB(m). 2040-2300 m. rr. VII.

860. *Carex digitata* L. | Càrex digitat. Cárice digitada. Làiche digitée. Finger sedge. BOSC(h). 1220-1600 m. r. V-VI.

861. *Carex disticha* Huds. | -. -. Làiche distique. Brown sedge. AQUA(j,m). 1440-1880 m. rr. VII-VIII.

862. *Carex divulsa* Stokes [C. *muricata* subsp. *divulsa* (Stokes) Celak] | Càrex muricat. Cárice de espiga laxa. Làiche écartée. Grey sedge. RUD(t)/PRAT. 1280-1380 m. rr. VI.

863. *Carex echinata* Murray | Càrex estel-lat. Cárice estrellada. Làiche étoilée. Star sedge. AQUA(m,j,si). 1420-2220 m. r. VI-VII.

864. *Carex paniculata* L. subsp. *paniculata* | Càrex paniculat. Cárice paniculada. Làiche paniculée. Greater tussock-sedge. AQUA(m,j,f,ca). 1400-1780 m. r. V-VII.





869



867

Ciperàcies: 865-872

865. *Carex curvula* All. subsp. *curvula* | Càrex corbat. -. *Laïche courbée*. *Alpine sedge*. PRAT(h). 2200-2780 m. c. VII-VIII.

866. *Carex distans* L. | Càrex distant. *Cárice distante menor*. *Laïche à épis distants*. *Distant sedge*. AQUA(j)/PRAT(h). 1340 m-1780 m. rr. V-VI.

867. *Carex flava* L. [*C. flava* subsp. *alpina* (Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo] | Càrex groc. *Cárice amarillenta*. *Laïche glauque*. *Yellow sedge*. AQUA(m,j). 1800-2460 m. c. VI-VIII.

868. *Carex hirta* L. Càrex hirsut. *Cárice pelosa*. *Laïche hérissée*. *Hairy sedge*. AQUA(j)/RUD(t,h). 1380-1880 m. rr. VI-VII.

869. *Carex lepidocarpa* Tausch [*C. flava* subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Lange] | -. *Cárice amarillenta esférica*. *Laïche à beaux fruits*. -. AQUA(m,j,ca)/PRAT(h). 1680-1900 m. rr. V-VI.


870. *Carex leporina* L. [*C. ovalis* Gooden.] | Càrex oval. *Cárice ovalada*. *Laïche des lièvres*. *Oval sedge*. PRAT(h)/AQUA(m,f). 1250-2230 m. c. V-VII.

871. *Carex myosuroides* Vill. [*Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori] | Èlina. -. *Cobrésia queue-de-souris*. *Bellardi's Bog-sedge*. PRAT(r,ca). 1300 m. 1860-2780 m. r. VII-VIII.

872. *Carex remota* L. | Càrex remot. *Cárice remota*. *Laïche à épis espacés*. *Remote sedge*. BOSC(br)/AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI.



871





877

873. *Carex flacca* Schreb. subsp. *flacca* | Càrex glauc. - . *Laïche glauque*. *Blue sedge*. PRAT(h)/AQUA(j,cr). 1200-2000 m. ccc. V-VI.

874. *Carex frigida* All. | Càrex frigid. - . *Laïche des lieux froids*. - . AQUA(m,f). 1550-2080 m. r. VI-VII.

875. *Carex hallerana* Asso | Càrex hallerià. *Cárice de monte*. *Laïche de Haller*. - . PRAT/ROC(s,ca). 1480-1880 m. rr. V-VI.

876. *Carex pallescens* L. | - . - . *Laïche pâle*. *Pale sedge*. PRAT(h)/HERB(m). 1510-1880 m. rr. VII.

877. *Carex panicea* L. | - . *Cárice negra laxa*. *Laïche bleuâtre*. - . AQUA(j,m,ca). 1700-1900 m. r. VI-VII.

878. *Carex pyrenaica* Wahlenb. | Càrex pirinenc. - . *Laïche des Pyrénées*. *Pyrenean sedge*. AQUA(c,si). 2100-2500 m. rr. VII-VIII.



878

879. *Carex sylvatica* Huds. subsp. *sylvatica* | Càrex selvàtic. *Cárice de bosque*. *Laïche des bois*. *Wood-sedge*. BOSCO(h). 1380-1500 m. rr. VI.



880



881



882



883




884



885

- Ciperàcies: 880-886*
880. *Carex caryophyllea* Latourr. | Càrex vernal. -. *Laïche de printemps*. -. PRAT. 1240-2580 m. cc. V-VII.
881. *Carex ericetorum* Pollich | -. -. *Laïche des bruyères*. *Rare spring sedge*. PRAT(h,ac). 1880-2600 m. cc. VI-VIII.
882. *Carex nigra* (L.) Reichard | Càrex fosc. *Cárice negra densa*. *Laïche brune*. *Black sedge*. AQUA(m,f,ac). 1480-2400 m. c. VI-VII.
883. *Carex umbrosa* Host subsp. *huetiana* (Boiss.) Sóo | Càrex ombrós. *Cárice umbrosa*. *Laïche de Huet*. *Shady sedge*. AQUA(m)/PRAT(h). 1640- 2600 m. cc. VI-VIII.
884. *Cyperus eragrostis* Lam. | Serrana d'Amèrica. *Juncia americana*. *Souchet robuste*. *Nutgrass*. AQUA(j)/HERB(h)/RUD(h). 1220-1340 m. r. VIII. AUS. AL/NAT.
885. *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. subsp. *palustris* | Jonquet. *Junco palustre*. *Souchet des marais*. *Common spike-rush*. AQUA(cr). 1680 m. rrr. VI.
886. *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm. [*Scirpus cespitosus* L.] | Tricòfor. -. *Scirpe cespiteux*. *Tufted bulrush*. AQUA(m,j,ac). 2080-2250 m. rrr. VI.



886





Ciperàcies: 887-888; Dioscoreàcies: 889; Iridàcies: 890-891


887. *Eriophorum angustifolium* Honck. | Cottonera angustifòlia. Algodonera de hoja estrecha. Linaigrette à feuilles étroites. Common cottongrass. AQUA(m). 1450-2000 m. rrr. VI.

888. *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják [*Scirpus holoschoenus* L.; *Holoschoenus vulgaris* Link] | Jonc boval. Junco. Scirpe-jonc. Round-headed club-rush. AQUA(j). 1200-1550 m. rr. VII. MED/ALI/AUS.

889. *Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin [*Tamus communis* L.] | Gatmaimó. Brionia negra. Herbe aux femmes battues. Black bryony. MAT(b)/BOSC(h). 1220-1480 m. rr. V. MED.

890. *Crocus nudiflorus* Sm. | Safrà bord. Azafrán de montaña. Crocus d'automne. Leafless crocus. PRAT(h). 1500-2230 m. cc. IV-XI.

891. *Crocus vernus* (L.) Hill [*C. vernus* subsp. *albiflorus* (Schant.) Ces.] | Safrà de muntanya. -. Crocus à fleurs blanches. Purple crocus. PRAT(h). 1400-2300 m. c. III-IV.





893

892. *Xiphion latifolium* Mill. [*Iris latifolia* (Mill.) Voss.] | Lliri blau. Lirio de hoja ancha. Iris des Pyrénées. English iris. PRAT. 1600-1900 m. rr. VII-VIII.

893. *Luzula campestris* (L.) DC. | Lúzula campestre. Lúzula de prado. Luzule des champs. Field wood-rush. PRAT/MAT(ac). 1240-2300 m. ccc. V-VII.

894. *Luzula desvauxii* Kunth [*L. glabrata* (Hoppe) Desv. subsp. *desvauxii* (Kunth) Buchenau] | Lúzula glabra. -. *Luzule de Desvaux*. -. HERB(m)/AQUA(f). 1800-2500 m. c. VI-VII.

895. *Luzula lutea* (All.) DC. | Lúzula groga. -. *Luzule jaune*. Yellow wood-rush. PRAT(ac). 2000-2700 m. cc. VI-VIII.

896. *Luzula nivea* (L.) DC. | Lúzula nívea. -. *Luzule blanc de neige*. Snowy wood-rush. BOSC/HERB(m)(ac). 1420-1940 m. cc. VI-VII.

897. *Luzula pediformis* (Chaix) DC. [*L. nutans* (Vill.) Duval-Jouve] | Lúzula nutant. Lúzula colgante. *Luzule penchée*. -. PRAT(ac). 2000-2650 m. c. VI-VIII.

898. *Luzula spicata* (L.) DC. [*L. spicata* subsp. *monsignatica* P. Monts.] | Lúzula d'espiga, Lúzula espigada. Lúzula espigada. *Luzule d'Espagne*. Spiked wood-rush. PRAT(ac). 1980-2680 m. cc. VI-VII. ALI(animal).

899. *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin subsp. *sylvatica* | Lúzula selvàtica. -. *Grande luzule*. Greater wood-rush. BOSC(h)/HERB(m). 1480 m. rrr. VI.



896



897



898



900



901



902



903



904


900. *Juncus acutiflorus* Hoffm. | Jonc acutiflor. *Junco de càliz agudo*. *Jonc à tépales aigus*. *Sharp-flowered rush*. AQUA(j). 1320-1880 m. cc. VII-VIII.

901. *Juncus alpino-articulatus* Chaix subsp. *alpino-articulatus* [*J. alpinus* Vill. subsp. *alpinus*] | Jonc alpi. *Junco alpino*. *Jonc alpin*. *Northern green rush*. AQUA(m,j). 1600-2200 m. c. VII-VIII.

902. *Juncus articulatus* L. subsp. *articulatus* | Jonc articulad. *Junco articulad*. *Jonc articulé*. *Jointed rush*. AQUA(j,m). 1220-2000 m. cc. VII-VIII.

903. *Juncus balticus* Willd. subsp. *pyrenaicus* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn. [*J. pyrenaicus* Jeanb. & Timb.-Lagr.] | Jonc pirinenc. -. *Jonc des Pyrénées*. -. AQUA(m). 2080-2200 m. rrr. VII-VIII. PRO.

904. *Juncus conglomeratus* L. | Jonc conglomerat. *Junco aglomerado*. *Jonc aggloméré*. *Compact rush*. AQUA(j)/PRAT(h). 1400-1900 m. c. VII-VIII.



905

905. *Juncus effusus* L. | Jonc d'estores. *Junco de esteras*. *Jonc diffus*. *Soft rush*. AQUA(j). 1240-1970 m. ccc. VII-VIII. AUS.



906



907



909



909



Juncàcies: 906-910: Juncaginàcies: 911

906. *Juncus bufonius* L. | Jonc de galàpet. -.
Jonc des crapauds. Toad rush. AQUA(j). 1340-
2000 m. rr. V.

907. *Juncus inflexus* L. subsp. *inflexus* |
Jonquina. Junco glauco. Jonc glauque. Hard rush.
AQUA(j)/RUD(t). 1200-1820 m. c. VI-VII. AUS.

908. *Juncus tenuis* Willd. | Jonc tènue. -. -.
Slender rush. RUD(t). 1240-1780 m. r. VI-VII. AL/
INV.

909. *Juncus triglumis* L. subsp. *triglumis* |
Jonc tribracteat. -. Jonc à trois glumes. Three-
flowered rush. AQUA(m,j). 2020 m. rrr. VI.
PRO.

910. *Oreojuncus trifidus* (L.) Závěská, Drábková
& Kirschner [*Juncus trifidus* L.] | Herba prima
de Rojà/Jonc trífid. -. Jonc trifide. Highland rush.
PRAT(ac). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.

911. *Triglochin palustris* L. | -. Cinta de
agua. Troscart des marais. Marsh arrowgrasses.
AQUA(m). 1820 m. rrr. VI.







913



917



916



917

Liliàcies: 912-916; Melantiàcies: 917

912. *Erythronium dens-canis* L. | Dent de ca, Diente de perro. Dent-de-chien. Dogtooth violet. PRAT- 1680-1900 m. rrr. IV.

913. *Gagea lutea* (L.) Ker Gawl. | Gàgea groga. - . Gagée jaune. Yellow star-of-Bethlehem. 1760 m. rrr. VI. AM.

914. *Lilium candidum* L. | Lliri de Sant Antoni. Lirio de Sant Antonio. Lis blanc. Madonna lily. RUD/ROC(m). 1240-1300 m. rrr. AL/AC.

915. *Lilium martagon* L. | Consolta vermella/ Marcòlic. Martagón. Lis martagon. Martagon lily. BOS(h)/HERB(cl,v). 1200-2400 m. cc. VII-VIII. MED/AUS.

916. *Lilium pyrenaicum* Gouan | Consolta, consolta groga/Marcòlic groc. - . Lis des Pyrénées. Pyrenean lily. PRAT/HERB(m)/MAT(bg). 1500-2140 m. r. VI-VII. MED/AUS/TOX.

917. *Veratrum album* L. | Baladre (de muntanya) (s/c). - . Vétrate blanc. False helleborine. BOS(h)/HERB(m,cl)/RUD(h). 1200-2300 m. c. VII-VIII. MED/AUS/TOX.





924



918

Melantiàcies: 918; Orquídies: 919-924

918. *Paris quadrifolia* L. | Raïm de guineu. Uva de zorra. Parisette à quatre feuilles. Herb Paris. BOSC(h,per). 1700-1820 m. rr. V-VI.

919. *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. | Orquídia verda. Orquis verte. Orchis vert. Frog orchid. PRAT(h). 1500-2000 m. r. VI-VII.

920. *Corallorhiza trifida* Châtel. | Orquídia d'arrel de corall. -. Racine-de-corail. Coralroot orchid. BOSC(h). 1680-1820 m. rrr. VI. PRO.

921. *Goodyera repens* (L.) R. Br. | Godiera. Gudiera. Goodyère rampante. Creeping lady's tresses. HERB(v)/BOSC(per). 1220-1260 m. rrr. VII. AM.

922. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. | Platantera de dues fulles. -. Platanthère à deux feuilles. Lesser butterfly orchid. PRAT/HERB(cl,v). 1240-1900 m. c. VI-VII

923. *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. | Platantera de muntanya. -. Platanthère à fleurs verdâtres. Greater butterfly orchid. BOSC/PRAT/HERB(cl,v). 1400-2100 m. c. V-VIII.

924. *Pseudorchis albida* (L.) Á. Löve & D. Löve subsp. *albida* | Orquis blanc. -. Orchis blanchâtre. Small white orchid. PRAT/HERB(h). 1960-2100 m. rrr. VII-VIII. AM.



922





929

925. *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soó subsp. *fuchsii* [*Orchis maculata* L. subsp. *meyeri* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] | Orquis de Meyer. Orquis manchada común. *Orchis de Fuchs*. Common spotted orchid. PRAT/HERB(v). 1240-1780 m. ccc. VI-VIII.

926. *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *maculata* [*Orchis maculata* L.] | Orquis maculat. Orquis manchada de turbera. *Orchis maculé*. Heath spotted orchid. AQUA(m)/PRAT(h). 1420-2200 m. c. VI-VIII.

927. *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. *majalis* [*Orchis majalis* Rchb.] | Orquis magenc. -. *Dactylorhize de mai*. Broad-leaved marsh orchid. AQUA(m,j)/PRAT(h). 1440-2100 m. cc. VI-VIII.

928. *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó [*Orchis sambucina* L.] | Orquis sambucí. -. -. Elder-flowered orchid. PRAT. 1460-2100 m. r. V-VII.

929. *Orchis mascula* L. | Orquídia mascle. -. *Orchis mâle*. Early purple orchid. PRAT. 1300-2000 m. c. V-VI.

930. *Orchis pallens* L. | Orquis pàl·lid. -. *Orchis pâle*. -. PRAT. 1700 m. rrr. VI. AM.



930



928



930





932

931. *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Schultes subsp. *atrorubens* | *Epipactis vermella*. *Épipactide común*. *Épipactis rouge sombre*. *Dark-red helleborine*. ROC(t). 1200-1800 m. r. VI-VIII.

932. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz | *Epipactis de fulla gran*. *Épipactide mayor*. *Épipactis à larges feuilles*. *Broad-leaved helleborine*. BOSC/HERB(v,c)/PRAT. 1240-1750 m. c. VII-VIII.

933. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz var. *minor* R. Engel | -. -. -. BOSC/HERB(v). 1340-1670 m. r. VI-VII.

934. *Epipactis kleinii* M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera | *Epipactis de Klein*. *Épipactide menor*. *Épipactis à petites fleurs*. -. HERB(v,c). 1340 m. rrr. VII-VIII.



933





936

935. *Epipactis bugacensis* Robatsch [E. *rhodanensis* Gévaudan & Robatsch] | Epipactis del Roine. *Épipactide verte*. *Épipactis du Rhône*. -. BOSC(br)/AQUA(m). 1200-1580 m. rr. VI-VIII. AM.

936. *Epipactis distans* Arv.-Touv. | Epipactis de fulles distants. *Épipactide distante*. *Épipactis à feuilles distantes*. -. HERB(v,cl). 1580-1700 m. VII. AM.

937. *Epipactis muelleri* Godfery [E. *helleborine* subsp. *muelleri* (Godfery) O. Bolòs, Masalles & Vigo] | Epipactis de Müller. -. *Épipactis de Müller*. -. PRAT. 1380 m. rrr. VII.

938. *Epipactis phyllanthes* G.E. Sm. [E. *fageticola* (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers] | -. *Épipactide de hayedo*. *Épipactis à fleurs pendantes*. -. BOSC(h). 1200-1300 m. rrr. VII-VIII. AM.



937



938





939. *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. | Caputxina olorosa. -. *Gymnadénie moucheron*. *Fragrant orchid*. PRAT. 1230-2100 m. cc. VI-VIII.

940. *Neotinea ustulata* (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [*Orchis ustulata* L.] | Orquis socarrat. *Orquis tostada*. *Orchis brûlé*. *Burnt-tip orchid*. PRAT. 1450-2000 m. c. VI-VII.

941. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. | Magraneta borda. -. *Néottie nid-d'oiseau*. *Bird's-nest orchid*. BOSC(h). 1240-1800 m. c. VI-VIII.

942. *Neottia ovata* (L.) Bluff & Fingerh. [*Listera ovata* (L.) R. Br.] | *Listera ovada*. *Hierba de dos hojas*. *Grande listère*. *Common twayblade*. HERB(v)/BOSC/PRAT(h). 1340-1820 m. c. VI-VII.

943. *Nigritella austriaca* (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez | *Nigritel-la d'Àustria*. -. *Nigritelle d'Autriche*. *Black vanilla orchid*. PRAT(h). 1440-2040 m. c. VII-VIII.







949

944. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth |
-. *Calamagròstide arundinàcea*. *Calamagrostide*
à feuilles de roseau. -. HERB(m)/BOSC (ac,h).
1320-2230 m. r. VII-VIII.

945. *Agrostis capillaris* L. subsp. *capillaris*
[*A. tenuis* Sibth.] | *Agrostis tènue*. *Agròstide*
tènue. *Agrostide commune*. *Common bent*.
PRAT/MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. VII-VIII.

946. *Agrostis stolonifera* L. [*A. alba* auct.,
non L.] | *Agrostis estolonífera*. *Agròstide*
común. *Agrostide blanche*. *Creeping bentgrass*.
AQUA(cr)/RUD(t,h). 1220-2000 m. c. VII-VIII.

947. *Aira caryophyllea* L. | *Nebulosa*. -.
Canche caryophyllée. -. PRAT(a,ac). 1410 m. rrr.
VI.

948. *Arrhenatherum elatius* (L.) J. Presl &
C. Presl subsp. *elatius* | *Fromental*. *Avena*
descollada. *Fromental élevé*. *Tall oatgrass*. PRAT/
HERB(v,r) (h). 1200-1820 m. ccc. VI-VII.
MED.

949. *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. subsp.
flavescens [*Trisetaria flavescens* (L.) Maire] |
Fromental petit. *Trisetaria dorada*. *Avoine dorée*.
Smut grass. PRAT(h). 1230-1810 m. c. VI-VII.



948



948



951



952



950



953



954

950. *Avena barbata* Link subsp. *barbata* | Civada borda. *Avena morisca*. *Avoine barbue*. *Slender wild oat*. ARV/RUD. 1240 m. rrr. VI.

951. *Anthoxanthum odoratum* L. | Gram d'olor. *Grana de olor*. *Flouve odorante*. *Sweet vernal grass*. PRAT(ac). 1200-2100 m. cc.

952. *Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv. | Fenàs anual. -. *Brachypode à deux épis*. -. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.

953. *Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. et Schultes | Fenàs de marge. *Lastón*. *Brachypode de Phénicie*. *False brome*. PRAT/HERB(s). 1220-1720 m. cc. VI-VIII.MED/ALI(animal)/AUS.

954. *Brachypodium sylvaticum* (Hudson) P Beauv. subsp. *sylvaticum* | Fenàs de bosc. *Lastón de bosque*. *Brachypode des bois*. *Slender false brome*. BOSC(h). 1200-1680 m. ccc. VI-VIII.

955. *Briza media* L. | Belluguets/Bellugadís mitjà. *Tembladera mediana*. *Brize moyenne*. *Quaking grass*. PRAT(h). 1200-2200 m. cc. ALI/AUS.



955





956



961



962



959

Poàcies: 956-962

956. *Anisantha madritensis* (L.) Nevski [*Bromus madritensis* L.] | Bromus madrileny. - Brome de Madrid. Compact brome. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.

957. *Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. subsp. *erecta* [*Bromus erectus* Huds. subsp. *erectus*] | Bromus erecte. Bromo erecto. Brome des prés. Erect brome. PRAT. 1200-1780 m. cc. VI-VII.

958. *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub subsp. *inermis* [*Bromus inermis* Leyss. subsp. *inermis*] | Bromus inerme. - Brome inerme. - RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/INV.

959. *Bromopsis ramosa* (Huds.) Holub [*Bromus ramosus* Huds.] | Bromus ramós. Bromo laxo. Brome en grappe. Hairy brome. BOSC/HERB(c,v). 1240-1450 m. rr. VII.

960. *Anisantha sterilis* (L.) Nevski [*Bromus sterilis* L.] | Margall llarg. Bromo gigante. Brome stérile. - HERB(t)/RUD(t). 1200-2000 m. ccc. V-VIII. TOX.

961. *Cynosurus cristatus* L. | -. Cola de perro fina. Crételle/Crételle des prés. Crested dog's-tail. PRAT(h,t). 1220-1920 m. ccc. VI-VII.

962. *Cynosurus echinatus* L. | Cinosur equinat. Cola de perro común. Crételle épineuse. - RUD(t)/PRAT(a,s). 1240-1500 m. r. V-VII.





967



968

Poàcies: 963-969



969

963. *Bromus commutatus* Schrad. | *Bromus pratense*. - . *Brome variable*. *Meadow brome*. PRAT/HERB(r). 1280 m. rrr. VI.
964. *Bromus hordeaceus* L. [*B. mollis* L.] subsp. *hordeaceus* | *Bromus hordeaci*. *Bromo suave menor*. *Brome mou*. *Soft brome*. PRAT(h)/RUD. 1220-1700 m. c. VI-VII. AUS.
965. *Bromus racemosus* L. subsp. *racemosus* | - . - . *Brome en grappe*. *Smooth brome*. PRAT(h). 1240-1260 m. rr. VI.
966. *Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter [*Bromus catharticus* Vahl] | *Bromus catàrtic*. - . *Brome cathartique*. *Grazing brome*. RUD(t). 1220-1450 m. c. VI-VIII. AL/NAT.
967. *Cynodon dactylon* (L.) Pers. | *Gram*. *Grama*. *Chiendent pied-de-poule*. *Bermuda grass*. RUD(t). 1200-1450 m. c. VII-IX. MED/ALI/AUS/TOX.
968. *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng [*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty; *Andropogon ischaemum* L.] | *Albellatge fasciculat*. - . *Digitaire glabre*. *Wavy hair-grass*. PRAT(s). 1200-1490 m. c. VII-IX.
969. *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [*Panicum sanguinale* L.] | *Forcadella*. *Digitaria*. *Digitaire commune*. *Crabgrass*. RUD/ARV. 1220-1560 m. r. VII-IX. AL/NAT.





970. *Catapodium rigidum* (L.) F.T. Hubbard subsp. *rigidum* [*Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*] | Escleropoa. *Gramilla de puño*. *Pâturin rigide*. *Ferngrass*. PRAT(s,r)/RUD(t). 1220-1560 m. r. V-VII.

971. *Dactylis glomerata* L. | Dàctil. *Dáctilo*. *Dactyle*, *Dactyle aggloméré*, *Dactyle pelotonné*. *Cock's-foot*. PRAT/HERB(v,r). 1200-2010 m. ccc. VI-IX. ALI(animal).


972. *Danthonia decumbens* (L.) DC [*Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.] | Dantònia. *Dantonía*. *Danthonie retombante*. *Heath grass*. PRAT/MAT(ac). 1240-1680 m. c. VI-VII.

973. *Deschampsia cespitosa* subsp. *media* (Gouan) K. Richt. [*D. media* (Gouan) Roem. & Schult.] | -. -. *Canche moyenne*. *Tufted hair grass*. AQUA(f,m,j)/PRAT(h). 1370- 2120 m. r.VII-VIII.

974. *Avenella flexuosa* (L.) Drejer [*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.] | Pel de boc. -. *Canche flexueuse*. -. BOSC(ac). 1260-2400 m. cc.

975. *Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. | Pota de gall. *Pata de gallo*. *Panic des marais*. *Barnyard millet*. ARV/RUD. 1240 m. rrr. VII. ALI(animal). AL/AC.







Poàcies: 976-982

976. *Festuca airoides* Lam. [*F. supina* Schur] | *Festuca supina*. -. *Fétuque fausse canche*. -. PRAT. 1920-2900 m. cc. VII-VIII.
977. *Festuca eskia* Ramond ex DC. in Lam. et DC. | Gesp. *Festuca pirenaica*. *Fétuque eskia* -. PRAT(s). 1700-2700 m. cc. VII-VIII.
978. *Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter [*F. scoparia* A. Kerner ex Nyman] | Ussona. *Festuca erizo*. *Fétuque de Gautier*. -. PRAT(s). 1200-2700 m. cc. VII-VIII.
979. *Festuca glacialis* (Miégev. ex Hack.) K. Richter | *Festuca glacial*. -. *Fétuque des glaciers*. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VIII.
980. *Festuca lambinonii* Kerguelen [*F. arvernensis* subsp. *costei* auct., non *F. costei* (St.-Yves) Markgr.-Dann] | *Festuca arvenica*. -. *Fétuque de coste*. -. PRAT(s,r)/ROC(r,t). 1450-2000 m. c. VII.
981. *Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort. subsp. *arundinaceus* [*Festuca arundinacea* Schreb.; *F. elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hackel] | *Festuca arundinàcia*. *Festuca carrizo*. *Fétuque faux roseau*. -. PRAT(t)/RUD(t). 1220-2020 m. ccc. VI-VIII. ALI(animal).
982. *Patzkea paniculata* (L.) G.H. Loos subsp. *paniculata* [*Festuca paniculata* (L.) Schinz & Thell.] | Sudorn. *Festuca paniculada*. *Fétuque paniculée*. -. PRAT(s). 1600-2400 m. c. VI-VII.





983. *Elymus caninus* (L.) L. [*Agropyron caninum* (L.) P. Beauv.] | Agropir caní. - . *Chiendent des chiens*. *Bearded wheatgrass*. HERB(c). 1300-1600 m. r. VI-VII.

984. *Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens* [*Agropyrum repens* (L.) P. Beauv.] | Xarpolla. *Agropiro comú*n. *Chiendent rampant*. *Couch grass*. RUD(t)/HERB(h). 1240-1320 m. r. VII-VIII.

985. *Holcus lanatus* L. | Herba molla. *Heno velloso*. *Houlque laineuse*. *Common velvet grass*. PRAT(h)/HERB(h)/AQUA(m,j). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.

986. *Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv. subsp. *pyramidata* [incl. *K. macrantha* (Ledeb.) Schult.] | -. *Koeleria ramosa*. *Koelérie pyramidale*. *Prairie June grass*. PRAT. 1260-2340 m. cc. VI-VIII. ALI(animal).

987. *Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin | Gram de gos. *Koeleria comú*n. *Koelérie du Valais*. -. PRAT(r,s)/ROC(r). 1200-2500 m. ccc.





988



993



989



990



991

988. *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. [*S. poiretti* (Roem. et Schultes) Hitchc.] | Cua de rata. *Esporobolo*. *Sporobole tenace*. -. RUD(t). 1240-1360 m. rr. VIII-IX. ALI(animal). AL/NAT.

989. *Helictochloa pratensis* subsp. *gonzaloi* (Sennen) Romero Zarco [*Avenula pratensis* subsp. *gonzaloi* (Sennen) Romero Zarco] | -. -. *Avénule de Gonzalo*. -. PRAT/ROC(s). 1320-1670 m. rr. VII.

990. *Helictochloa pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) Romero Zarco [*Avenula pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) O. Bolos & Vigo; *A. mirandana* (Sennen) Holub] | Avena. -. *Avoine ibérique*. -. PRAT(s). 1200-1700 m. r. VI-VII.

991. *Molinia caerulea* (L.) Moench | Alba roja. *Molinia*. *Molinie bleue*. *Purple moor-grass*. PRAT/AQUA(m,j,h). 1200-2000 m. ccc. VI-IX.

992. *Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum* | Mill. *Mijo*. *Mil d'Inde*. *Common Millet*. ARV/RUD. 1250-1290 m- rrr. VIII. AL/AC.

993. *Phalaris arundinacea* L. | Fàlaris. *Garzota de arroyos*. *Baldingère faux roseau*. *Reed canary grass*. AQUA(b,h). 1220-1370 m. c. VI-VII.



992





Poàcies: 994-999

994. *Eragrostis barrelieri* Daveau | Eragrostis. -. Éragrostide de Barrelier. Lovegrass. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.

995. *Eragrostis minor* Host | Eragrostis menuda. -. Éragrostide faux pâturin. Small lovegrass. RUD(t). 1240-1450 m. rr. VIII.

996. *Hordeum murinum* L. subsp. *murinum* | Ordi de Sant Joan. Cebada de ratón. Orge des rats. False barley. RUD(t). 1200-1680 m. cc. VI-VIII. ALI(animal).


997. *Lolium perenne* L. | Margall (s/c). Ballico. Ivraie vivace. Perennial ryegrass. RUD(t). 1200-2000 m. ccc. VI-VII. MED/ALI.

998. *Lolium rigidum* Gaudin subsp. *rigidum* | Margall dret. Ballico. Ivraie raide. Annual ryegrass. ARV/RUD(t). 1250 m. rr. VI. MED/ALI(animal)/AUS/TOX.

999. *Micropyrum tenellum* (L.) Link | -. -. Petit nard délicat. -. PRAT/ROC(t,r,ac). 1900 m. rrr. VI.







Poàcies: 1000-1006

1000. *Melica ciliata* L. subsp. *ciliata* | Serrell de muntanya. *Mélica pelosa*. *Mélique ciliée*. -. PRAT(s,r)/ROC(t). 1200-1500 m. rr. VI-VII.

1001. *Melica uniflora* Retz | Mèlica uniflora. *Mélica de bosque*. *Mélique à une fleur*. Wood melick. BOSC(h). 1320-1510 m. rr. VI-VII.

1002. *Poa alpina* L. | *Poa alpina*. *Poa alpina*. *Pâturin des Alpes*. *Alpine meadow-grass*. PRAT(h). 1300-2600 m. cc. VI-VIII.

1003. *Poa cenisia* All. [*P. cenisia* subsp. *sardoa* Schmid; *P. fontqueri* Braun-Blanq.] | -. *Poa cenisia*. *Pâturin du mont Cenis*. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VII-VIII.

1004. *Poa nemoralis* L. [*P. debilis* Thuill.] var. *nemoralis* | Espigueta de bosc. *Poa de los bosques*. *Pâturin des bois*. Wood bluegrass. BOSC(h). 1200-1800. ccc. VI-VII.

1005. *Poa pratensis* L. subsp. *pratensis* [*P. pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm.; *P. angustifolia* L.; *P. pratensis* subsp. *angustifolia* (L.) Dumort.] | *Poa pratense*. *Poa de prado*. *Pâturin des prés*. *Kentucky bluegrass*. PRAT/RUD(t). 1200-2120 m. ccc. V-VIII.

1006. *Poa trivialis* L. subsp. *trivialis* | *Poa trivialis*. *Poa común*. *Pâturin commun*. *Rough meadow-grass*. PRAT(h)/AQUA(j)/RUD(h). 1200-2100 m. ccc. VI-VIII.







1010



1013



1012

Poàcies: 1007-1013

1007. *Glyceria notata* Chevall. [*G. plicata* (Fr.) Fr.; *G. fluitans* subsp. *plicata* (Fr.) St.-Lag.] | Glicèria. -. *Glycèrie plissée*. *Plicate sweet-grass*. AQUA(cr). 1220-1810 m. c. VI-VII.

1008. *Nardus stricta* L. | Pèl caní. *Cervuno*. *Nard raide*. *Matgrass*. PRAT/AQUA(f,m). 1550-2640 m. cc. VI-VII.

1009. *Phleum alpinum* L. subsp. *alpinum* [*P. commutatum* Gaud.] | Flèum alpi. *Fleo alpino*. *Fléole des Alpes*. *Alpine cat's-tail*. AQUA(m)/PRAT(h). 1620-2600 m. c. VI-VIII. ALI(animal).

1010. *Phleum phleoides* (L.) Karsten | Cua de rata. *Fleo alargado*. *Fléole de Boehmer*. *Boehmer's cat's-tail*. PRAT. 1200-1800 m. c. VI-VIII. MED.

1011. *Phleum pratense* L. subsp. *pratense* | Flèum de prat. *Fleo de prado*. *Fléole des prés*. *Timothy*. PRAT(h). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.


1012. *Oreochloa elegans* Sennen [*O. blanka* Deyl; *O. disticha* subsp. *blanka* (Deyl) P. Kupfer] | Oreòcloa. -. *Oréochloa élégant*. -. PRAT(r)/ROC. 2480-2780 m. rr. VII-VIII.

1013. *Sesleria caerulea* (L.) Ard. [*S. albicans* Schult.] | Seslèria. -. *Seslèrie bleue*. *Blue moor grass*. PRAT/BOSC (r,ca). 1250-2200 m. cc. V-VII.

Poàcies: 1014-1017; Tifàcies: 1018-1019; Tofieldiàcies: 1020



1014



1015



1016



1017



1018

1014. *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. var. *pectiniforme* (Roem. & Schult.) H.L.Yang [*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. subsp. *pectinatum* (M. Bieb.) Tzvelev] | Agropir pectinat. -. *Chiendent pectiné*. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/AC.

1015. *Setaria viridis* (L.) P. Beauv. | Serreig verd. *Almorejo*. *Sétaire verte*. *Green bristle grass*. ARV/RUD. 1200-1980 m. c. VII-IX. MED/ALI(animal). AL/NAT.

1016. *Vulpia ciliata* Dumort. subsp. *ciliata* | -. -. *Vulpie ciliée*. *Bearded fescue*. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.

1017. *Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmelin. | Cua de guilla. *Vulpia fina*. *Vulpie queue-de-rat*. *Annual fescue*. PRAT(r)/RUD(t). 1240-1360 m. rr. VI-VIII.



1019

1018. *Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz. & Thell. | Bova borda. *Espadaña erizo*. *Rubanièr dressé*. *Branched Bur-reed*. AQUA(cr). 1230 m. rrr.VII.

1019. *Typha latifolia* L. | Balca de fulla ampla. *Espadaña común*. *Massette à larges feuilles*. *Bulrush*. AQUA(cr). 1230 m. rrr. VII. MED/AUS.

1020. *Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb. | Tofièldia. -. *Tofieldie calyculée*. *Tofield's asphodel*. AQUA(m,j). 1700-1980 m. rr. VI-VII.



1020