

Catàleg sintètic de flora vascular del Parc Natural de Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès, Catalunya)

XAVIER OLIVER

xvioliver@gmail.com

Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural

Rebut: 26.12.2022

Acceptat: 22.01.2023

RESUM

Es presenta la llista sintètica de plantes vasculars del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (El Ripollès, Catalunya, nord-est de la península Ibèrica) en base a les referències publicades existents i el treball de camp dels últims 40 anys de l'autor. La llista consta de 1406 tàxons presents al territori, dels quals 1328 són autòctons, 40 híbrids, i 77 al·lòctons. D'aquests al·lòctons, 16 són invasors del medi natural, 31 són espontanis naturalitzats en ambients condicionats per l'acció humana i 30 accidentals, amb poblacions poc viables.

Es comenta per a cada tàxon els sinònims habituals, els ambients on normalment es troben, el desnivell altitudinal, la seva raresa i fenologia.

La flora vascular detectada al parc natural representa el 40,58% de la flora vascular detectada a Catalunya, el 38,45% dels tàxons controlats als Pirineus i el 66,07 de la flora de la comarca del Ripollès.

Paraules clau: Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, flora vascular, catàleg.

ABSTRACT

The checklist of vascular plants of the Capçaleres del Ter i del Freser Natural Park (El Ripollès, Catalonia, north-east of the Iberian Peninsula) is presented based on the existing published references and the field work of the last 40 years of the author. The list consists of 1406 taxa present in the territory, of which 1328 are autochthonous, 40 hybrid, and 77 alien. Of these allochthons, 16 are invaders of the natural environment, 30 are spontaneous taxa naturalized in environments conditioned by human action and 31 are accidental, with populations that are not very viable.

Common synonyms, the environments where they are usually found, the altitudinal difference, their rarity and phenology are discussed for each taxon.

The vascular flora detected in the Natural Park represents 40,58% of the vascular flora detected in Catalonia, 38,45% of the taxa monitored in the Pyrenees and 66,07% of the flora of the Ripollès region.

Keywords: Capçaleres del Ter and Freser Natural Park, vascular flora, catalogue.

INTRODUCCIÓ

El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser situat a la comarca del Ripollès (Pirineu oriental, província de Girona), amb una superfície de 14.547,93 ha, limita al nord amb França, i presenta un relleu muntanyós amb un desnivell important des dels 1100 fins als 2.909 m (Puigmal) amb nombrosos cims de més de 2500 m, i on podem diferenciar tres estatges altitudinals amb un clima i una vegetació ben diferenciada:

- Estatge montà, entre 1.100 i 1.600 (1.800) m, amb una vegetació mediterrània amb un domini dels boscos caducifolis (rouredes de roure de fulla gran, fagedes, freixenedes, bedollars i boscos de ribera), prats montans i conreus.

- Estatge subalpí, entre 1.600 (1.800) i 2.200 (2.300)m, amb una vegetació similar a la taigà del nord d'Europa i als estatges subalpins de les muntanyes alpines del continent, amb boscos de pi roig, de pi negre, i d'avets, matollars de neret, ginebró i bàlec, i prats.

- Estatge alpi, per sobre dels 2.200 (2.400) m, amb una vegetació només formada per prats, tarteres i rocams, amb plantes molt especialitzades en les condicions climàtiques existents, relacionades sovint amb plantes dels estatges alpins de les serralades europees i la tundra àrtica.

La superfície protegida abasta especialment alta muntanya, amb hàbitats la majoria d'ells amb una bona extensió i representació i sense problemàtiques molt greus en general de conservació. Són una excepció els hàbitats de carena i cims amb poca superfície i molt freqüentats, i especialment els hàbitats higròfils per la excessiva presència de bestiar i els hàbitats de fons de circ, molt minvats i degradats per la presència de les estacions de Núria i de Vallter 2000.

La creació del Parc Natural no va poder cobrir una gran extensió d'estatge montà on les activitats humanes són més determinants, i afecten especialment a boscos de ribera i higròfils de baix vessant, així com a prats de dall. Aquesta manca de representativitat de l'estatge montà explica la baixa presència de tàxons eurosiberians, i també la baixa proporció d'espècies al·lòctones comparat amb territori propers.

METODOLOGIA

El llistat sintètic comentat de la flora vascular del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser s'ha elaborat a partir de les referències publicades i de la feina de camp realitzada per l'autor en els últims 40 anys.

Les referències més utilitzades són per una banda obres sintètiques (Costa, 1864; Cadevall i col·laboradors, 1913-1937; Bolòs & Vigo, 1984-2001; Bolòs *et al.*, 2005; Sáez & Aymerich, 2021 i Font, 2022) i per altra articles de diferents autors que han estudiat la zona en diferents èpoques i n'han registrat citacions (Gautier, 1889; Bubani, 1897-1902; Vayreda, 1880-1931; Ferrer, 1903; Sennen 1913-34; Gaussen, 1926; Conill, 1932; Susplugas, 1942; Braun-Blanquet, 1945-1948; A. i O. de Bolòs, 1948-1979; Baudière *et al.*, 1964-1975; Küpfer, 1971; Nègre, 1972; Vigo, 1979-1996), i finalment articles de citacions puntuals o revisions




Figura 1. Àmbit de territori objecte del catàleg (Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser).

taxonòmiques (Arvet Touvet, J.M.C. 1913 sobre *Hieracium*). En general, en totes aquestes obres, la majoria realitzades ja fa anys, les citacions són poc precises, de manera que és difícil determinar la ubicació concreta per retrobar la localitat i en molts casos fins i tot no es pot saber si la citació és a dins de l'àmbit de l'estudi. Per tant, consten també plantes citades al territori que han estat considerades com a errors a partir de les mostres, de les prospeccions i el coneixement actual del tàxon, o són dubtes que cal confirmar encara amb revisió de plec o prospecció, o que no se ha pogut comprovar si eren dins de l'àmbit estudiat, o que són presents a prop dels límits i podrien ser presents.

El treball de camp de l'autor correspon a diversos projectes de recerca desenvolupats a l'àmbit del catàleg, entre ells l'elaboració del catàleg de flora vascular de la comarca del Ripollès (Oliver, 2021), de les llistes vermelles de la flora vascular del Ripollès (Oliver 2013, 2017, 2021), del catàleg d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès (Oliver, 2021), i dels programes de seguiments d'espècies amenaçades, i d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès (Oliver, 2022).

RESULTATS

El catàleg consta de 1406 tàxons amb presència al municipi, dels quals 40 corresponen a híbrids, 1328 tàxons autòctons, 77 tàxons al·lòctons, dels quals 30 tàxons es consideren accidentals, amb poblacions poc viables, 31 tàxons espontanis que mantenen poblacions només en llocs amb una pressió antròpica important, i 16 espontanis invasors dels hàbitats seminaturals i naturals del municipi, 3 d'ells erradicats.

En total al catàleg s'esmenten 1634 tàxons, dels quals 222 no s'han trobat al Parc Natural, 164 són tàxons citats al territori per error, i 68 s'han citat de manera general a la zona però no es pot saber si dins de l'àmbit protegit, o només de moment s'ha localitzat prop dels límits i per tant podrien ser presents al Parc Natural.




Figura 2. Proporció de tàxons autòctons, híbrids i tàxons al·lòctons en el catàleg,




Figura 3. Proporció de tàxons al·lòctons subespontanis accidentals, al·lòctons espontanis que només colonitzen ambients molt pertorbats per l'acció antròpica, i al·lòctons espontanis invasors d'ambients naturals.

Distribució per famílies

Les famílies amb més número de tàxons són:

Asteraceae: 193
Poaceae: 120
Fabaceae: 93
Rosaceae: 73
Lamiaceae: 63
Brassicaceae: 62
Caryophyllaceae: 60
Cyperaceae: 53
Apiaceae: 52
Plantaginaceae: 49
Ranunculaceae: 46
Orobanchaceae: 33
Orchidaceae: 32
Saxifragaceae: 29
Juncaceae: 26
Polygonaceae: 25
Crassulaceae: 23
Rubiaceae: 21
Boraginaceae: 19
Asparagaceae: 17
Campanulaceae: 17

Gentianaceae: 17
Salicaceae: 15
Dryopteridaceae: 13
Geraniaceae: 13
Onagraceae: 13
Primulaceae: 13
Scrophulariaceae: 13
Aspleniaceae: 12
Dipsacaceae: 12
Euphorbiaceae: 12
Violaceae: 12




Figura 4. Distribució de número de tàxons del catàleg per les principals famílies.

Estatus

A l'àmbit estudiat s'han citat 20 tàxons protegits (Generalitat de Catalunya, 2023), i 16 consten a la Llista Vermella catalana (Aymerich & Saez, 2021): 9 tàxons són Quasi Amençats (NT), 1 Vulnerable (VU) i 5 en Perill (EN). D'aquests tàxons al Parc Natural han desaparegut 4.

Línies a treballar en el futur

Fomentar la prospecció al territori.
Cerca d'alguns tàxons: no retrobats, propers.
Resoldre dubtes taxonòmics.
Aprofundir gèneres: *Hieracium*, *Rosa*, *Rubus*, *Alchemilla*, *Festuca*.
Prospectar algun sector concret.
Caracteritzar la població d'algun tàxon que podria estar amenaçat.
Conservar de manera genèrica els hàbitats i concretament algunes espècies amb poques localitats, que ocupen superfícies reduïdes o disposen de poblacions petites.

El catàleg

Els tàxons s'han ordenat en grans grups:

Al Parc Natural han desaparegut (EX-RE) 4 tàxons: *Lycopodium alpinum*, *Gentiana pneumonanthe*, *Dryopteris mindshelkensis* i *D. remota*.

- Els Pteridòfits.
- Les Gimnospermes.
- Les Angiospermes:
 - * Les dicotiledònies.
 - * Les monocotiledònies.

Dins de cada grup, per facilitar la consulta i cerca, les famílies i els tàxons s'han ordenat alfabèticament:

- Autòctons en negreta.
- Al·lòctons amb poblacions naturalitzades viables (espontànies), al·lòctons adventicis (subespontanis, aquells escapats però amb poblacions no viables) sense negreta.
- Citats a l'espai protegit però no confirmats, a prop dels límits o citats erròniament, en lletra més petita i en gris.

De cada tàxon del catàleg es detalla:

1. NOM CIENTÍFIC, en general se segueix Sáez & Aymerich, 2019.
2. SINÒNIMS utilitzats normalment o en referències utilitzades [entre claudàtors].
3. Els HÀBITATS principals de cada tàxon:
 - BOSC boscos: (cad) caducifolis, (per) perennifolis, (h) humits, (s) secs, (br) boscos de ribera.
 - MAT matollars: (b) bardisses, (n) de neret, (g) de gòdua, (bg) de bàlec i ginebró.
 - HERB herbassars: (h) humits, (s) secs, (m) megafòrbies, (v) vorades, (cl) clarianes.
 - AQUA aquàtiques: (j) jonqueres, (f) fontinals (rierols), (cr) creixenars, (m) mulleres, (c) congestes, (b) basses, (t) torrents.
 - PRAT: prats (h) humits i de dall, (s) prats secs, (r) anuals, sòls prims, sobre roques amb poc sòl.
 - ROC: ambients rupícoles (m) murs, (r) rocams, (t) tarteres i (c) codolars.
 - RUD: ambients ruderals (h) humits, (s) secs, (t) trepitjats.
 - ARV: arvenses (camps, conreus i horts).

Els hàbitats poden anar acompanyats a més de (si) substrats silícis, (ca) substrats calcaris, (ac) substrats àcids i (r) substrats rocallosos.

4. ALTITUD, amb l'interval altitudinal on s'ha detectat.

5. ABUNDÀNCIA, entre rrr (raríssim amb molt poques localitats) fins a ccc (molt abundant per tot arreu).

6. FENOLOGIA, interval de mesos on s'ha detectat floració (I-XII).

7. Altres comentaris d'interès:

- Grau d'amenaça UICN a Catalunya (Aymerich & Saez 2021): amenaçada AME/ i NT Quasi amenaçada, VU Vulnerable, EN En Perill, CR en Perill Crític, i extingida al Parc Natural EX-RE.

- Tàxon d'especial atenció per poques cites, poca àrea d'ocupació o poca població al Parc Natural EA que cal dedicar esforços en recerca, seguiment i conservació.

- Tàxons amb poblacions en clar declivi en aquests últims 20 anys DEC.

- Protegida (Generalitat de Catalunya 2023): PROT.

- Al·lòctona AL/: subespontània amb exemplars escapats puntualment AC, espontània d'ambients antropitzats ESP i espontània invasora d'ambients naturals i seminaturals INV. En alguns casos s'indica ER, quan s'han eliminat els exemplars detectats, i so s'ha rerobats cap.

- No retrobat NO RETR. quan no s'ha retrobat des de fa dècades.

- Tàxons citats, que s'esmenten al llistat però no considerats per ser errors ERROR, dubte per localització imprecisa DUBT.LOC, o dubte de determinació DUBT.DET.

Superdivisió *Pteridophyta*

Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L. [*A. adiantum-nigrum* subsp. *adiantum-nigrum*] Falzia negra. Culantrillo negro.

Falzia negra. Doradille noire, capillaire noir. Black spleenwort. BOSC,ROC. 1200-2200 m. c. VI-VIII.

Asplenium ceterach L. subsp. *ceterach* [*Ceterach officinarum* DC. subsp. *officinarum*] Dauradella. Hierba dorada.

-. -. ROC(m). 1225 m. rrr. IV-X. EA.

Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. *fontanum* Falguereta de cingle. Culantrillo blanco menor.

Asplénium des fontaines. -. ROC(h). 1200-1500 m. rr. V-XI.

Asplenium csikii Kummerle & András. [*A. trichomanes* subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis & Reichst.] ROC(ca).

1500 m. rrr. VIII. DEC. EA.

Asplenium quadrivalens (D.E.Meyer) Landolt [*A. trichomanes* L. subsp. *quadrivalens* D.E. Meyer] Falzia roja.

Culantrillo menor. Capillaire des murailles. Maidenhair spleenwort. ROC. 1200-2000 m. c. V-XI.

Asplenium ruta-muraria L. subsp. *ruta-muraria* Falzia blanca. Culantrillo blanco. Rue des murailles.

Wallrue. ROC. 1200-1500 m. cc. IV-XI.

Asplenium scolopendrium L. subsp. *scolopendrium* [*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.] LOC.PROP.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Falzia prima. Culantrillo del norte. Doradille du nord. Forked spleenwort. ROC. 1200-2500 m. cc. IV-IX.

Asplenium trichomanes L. Falzia roja. Culantrillo menor. Capillaire des murailles. Maidenhair spleenwort. ROC. 1200-2000 m. c. V-XI.

Asplenium viride Huds. [*A. trichomanes-ramosum* L.] Falzia verda. Culantrillo verde. Asplénium vert. Brightgreen spleenwort. ROC. 1200-2700 m. r. VII-IX.

Asplenium ×alternifolium Wulfen [*A. septentrionale* × *A. trichomanes*] ROC(m). 1200-1450 m. rrr. VI-VII. EA.

Athyiaceae

Athyrium distentifolium Opiz BOSC(t),ROC(t,h). 2100-2160 m. rrr. EA.

Athyrium filix-femina (L.) Roth Falguera femella. Helecho hembra. Fougère femelle. Lady fern. BOSC,HERB(h). 1200-2500 m. cc. V-IX.

Blechnaceae

Struthiopteris spicant (L.) F.W. Weiss subsp. ***spicant*** [*Blechnum spicant* (L.) Roth subsp. *spicant*] Blècnum. Lonchite. Blechne. Deer fern. ROC(r,t). 1420-2100 m. r. VII-IX.

Cystopteridaceae

Cystopteris alpina (Lam.) Desv. [*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *alpina* (Lam.) Hartman] -. Helecho frágil. Capillaire blanc. -. ROC(r,ca). 2530-2680 m. rrr. VII-VIII. EA.

Cystopteris fragilis (L.) Schott subsp. ***fragilis*** (Fomin) O. Bolòs et J. Vigo Falguera frágil. Helecho frágil. Capillaire blanc. -. ROC(r,m,t). 1200-2800 m. cc. VII-X.

Cystopteris montana (Lam.) Desv. - Error

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Gimnocarpi silicícola. Gimnocarpio glabro. Polypode dryoptère. -. BOSC(h),MAT(n)(si). 1540-2450 m. c. VII-X.

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Gimnocarpi calcícola. Gimnocarpio glanduloso. Polypode de robert. -. ROC(t)(ca). 1600-2280 m. c. VII-IX.

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kunhn subsp. ***aquilinum*** Falguera, falguera comuna. Helecho común. Grande fougère. Bracken. BOSC,MAT,PRAT(h)(ac). 1200-1880 m. cc. VI-IX.

Dryopteridaceae

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. ***affinis*** [*D. pseudomas* (Wollaston) Holub & Pouzar] Falguera mascle. BOSC(h). 1220 m. rrr. EA.

Dryopteris borrieri (Newman) Oberh. & Tavel [*D. affinis* subsp. *borrieri* (Newman) Fraser-Jenk.] Falguera mascle. Helecho macho. Fougère mâle. Male fern. BOSC(h). 1240-1450 m. rrr. V-X. EA.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - Fougère-mâle des Chartreux. Spinulose Woodfern. BOSC. 1400-1500 m. rrr. EA.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray Falguera austriaca. -. Fougère dilatée. -. BOSC(h). 1400-2200 m. r. V-IX.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott [*D. filix-mas* subsp. *filix-mas*] Falguera mascle. Helecho macho. Fougère mâle. Male fern. BOSC,HER(h,m). 1220-2000 m. cc. VI-IX.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy [*D. carthusiana* (Villar) H.P. Fuchs subsp. *assimilis* (Walker) O. Bolòs et al.; *Polystichum spinulosum* DC.] Drioptéríde pàlida. Dryoptérís élargi. -. BOSC(h). 1400-1525 m. r. VII-IX.

Dryopteris mindshelkensis N. Pavl. [*D. submontana* (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.; *D. villarii* subsp. *submontana* Fraser-Jenk. & Jermy] -Fougère-mâle submontagnarde. Limestone Wood-fern. BOSC(ca),ROC(t,ca). rrr. PROT. AME/VU. EX-RE. NO RETR. (s. XIX). EA

Dryopteris oreades Fomin [*D. filix-mas* (L.) Schott subsp. *oreades* (Fomin) O. Bolòs et Vigo]. -. Helecho macho caucásico. -. -. ROC(t,r). 1720-2400 m. c. VIII-X.

Dryopteris remota (Döll) Druce [*D. carthusiana* subsp. *remota* (Döll) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot] -. -. Fougère-mâle espacée. Scaly Buckler-fern. BOSC. PROT. AMEN/VU. EX-RE. NO RETROB. (s. XIX). EA

Dryopteris ×complexa Fraser-Jenk. nothosubsp. ***complexa*** [*D. affinis* subsp. *affinis* × *D. filix-mas*; *Dryopteris tavelii* sensu Lawalrée & Guin.] sub *D x tavelii* Rothm, *D. filix-mas x borrieri*) MAT(n) 1350 m. rrr. DUBT.DET.

Polystichum aculeatum (L.) Roth Falguera vera. Polístico común. Polystic à aiguillons. Hard shield fern. ROC. 1340-1800 m. rr. VII-IX.

Polystichum lonchitis (L.) Roth Polístico pirinenc. Polístico de montaña. Polystic en fer de lance. -. ROC(t,r). 1500-2600 m. c. VIII-IX.

Polystichum xillyricum (Borbás) Hahne [*P. aculeatum* × *P. lonchitis*] LOC.PROP.

Equisetaceae

Equisetum arvense L. Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle des champs. Common horsetail. AQUA,ARV. 1100-1680 m. rr. III-V.

Equisetum hyemale L. Cua de cavall. Rabo de raposo. Prêle d'hiver. Dutch rush. BOSC(br),AQUA(h). 1230-1800 m. rrr. VI. EA.

Equisetum palustre L. Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle des marais. Marsh horsetail. BOSC(br), AQUA. 1250-1350 m. rrr. V-VI.

Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ***ramosissimum*** Cua de cavall. Cola de caballo. Prêle rameuse. Branched horsetail. ROC(m). 1300 m. rrr. IV-V.

Equisetum telmateia Ehrh. Cua de cavall. Cola de caballo. Grande Prêl. Great Horsetail. HERB(h). 1220-1450 m. rrr. V.

Equisetum xmoorei Newman BOSC(br). 1230 m rrr. VI.

Lycopodiaceae

Huperzia europaea C. Björk [*H. selago* auct., non (L.) Schrank & C.F.P. Mart.; *Lycopodium selago* L.] -. -. Lycopode sélagine. Northern firmoss. BOSC,MAT(ac). 1500-2600 m. rr. VII-IX.

Lycopodium alpinum L. [*Diphasiastrum alpinum* (L.) J. Holub]. -. -. *Lycopode des Alpes*. Alpine Clubmoss. PROT.AME/VU. EX-RE. NO RETR (1878). EA.

Lycopodium clavatum L. Error.

Ophioglossaceae

Botrychium lunaria (L.) Swartz Herba de les llunetes, llunària. Lunaria. Botryche lunaire. Common moonwort. PRAT(h). 1320-2650 m. c. VI-IX.

Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch -. -. Botryche à feuilles de camomille. Chamomile grape-fern. BOSC(h)(si). 1500 m. rrr. VI. PROT. AME/EN. DEC. EA.

Ophioglossum vulgatum L. Llengua de serp. Lengua de serpiente. Ophioglosse commune. Adder's-tongue. LOC. PROP.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L. [*P. vulgare* subsp. *vulgare*] Polipodi. Polipodio. Polypode commun. Common polypodi. ROC(r,m),BOSC(h). 1200-2250 m. c. VII-X.

Pteridaceae

Cryptogramma crispa (L.) R. Br. -. Alosuro. Cryptogramme crispée. -. ROC(t,si). 1780-2800 m. c. VII-VIII.

Selaginellaceae

Selaginella selaginoides (L.) Schrank & C.F.P. Mart. Licopodi comú. Licopódio selago. Sélaginelle spinuleuse. Lesser clubmoss. AQU(m,f). 1450-2400 m. rr. VI-IX.

Thelypteridaceae

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt [*Thelypteris phegopteris* (L.) Slosson; *Polypodium phegopteris* L.] -. -. Fougère-à-moustache Petite. Beech Fern. BOSC(h). 1340 m. rrr. VII-VIII. DEC. EA.

Woodsiaceae

Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray [*W. hyperborea* (Lilj.) R.Br.] -. -. Woodsie dels Alps. -. ROC(r). 2050-2760 m. rr. VII-VIII. AME/NT. EA.

SUPERDIVISIÓ SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Cupressaceae

Juniperus communis L. subsp. *communis* (Suter) Celak. Ginebre. Enebro. Genévrier commun. Common juniper. BOSC,MAT,PRAT. 1200-1800 m. cc. VI-VIII.

Juniperus communis L. subsp. *nana* Syme [*J. communis* subsp. *alpina* (Suter) Celak] Ginebró. Enebro rastrero. Genévrier nain. -. BOSC,MAT,PRAT. 1600-2780 m. cc. VII-VIII.

Pinaceae

Abies alba Mill. Avet. Abeto. Sapin. Silver fir. BOSC(h). 1320-2000 m. c. V.

Larix ×marschlinsii Coaz BOSC. 1560 m. rrr. AL/AC.

Pinus sylvestris L. Pi roig. Pino albar. Pin sylvestre. Scots pine. BOSC. 1200-1720 m. cc. V-VI.

Pinus uncinata DC. [*Pinus mugo* Turra subsp. *uncinata* (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin] Pi negre. Pino negro. Pin à crochets. Mountain pine. BOSC. 1400-2600 m. ccc. V-VI.

Pinus ×rhaetica Brügger [*P. sylvestris* x *P. uncinata*] 1450-1680 m. c.

Picea abies (L.) H. Karst. Pícea. Pícea. Épicea. Norway spruce. 1400-1700 m. rrr. AL/AC.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco Avet de Douglas. Abeto de Douglas. Douglas de Menzies. Douglas Fir. 1320-1480 m. rrr. AL/AC.

ANGIOSPERMAE

SUBCLASSE DICOTILEDÒNIES

Amarantaceae

Amaranthus deflexus L. Amarant deflex. Bledo rastrero. Amarante couchée. Largefruit amaranth. RUD(t). 1200-1240 m. rr. VIII. AL/ESP.

Amaranthus hybridus L. Amarant. Amaranto. Amarante hybride. Green amaranth. ARV,RUD. 1200 m. rrr. VIII-IX. AL/ESP.

Amaranthus retroflexus L. Amarant. Amaranto. Amarante réfléchie. Common amaranth. RUD. 1200-1840 m. r. VIII-IX. AL/ESP.

Atriplex patula L. Salat de fulla estreta. Armuelle de hoja estrecha. Arroche étalée. Common orache. RUD. 1200-1540 m. rr. VII-IX.

Beta vulgaris L. Bleda. Acelga. Bette commune. Beet. RUD. 1200 m. rrr. AL/AC.

Blitum bonus-henricus (L.) Rchb. [*Chenopodium bonus-henricus* L.] Sarró, espinac de muntanya. Zurrón. Herbe du bon henri. Good-king-henry. RUD. 1200-2400 m. cc. VII-IX.

Chenopodium hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch [*Chenopodium hybridum* L.] -. -. Chénopode à feuilles de stramoine. -. ARV,RUD. 1240 m. rrr.

Chenopodium album L. Blet. Berza perruna. Ansérine blanche. Fat hen. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VII-VIII.

Chenopodium vulvaria L. Blet pudent. Sardinera. Chénopode fétide. Stinking goosefoot. RUD. 1240 m. rrr. VI. *Dysphania ambrosioides* (L.) Mosyakin & Clemants [*Chenopodium ambrosioides* L.] Te bord. Té de méxico. Chénopode fausse ambroisie. Wormseed. RUD. 1240 m. rrr. VII-VIII. AL/AC.

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch [*Chenopodium polyspermum* L.] ARV(h). Blet polisperm. Cenizo polispermo. Chénopode à graines nombreuses. Manyseed goosefoot. 1200-1320 m. r. VII.

Apiaceae

Aegopodium podagraria L. - Pie de cabra. Podagraire. Wild masterwort. BOSC(br). 1200 m. rrr. VII. AME/NT. DEC. AE.

Aethusa cynapium L. subsp. *cynapium* Julivertassa. Cicuta menor. Ciguë des jardins. Fool's parsley. RUD. 1200-1540 m. rr. VII.

Anethum foeniculum L. [*Foeniculum vulgare* Mill., *F. vulgare* subsp. *piperitum* (Ucria) Cout.] Fonoll. Hinojo. Fenouil. Fennel. PRAT(s),HERB(v). 1200-1460 m. c. VI-X.

Angelica sylvestris L. Angèlica. Angélica. Angélique des bois. Wild angelica. BOSC(br),HERB(h),AQUA. 1200-1900 m. c. VI-VIII.

Anthriscus sylvestris L. Cominassa. Cicutaria. Anthrisque sauvage. Cow parsley. PRAT(h),HERB(m), BOSC(br). 1200-2040 m. c. V-VII.

Astrantia major L. Astrància. -. Grande astrance. Great masterwort. HERB,PRAT(h). 1200-2010 m. cc. VI-VIII.

Astrantia minor L. Astrància menuda. Astrancia menor. Petite astrance. Lesser masterwort. MAT,HERB, PRAT. 1420-2300 m. c. VII-VIII.

Bunium alpinum Waldst. et Kit. ERROR.

Bupleurum angulosum L. ERROR.

Bupleurum petraeum L. ERROR.

Bupleurum ranunculoides L. Orella de llebre. Cuchilleja menor. Buplèvre à feuilles de graminée. Hare's-ear. PRAT(ca). 1460-1900 m. c. VII-VIII.

Bupleurum stellatum L. ERROR.

Carum carvi L. Comí. Comino. Cumin des prés. Caraway. PRAT(H),HERB(h). 1200-2000 m. c. VI-VIII.

Chaerophyllum aureum L. Cominassa. Cerefolio dorado. Cerfeuil d'or. Golden chervil. RUD. 1200-2060 m. ccc. VI-VIII.

Chaerophyllum hirsutum L. Cominassa hirsuta. -. Cerfeuil ciculaire hérissé. Hairy Chervil. HERB(h), AQUA(h,f),BOSC(br). 1200-2200 m. ccc. VI-VII.

Chaerophyllum temulum L. Cominassa temulenta. -. Cerfeuil enivrant. Rough Chervil. BOSC(br), HERB(c). 1220-1260 m. rr. VI-VII.

Conium maculatum L. Cicuta, Cicuta major. Cicuta mayor. Ciguë Grande. Hemlock. RUD(h). rrr. VII-VIII.

Conopodium arvense (Coss.) Calest. [*C. ramosum* Costa; *C. majus* subsp. *ramosum* (Costa) Silvestre]. ERROR.

Conopodium pyrenaicum (Loisel.) Miégev. [*Conopodium denudatum* subsp. *daucifolium* Rouy & E.G.Camus]. ERROR.

Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. *majus* Anyol. Castañuela. Grand conopode. Earthnut. BOSC,MAT,PRAT(ac). 1200-2060 m. cc. VI-VIII.

Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron, Charpin & Pimenov [*Ligusticum lucidum* Mill.] Turbit de muntanya. -. Ligustique des pyrénées. Southern lovage. ROC(t),HERB(v). 1260-1870 m. r. VI-IX.

Daucus carota L. subsp. *carota* Pastanaga borda. Zanahoria silvestre. Carotte sauvage. Wild carrot. RUD,HERB,PRAT. ccc. VI-X.

Endressia pyrenaica (DC.) J. Gay PRAT(ac,h). 1600-2020 m. r. VII-VIII.

Epikeros pyrenaicus (L.) Raf [*Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan] Selí pirinenc. Hinojo de prado. Sélin des Pyrénées. Pyrenean angelica. BOSC,MAT,PRAT (ac). 1350-2500 m. c. VII-VIII.

Eryngium bourgatii Gouan Espinacal, panical blau. Cardo azul. Panicaut de bourgat. Field eryngo. PRAT. 1460-2550 m. ccc. VII-VIII.

Eryngium campestre L. Espinacal, panical. Cardo corredor. Panicaut champêtre. Field eryngo. PRAT(s). 1200-1350 m. r. VI.

Eryngium ×chevalieri Sennen [*E. bourgatii* × *E. campestre*] PRAT. 1380 m. rrr.

Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. [*Seseli peucedanoides* (M. Bieb.) Koso-Pol.] PRAT(ca). 2050 m. rrr. EA.

- Helosciadium nodiflorum* (L.) W.D.J. Koch [*Apium nodiflorum* (L.) Lag.] Creixen bord. Berraza. Ache faux cresson. Wild celery. AQUA(cr). 1350 m. rr. VI-VIII.
- Heracleum pyrenaicum* Lam. [*Heracleum sphondylium* L. subsp. *pyrenaicum* (Lam.) Bonnier et Layens var. *pyrenaicum*] Pàmpola, belleraca. Belleraca. Berce des Pyrénées. Pyrenean hogweed. PRAT,HERB(h). 1200-2250 m. cc. VI-VIII.
- Imperatoria ostruthium* L. [*Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch] Salsufragi. Peucédano alpino. Impératoire. Masterwort. HERB,AQUA(h). 1200-2340 m. c. VI-VIII.
- Laser trilobum* (L.) Borkh. ex G.Gaertn. ERROR.
- Laserpitium gallicum* subsp. *paradoxum* (A. Bolos & Font Quer) P. Monts. ROC(r,t). 1425 -1650 m. VI-VII.
- Laserpitium latifolium* L. subsp. *latifolium* Angèlica. Cominos negros. Laser à feuilles larges. Broad-leaved sermountain. BOSC,HERB,MAT,PRAT. 1250-2230 m. cc. VII-VIII.
- Libanotis pyrenaica* (L.) O. Schwarz [*Seseli libanotis* (L.) W.D.J. Koch] Sèseli pirinenc. -. Libanotis des montagnes. Mountain stone-parsley. PRAT(s)(p). 1700-2280 m. r. VII-VIII.
- Meum athamanticum* Jacq. Meu, herba del mèu. Hinojo ursino. Cerfeuil des alpes. Baldmoney. PRAT(h,ac). 2020-2440 m. r. VII-VIII.
- Molospopernum peloponnesiacum* (L.) Koch Coscoll. Coscollo. Couscouil. Striped Hemlock. ROC(r)(t), HERB(m),MAT(s)(p). 1220-2340 m. c. VI-VIII.
- Oreoselinum nigrum* Delarbre [*Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench] HERB(v). 1240-1300 m. rr. VII-IX.
- Pachypleurum mutellinoides* (Crantz) Holub [*Ligusticum mutellinoides* (Crantz) Vill.]. ERROR.
- Pastinaca sativa* L. subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy & E.G. Camus Xirivia silvestre. Chirivía. Panais des bois. Wild parsnip. HERB,BOSC(s). 1240-1550 m. c. VII-VIII.
- Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss. ARV,RUD(t).1240 m. rrr.VII.
- Pimpinella major* (L.) Huds. L. var. *rubra* (Hoppe) Fiori et Bég. Pimpinella gran. Pimpinella mayor. Grande pimpinelle. Greater burnet-saxifrage. HERB(m,h),PRAT(h). 1240-1850 m. r. VII-VIII.
- Pimpinella saxifraga* L. Matafaluga de prat. Pimpinela blanca. Pimpinelle Petite. Burnet Saxifrage. PRAT. 1200-2120 m. ccc.
- Ptychotis saxifraga* (L.) Loret & Barr. Orelludeta. Perejil de glera. Ptychotis saxifrage. -. ROC(t). 1240-1750 m. c. VII-VIII.
- Sanicula europaea* L. Herba de sant Llorenç. Hierba de san Lorenzo. Sanicle. Wood sanicle. BOSC(br). 1200-1350 m. r. VII-VIII.
- Seseli annuum* L. subsp. *annuum* -. -. Séséli annuel. -. VOR(s),ROC. 1200-1400 m. rr.
- Seseli montanum* L. subsp. *montanum* Sèseli de muntanya. -. Séseli común. Séséli des montagnes. -. PRAT(s). 1200-1980 m. c. VII-IX.
- Seseli montanum* subsp. *nanum* (Dufour) O. Bolòs & Vigo [*S. nanum* Duf. in Bory; *S. montanum* var. *nanum* Seg.] Sèseli. -. Séséli nain. -. ROC(ca). 2240-2760 m. rrr. VII.
- Thapsia nestleri* (Soy.-Will.) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik subsp. *flabellata* (P. Monts.) Fern. Prieto, Garcia Fresno, Sanna & Cires [*Laserpitium nestleri* subsp. *flabellatum* P. Monts.] PRAT,BOSC(r,h,ca). 1450-2040 m. r. VII-VIII.
- Tordylium maximum* L. RUD(h). 1250 m. rrr. VI-VIII.
- Torilis arvensis* (Huds.) Link Julivert bord. -. Torilis des champs. -. RUD. 1240-1620 m. r. VI-VIII.
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. HERB(r),BOSC(br). 775-1600 m. c. VI-IX.
- Trinia glauca* (L.) Dumort. Trinia. -. Trinie commune. Honewort. ROC(r),PRAT(r)(ca). 1480-2380 m. rr. VI-VII.
- Xatartia scabra* (Lapeyr.) Meisn. Julivert d'isard. -. Persil d'isard. Xatardia. ROC(t). 2050-2750 m. r. VII-IX. PROT. DEC. EA.

Apocinaceae

- Vinca minor* L. 1350 m. rrr. AL/AC.
- Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [*V. hirundinaria* subsp. *intermedium* (Loret & Barrandon) Markgraf.] Pebrotera borda. Hirundinaria. Dompte-venin intermédiaire. Pale swallow wort. MAT,BOSC. 1200-1850 m. cc. VI-VII.

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L. Grèvol. Acebo. Houx. Holly. BOSC(h). 1200-1900 m. c. V-VI. PROT.

Araliaceae

Hedera helix L. subsp. *helix* Heura. Hiedra. Lierre. Ivy. BOSC,ROC(m). 1200-1700 m. cc. VIII-XI.

Asteraceae

Achillea chamaemelifolia Pourr. -. -. Achillée à feuilles de camomille. -. ROC(r)(si). 1230-1680 m. r. VII-VIII.

Achillea millefolium L. - Herba de tall, milfulles. Milenrama. Achillée millefeuille. Yarrow. PRAT,HERB(v). cc. V-X.

Achillea nana L. ERROR.

Achillea odorata L. Lladracà. Camomila. Achillée odorante. Cream flowered Sneezewort. PRAT(s). 1350-1780 m. r. VI-VIII.

Achillea ptarmica L. ERROR.

Achillea pyrenaica Godr. [*A. ptarmica* L. subsp. *pyrenaica* (Godr.) Heimerl] Camamilla de muntanya, camamilla. -. Achillée des Pyrénées. -. AQUA(f). 1225-2650 m. c. VI-X.

Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern. subsp. *alliariae* -. -. Adénostyle à feuilles d'alliaire. -. HERB(m), MAT(n). 1500-1450 m. c. VI-IX.

Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh. subsp. *pyrenaica* (Lange) M. Dillenberger & Kadereit [*A. alliariae* subsp. *pyrenaica* (Lange) Rouy; *A. alliariae* subsp. *hybrida* auct.]. ERROR.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. subsp. *helvetica* (Chrtek & Pouzar) Chrtek & Pouzar Antenària carpàtica. -. Antennaire des capates. -. PRAT. 2100-2750 m. c. VII-IX.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Pota de gat. -. Pied-de-chat dioïque. -. PRAT(ac). 1400-2700 m. ccc. V-VII.

Anthemis arvensis L. subsp. *arvensis* Camamilla borda. Manzanilla silvestre. Camomille sauvage. Corn chamomile. ARV,RUD. 1240-1320 m. rr. VI-IX.

Anthemis austriaca Jacq. ERROR.

Anthemis cotula L. Camamilla pudent. -. Anthémis fétide. Stinking chamomile. RUD(t). 1280 m. rrr. VI. rr.

Anthemis cretica L.

subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson Àntemis de muntanya. -. Anthémis des Carpates. -. ROC,PRAT(s). r. 1970-2480 m. VI-VIII.

var. *macrocephala* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Benedi González. [subsp. *petraea* (Ten.) R. Fernandes; *A. petraea* Ten.] ERROR.

subsp. *saxatilis* (DC.) R. Fern. ERROR.

Arctium lappa L. subsp. *lappa* -. Bardana. Bardane commune. Beggar's Buttons. HERB(v). 1220 m. rrr. VIII.

Arctium minus (Hill) Bernh. Enganxadones, repalassa. Lampazo. Bardane à petites têtes. Lesser Burdock. RUD. ccc. VII-IX.

Arnica montana L. subsp. *montana* Àrnica. Árnica. -. -. PRAT(ac). 1350-2410 m. r. VII-VIII. PROT. DEC. EA.

Artemisia absinthium L. Donzell. Ajenjo. Absinthe. Wormwood. RUD(s). 1200-2050 m. c. VII-IX.

Artemisia campestris L. [*A. campestris* subsp. *glutinosa* (Besser) Batt.] Botja llemenosa. Escobilla parda. Armoise des champs. Field Sagewort. PRAT(s),ROC(m). 1260-1380 m. rrr. VII-VIII.

Artemisia genipi Weber. ERROR.

Artemisia glacialis L. ERROR.

Artemisia umbelliformis Lam. [*A. gabriellae* Braun-Blanq.] Artemisia de muntanya. -. Génépi laineux. -. ROC. 2200-2800 m. rr. VII-VIII.

Artemisia verlotiorum Lamotte -. -. Armoise de chine. Chinese wormwood. RUD. 1200-1340 m. c. VIII-X. AL/INV.

Artemisia vulgaris L. Altimiri, altimira. -. Armoise citronnelle. Mugwort. RUD. 1200-1920 m. ccc. VI-IX.

Aster alpinus L. Àster alpi. Aster alpino. Aster des Alpes. -. PRAT. 1500-2800 m. c. VI-IX.

Aster amellus L. ERROR.

Atractylis cancellata L. ERROR.

- Bellis perennis* L. Margarita, margarideta. Bellorita silvestre. Pâquerette. Daisy. RUD(t). 1200-2000 m. c. III-VI.
- Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan. [*Micropus erectus* L.] -. -. Cotonnière dressée. Micropus. PRAT(r). 1430 m. rrr. VI.
- Carduus acanthoides* L. [*Carduus acanthifolius* Salisb.] ERROR.
- Carduus broteri* (Welw. ex Mariz) Cout. ERROR.
- Carduus carlinifolius* Lam. [*C. defloratus* L. subsp. *carlinifolius* (Lam.) Arènes] Card prim-cardo de montaña. Chardon à feuilles de carline. -. PRAT(s)(r),ROC(t). 1400-2200 m. c. 1400-2200 m. cc. VII-IX.
- Carduus carlinoides* Gouan subsp. *carlinoides* Card carlinoide. Cardo blanco pirenaico. Chardon fausse carline. Pyrenean thistle. ROC(t). 1700-2640 m. c. VII-IX.
- Carduus crispus* L. subsp. *multiflorus* (Gaudin) Franco [*C. crispus* L. subsp. *occidentalis* Chassagne et Arènes] Card cresp. Cardo crispado. Chardon à fleurs nombreuses. Welled Thistle. RUD. 1200-1800 m. rr. VI-VIII.
- Carduus defloratus* L. ERROR.
- Carduus defloratus* subsp. *medius* (Gouan) Bonnier [*Carduus medius* Gouan] ERROR.
- Carduus litigiosus* Nocca & Balb. ERROR.
- Carduus nutans* L. Card nutant. -. Chardon penché. Musk thistle. RUD. 1500-1760 m. rrr. VII.
- Carduus ×bergadensis* Sennen [*C. leridanus* Devesa & Talavera; *C. carlinifolius* × *C. nutans*] 1400 m. rrr.
- Carduus ×nuriae* Sennen & Pau [*C. crispus* subsp. *multiflorus* × *C. carlinifolius*] rrr.
- Carlina acanthifolia* All. subsp. *cynara* (Pourr. ex Duby) Arcang. - Carlina. Carlina. Carline artichaut. -. PRAT. c. VI-IX.
- Carlina acaulis* L. subsp. *caulescens* (Lam.) Schübl. et Martens. Carlina borda. Ajonjera. Carline caulescente. Stemless carline thistle. PRAT. 1200-2500 m. c. VI-IX.
- Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo [*C. hispanica* Lam.] - RUD(t). 1230 m. rrr.
- Carlina vulgaris* L. subsp. *spinosa* (Velen.) Vandas Carlina de monte. -. Carline thistle. PRAT(s). 1200-1720 m. c. VI-VII.
- Carlina ×vayredae* Gaut. [*C. acanthifolia* subsp. *cynara* × *C. acaulis* subsp. *caulescens*] PRAT. 1450 m. rrr.
- Centaurea calcitrapa* L. Obriülls. Cardo estrellado. Centaurée chausse-trappe. Purple star-thistle. RUD(t), ARV. 1200-1780 m. c. VI-IX.
- Centaurea cephalariifolia* Willk. [*C. scabiosa* subsp. *cephalariifolia* (Willk.) Greuter] -. -. -. Greater knapweed. PRAT,RUD. 1200-1880 m. c. VI-VIII.
- Centaurea jacea* L. subsp. *vinyalsii* (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda Caps de burro, caps blaus. Centaurea de prado. Centaurée jacée. -. PRAT. 1200-1920 m. cc. VI-X.
- Centaurea nigra* L. subsp. *nigra* Caps de burro. Aciano negro. Centaurée noire. Lesser knapweed. PRAT(h). 1240-1840 m. r. VI-IX.
- Centaurea pectinata* L. MAT(g). 1840 m. rrr.
- Cicerbita alpina* (L.) Wallr. [*Lactuca alpina* (L.) A. Gray] HERB(m). 2200-2340 m. rrr. VII-VIII.
- Cicerbita muralis* (L.) Wallr. subsp. *muralis* [*Mycelis muralis* (L.) Dumort.] Caps de burro. Cañamones. Centaurée noire. Lesser knapweed. BOSC(h). 1240-1780 m. c. VI-IX.
- Cichorium intybus* L. subsp. *intybus* Xicoira. Achicoria amarga. Chicorée amère. Chicory. RUD(t). rr. 1200-1280 m. VII.
- Cirsium acaulon* (L.) Scop. subsp. *acaulon* [*C. acaule* Scop.] Calcida acaule. Cardo. Cirse acaule. Dwarf Thistle. PRAT(h). 1240-2325 m. cc. VI-IX.
- Cirsium arvense* (L.) Scop. Calcida. Cardo blanco. Cirse des champs. Canada Thistle. RUD,ARV. 1200-1800 m. c. VI-IX.
- Cirsium eriophorum* (L.) Scop. Cardigassa. Cardo plumero. Cirse de Richter. Woolly thistle. PRAT(r),RUD. 1200-2020 m. cc. VII-X.
- Cirsium erisithales* (Jacq.) Scop. DUBT.LOC.
- Cirsium filipendulum* Lange [*Cirsium anglicum* subsp. *filipendulum* (Lange) Douin]. ERROR.
- Cirsium monspessulanum* (L.) Hill Capferrat. Cardo hemorroidal. Cirse de Montpellier. -. AQUA(j). 1220-1460 m. r. VI-IX.
- Cirsium palustre* (L.) Scop. Cardigassa palustre. Cardo palustre. Cirse des marais. Marsh thistle. AQUA(j,m). 1200-2200 m. c. VII-IX.

- Cirsium richterianum* Gillot subsp. *costae* (Sennen & Pau) Talavera & Valdés [*C. eriophorum* var. *costae* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] - PRAT,RUD. 1340-1550 m. rr.
- Cirsium rivulare* (Jacq.) All. Cardigassa rivular. Cardo gigante de río. Cirse des ruisseaux. Brook thistle. AQUA (j,f). 1200-1800 m. c. VI-VIII. DEC.
- Cirsium tuberosum* (L.) All. Cardigassa tuberosa. -. Cirse tubéreux. Tuberous Thistle. PRAT(h). 1520-2200 m. r. VII-VIII.
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. Card. Cardo borriquero. Cirse commun. Spear thistle. RUD. 1200-2100 m. c. VI-IX.
- Cirsium xneyrae* E.G. Camus [*C. borderei* Rouy, *C. monspessulanum* × *C. palustre*] AQUA(j). 1550 m. rrr. VII.
- Cirsium xmedium* All. [*C. acaulon* subsp. *acaulon* × *C. tuberosum*] PRAT. 2120 m. rrr. VIII.
- Cladanthus mixtus* (L.) Chevall. [*Anthemis mixta* L.; *Chamaemelum mixtum* (L.) All.] RUD. 1900 m. AL/AC.
- Cota triumfettii* (L.) J. Gay [*Anthemis triumfettii* (L.) DC.] Cota de bosc. -. Anthémis de Trionfetti. Southern Dog-daisy. HERB(v),PRAT(h). 1440-1700 m. rr. VII.
- Crepis albida* Vill. [*C. albida* subsp. *macrocephala* (Willk.) Babç.; *C. albida* subsp. *scorzoneroides* (Rouy) Babç.] - ROC. 1475-1750 m. rrr.
- Crepis blattarioides* (L.) Vill. [*C. conyzifolia* (Gouan) A. Kern.] PRAT(ac,h). 2020 m. rrr. VII-IX. EA.
- Crepis capillaris* (L.) Wallr. [*C. virens* subsp. *capillaris* (L.) Cout.] *Crepis capillar*. -. Crépe à tiges capillaires. Smooth Hawk's-beard. PRAT(h,t),RUD(h).1220-1980 m. cc. VI-VIII.
- Crepis foetida* L. subsp. *foetida* -. -. Crépe fétide. Stinking hawk's-Beard. RUD(t). 1240 m. rrr. VI.
- Crepis lampsanoides* (Gouan) Tausch. BOSC(br),HERB(v). 1480-1530 m. rrr. DEC. EA.
- Crepis mollis* (Jacq.) Asch. *Crepis blana*. -. Crépe molle. Northern Hawk's-beard. PRAT(h). HERB(m),BOSC(r). 1320-2020 m. rrr. VII-VIII. DEC. EA.
- Crepis paludosa* (L.) Moench. ERROR.
- Crepis pygmaea* L. *Crepis nana*. -. Crépe naine. -. ROC(t). 2420-2780 m. r. VII-IX.
- Crepis pyrenaica* (L.) Greuter *Crepis pirinenca*. -. Crépe des Pyrénées. -. HERB(m),PRAT(h). 1420-2100 m. r. VII-VIII.
- Crepis setosa* Haller fil. subsp. *setosa* -. -. Crépe hérissée. Bristly hawk's-beard. RUD(h,t). 1220-1680 m. r. V-VIII.
- Crepis taraxacifolia* Thuill. [*C. vesicaria* L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.] Cama-roja roja. -. Crépe à feuilles de pissenlit. -. RUD(h,t). 1200-1460 m. r. V-VII.
- Cyanus triumfettii* (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve [*Centaurea triumfettii* All. subsp. *semidecurrans* (Jord.) Dostál; *C. montana* subsp. *semidecurrans* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. -. *Centaurea triumfettii* . Squarrose Knapweed. RUD(t),PRAT. 1980-2200 m. rr. VII-VIII.
- Cynara cardunculus* L. [*C. scolymus* L.; *C. cardunculus* subsp. *scolymus* (L.) Hegi]. Herba-col. -. -. ARV,RUD. 1240-1280 m. rr. VII. AL/AC.
- Doronicum austriacum* Jacq. ERROR.
- Doronicum glaciale* (Wulfen) Nyman ERROR.
- Doronicum grandiflorum* Lam. Dorònic de pedrusca. Árnica fals. Doronic à grandes fleurs. -. ROC(t). 2400-2700 m. rr.VII-IX.
- Doronicum pardalianches* L. Dorònic cordat. Doronico. Doronic à feuilles cordées. -. BOSC(h)(br). 1200-1680 m. rr. V-VII.
- Echinops sphaerocephalus* L. subsp. *sphaerocephalus* Card d'eriçó. -. Oursin à têtes rondes. Common Globe-thistle. 1340-1620 m. rrr. VII.
- Erigeron acris* L. [*E. acer* L. subsp. *acer*] Herba de dolor. -. Vergerette âcre. -. PRAT. 1200-2100 m. c.VII-VIII.
- Erigeron alpinus* L. [*E. pyrenaicus* (Pourr.) A.W. Hill; *E. verguinii* Sennen] PRAT. r. 1550-2300 m. VII-IX.
- Erigeron annuus* (L.) Pers. -. Estenactis. Erigeron anual. Vergerette annuelle. Daisy fleabane. PRAT,RUD. c. 1200-2000 m. c. VI-X. AL/INV.
- Erigeron aragonensis* Vierh. [*E. uniflorus* L. subsp. *aragonensis* (Vierh.) O. Bolòs & Vigo] Erígeron aragonès. Vergerette d'Arago. -. PRAT(ac). 2000-2800 m. cc. VI-VIII.
- Erigeron canadensis* L. [*Conyza canadensis* (L.) Cronq.] Coniza canadenca. -. Vergerette du Canada. Horsetweed. RUD. 1200-1980 m. cc.VI-IX. AL/INV.
- Erigeron glabratus* Bluff & Fingerh. subsp. *occidentalis* (Vierh) A. Pujadas [*E. polymorphus* subsp. *occidentalis* Vierh.] Erigeron glabre. Vergerette glabre. Variable fleabane. PRAT(ac). 1900-2480 m. c. VII-IX.

- Eupatorium cannabinum* L. subsp. *cannabinum* Canabassa. Eupatorio. Eupatoire chanvrine. Hemp agrimony. HERB(v,h). 1200-1640 m. cc. VI-IX.
- Filago germanica* (L.) Huds. [*F. vulgaris* Lam., *F. pyramidata* subsp. *canescens* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. Filago vulgar. Cotonnière commune. Common Cottonrose. PRAT(r). 1260 m. rrr. VII.
- Filago lutescens* Jord. [*F. pyramidata* subsp. *lutescens* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] -. Cotonnière jaunâtre. Red-tipped Cudweed. PRAT(r),RUD(t). 1240-1420 m. rr. VI-VIII.
- Filago pyramidata* L. [*F. obovata* Pomel; *F. pyramidata* var. *obovata* (Pomel) Wagenitz; *F. pyramidata* var. *prostrata* (Fiori) Wagenitz] Herba del borm. Hierba algodónera. Cotonnière à feuilles spatulées. Broad-leaved Cudweed. PRAT(r). 1260 m. rrr. VII.
- Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav. [*G. ciliata* (Raf.) S.F. Blake; *G. parviflora* subsp. *hispida* (DC.) O. Bolòs & Vigo] Galinsoga. Galinsoga. Galinsoga à petites fleurs. Gallant soldier. ARV,RUD. 1200-1300 m. r. VI-IX. AL/ESP.
- Gnaphalium uliginosum* L. [*Filaginella uliginosa* (L.) Opiz] Gnafali uliginós. -. Cotonnière des fanges. March Everlasting. AQUA(j). 1560 m. rrr. VIII.
- Helianthus tuberosus* L. Trumfa nyama, nyàmera. Tupinambo. Topinambour. Jerusalem artichoke. RUD(h),BOSC(br). 1200- 1560 m. c. IX-X.
- Helminthotheca echioides* (L.) Holub [*Picris echioides* L.] Arpell. Lengua de gato. Picris fausse vipérine. Bristly Oxtongue. RUD. 1240 m. rrr.VII.
- Hieracium** Gènere que encara requereix un esforç important. EA.
- Hieracium alatum* Lapeyr. BOSC(per),MAT(ac). 1600-2450 m m. rrr. VII.
- Hieracium amplexicaule* L. Herba de l'esperver. Hieracio amplexicaule. Épervière embrassante. -. ROC(r). 1340-2640 m. c. VI-VIII.
- Hieracium anadenum* (Burnat & Gremli) Arv.-Touv. [*H. bellidioides* Arv.-Touv. & Gaut.]. ERROR.
- Hieracium attractum* Arv.-Touv. [*H. vogesiacum* subsp. *attractum* (Arv.-Touv.) O. Bolòs & Vigo] 1625m. rrr.
- Hieracium bifidum* Hornem. ERROR.
- Hieracium bourgaei* Boiss. [*H. bicolor* subsp. *bourgaei* (Boiss.) Zahn; *H. catolanum* Arv.-Touv.] ROC. 1800 m. rrr.
- Hieracium candidum* Scheele ROC(ca). 1780-2300 m. rrr. VII-VIII.
- Hieracium cerinthoides* L. HERB(v)(ac). 1320 m. rrr. VII.
- Hieracium cordatum* Costa [incl. *H. glaucophyllum* Scheele and *H. hispanicum* Arv.-Touv.] ROC. 1300 m. rrr. VII.
- Hieracium glaucinum* Jord. [*H. praecox* Schultz.-Bip.] -. Épervière bleuâtre. -. BOSC,PRAT. 1320-1680 m. c. VII.
- Hieracium gouanii* Arv.-Touv. [*H. cordifolium* subsp. *gouanii* (Arv.-Touv.) Zahn; ?*H. vernicosum* Arv.-Touv.] ROC(r),HERB(v). 1240-1480 m. rr. VII-VIII.
- Hieracium gymnocerinthe* Arv.-Touv. & Gaut. DUBT.DET.
- Hieracium hirsutum* Tausch - ERROR.
- Hieracium lachenalii* Suter [*H. vulgatum* subsp. *lachenalii* (Suter) Zahn; *H. vulgatum* auct.] LOC.PROP.
- Hieracium laevigatum* Willd. DUBT.LOC.
- Hieracium lamprophyllum* Scheele 2100 m. rrr
- Hieracium langei* Fr. BOSC(ac). 2175 m. rrr. VII.
- Hieracium lawsonii* Vill. [*H. saxatile* Vill., nom. illeg.] DUBT.LOC.
- Hieracium lychnitis* Scheele [*H. compositum* auct., non Lapeyr.] LOC.PROP.
- Hieracium murorum* L. Esperver de murs. Hieracio común de bosque. Épervière des murs. Wall hawkweed. BOSC,HERB(v). 1240- 2080 m. c. VI-IX.
- Hieracium neocerinthae* (Fr.) Zahn [*H. cordifolium* subsp. *neocerinthae* (Fr.) Zahn] 1525. rrr.
- Hieracium neopicris* Arv.-Touv. LOC.PROP.
- Hieracium nobile* Gren. & Godr. 2400 m. rrr.
- Hieracium olivaceum* Gren. & Godr. [*H. juranum* subsp. *olivaceum* (Gren. & Godr.) Greuter] 2000 m. rrr.
- Hieracium patens* Bartl. [*H. rectum* auct.] BOSC(ac). 1350m. rrr.
- Hieracium phlomoides* Froel. DUBT.LOC.
- Hieracium piliferum* Hoppe. 2025 m. rrr.
- Hieracium prenanthoides* Vill. LOC.PROP. DUBT.DET.
- Hieracium pseudocerinthae* (Gaudin) W.D.J. Koch 2000 m. rrr
- Hieracium purpurascens* Willk. LOC.PROP.
- Hieracium sabaudum* L. BOSC,MAT,HERB(v)(ac). 1240-1640 m. c. VII-IX.

- Hieracium saxifragum* Fr. [*H. onosmoides* Fr.] 2125 m. rrr.
- Hieracium schmidtii* Tausch [*Hieracium aymericianum* Arv.-Touv.]. PRAT,ROC(t). 2000 m. NO RETR.
- Hieracium solidagineum* Fr.- BOSC. 1500 m. rrr.
- Hieracium umbellatum* L. BOSC(ac). 1340 m. rrr. VII.
- Hieracium villosum* Jacq. LOC.PROP. DUBT.DET.
- Homogyne alpina* (L.) Cass. Homògine. -. Homogyne des alpes. -. MAT(n). 1940-2340 m. r. VI-VIII.
- Hypochaeris radicata* L. subsp. *radicata* Herba plana. Barbas de chivo. Porcelle enracinée. Gosmore. PRAT. 1200-1890 m. cc. VI-IX.
- Hypochaeris uniflora* Vill. ERROR.
- Jacobaea adonidifolia* (Loisel.) Mérat [*Senecio adonidifolius* Loisel.] Herba dels talls. Suzón fino. Séneçon à feuilles d'adonis. -. MAT(si). 1240-2200 m. c. VI-IX.
- Jacobaea erucifolia* (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. *erucifolia* [*Senecio erucifolius* L.] - RUD(t). 1780 m. rrr
- Jacobaea leucophylla* (DC.) Pelsér [*Senecio leucophyllus* DC.] Herba blanca. Yerba blanca. Séneçon à feuilles blanches. -. ROC(t). 1700-2850 m. c. VII-IX. PROT.
- Jasonia tuberosa* (L.) DC. AQUA(t). 1240 m. rrr.
- Jurinea humilis* (Desf.) DC. ERROR.
- Lactuca plumieri* (L.) Gren. & Godr. [*Cicerbita plumieri* (L.) Kirschl.] Lletuga de muntanya. Cerraja lechuguera. Laitue de plumier. Hairless blue sow-thistle. HERB(m). 1580-2060 m. r. VII-VIII.
- Lactuca serriola* L. Enciam bord. Lechuga espinosa. Laitue sauvage. Prickly lettuce. f. *serriola* RUD(h). 1200-1560 m. r. VIII.
- f. *integrifolia* Bogenhard RUD(he). 1300 m. r. IX.
- Lactuca virosa* L. RUD. 1600 m. rrr.
- Lapsana communis* L. -. Hierba de los pechos. Lampsane commune. Common Nipplewort. RUD(h). 1220-1620 m. c. VI-VIII.
- Leontodon hispidus* L. subsp. *hispidus* (DC.) Soják Queixalets, leontodon híspid. Leontodon de prado. Liondent hispide. Greater hawkbit. PRAT. 1220-2340 m. ccc. VI-IX.
- Leontopodium nivale* subsp. *alpinum* (Cass.) Greuter [*L. alpinum* Cass. subsp. *alpinum*]. ERROR.
- Leucanthemopsis alpina* (L.) Heywood subsp. *minima* (Vill.) Holub. Margarida alpina. Piretro alpino. Leucanthème des Alpes. Alpine moon-daisy. PRAT,ROC(t). 1920-2850 m. c. VI-X.
- Leucanthemum ageratifolium* Pau [*L. vulgare* Lam. subsp. *pujiulae* Sennen] Margarita de prat. Margarita mayor. Marguerite. Ox-eye daisy. PRAT,HERB(h,v). 1200-1870 m. cc. V-VIII.
- Leucanthemum atratum* (Jacq.) DC. DUBT. DET. EA.
- Leucanthemum catalaunicum* Vogt [*L. vulgare* subsp. *catalaunicum* (Vogt) O. Bolòs & Vigo; *L. maximum* auct.] Margarida. -. Marguerite géante. -. PRAT(s),ROC(t). 1450-2120 m. r. V-IX.
- Leucanthemum delarbrei* Timb.-Lagr. subsp. *ruscinonense* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Vogt, F. Wagner & Oberpr. [*L. monspeliense* auct., non (L.) H.J. Coste] -. -. Marguerite de Montpellier. -. ROC(r). 1950-2800 m. rr. VI-VIII.
- Leucanthemum maximum* (Ramond) DC. ERROR.
- Leucanthemopsis pallida* (Mill.) Heywood ERROR.
- Logfia minima* (Sm.) Dumort. [*Filago minima* (Sm.) Pers.] Filago mínima. -. Cotonnière naine. Little Cottonrose. PRAT(r). 1250-1340 m. rr. VII.
- Matricaria chamomilla* L. [*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert] Camamila. Camamila. Camomille sauvage. German Chamomile. ARV,RUD(t). 1260 m. rr. VI.
- Matricaria discoidea* DC. [*Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb.; *Matricaria suaveolens* (Pursh) Buchen., non L.] -. -. Matricaire odorante. Pineapple weed. RUD(t). 1200-2100 m. c. VI-IX.
- Omalothea norvegica* (Gunnerus) Sch. Bip. & F.W. Schultz [*Gnaphalium norvegicum* Gunnerus] ERROR.
- Omalothea supina* (L.) DC. [*Gnaphalium supinum* L.] Gnafali nan. Borosilla de montaña. Gnaphale nain. Dwarf cudweed. AQUA(c). 2100-2720 m. r. VII-IX. DEC. EA.
- Omalothea sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz [*Gnaphalium sylvaticum* L.] Gnafali selvàtic. Algodonosa de bosque. Gnaphale des bois. -. HERB(c). 1200-2200 m. r. VII-IX.
- Onopordum acanthium* L. subsp. *acanthium* Cardot gros. Cardo borriquero. Chardon aux ânes. Cotton Thistle. RUD(h). 1450-1670 m. rr. VII-VIII.
- Onopordum acaulon* L. RUD. 1560 m. rrr.

- Pallenis spinosa* (L.) Cass. subsp. *spinosa* [*Asteriscus spinosus* (L.) Schulz Bip. subsp. *spinosus*] ROC(m). 1220 m. rrr.
- Pentanema conyzae* (Griess.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart. Ort. [*Inula conyzae* (Griess.) DC.] Ínula. Coniza. Herbe aux mouches. Ploughman's spikenard. HERB(v). 1200-1580 m. r. VII-IX.
- Picris hieracioides* L. [*P. hieracioides* subsp. *rielii* (Sennen) O. Bolòs & Vigo; *P. hieracioides* subsp. *villarsii* (Jord.) Nyman] Parraca. Parraca. Picris fausse épervière. Hawkweed. PRAT,HERB,ROC(t)(s). 1200-2200 m. ccc. VI-XI.
- Pilosella billyana* (de Retz) Mateo [*Hieracium billyanum* de Retz]. BOSC. 1450 m. rrr. EA.
- Pilosella breviscapa* (DC.) Soják [*Hieracium breviscapum* DC.; *H. pumilum* Lapeyr.] Herba de l'esperver. -. Piloselle à tiges courtes. -. PRAT 1680-2720 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella glacialis* (Reyn.) F.W.Schultz & Sch.Bip. [*Hieracium glaciale* Reyn.] ERROR.
- Pilosella heteromelana* (Zahn) Mateo [*Hieracium hypeuryum* subsp. *heteromelanum* Zahn] PRAT(ac). 1850-2100 m. c. VII-VIII.
- Pilosella hoppeana* (Schult.) F. W. Schultz & Sch. Bip. [*Hieracium hoppeanum* Schult.] ERROR.
- Pilosella lactucella* (Wallr.) P.D. Sell & C. West [*Hieracium lactucella* Wallr.] -. -. Piloselle auricule. -. PRAT(ac). 1420-2540 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella officinarum* Vaill. [*Hieracium pilosella* L.] Herba cancera. Pelosilla. Piloselle. Mouse-ear hawkweed. PRAT. r. VII-VIII.
- Pilosella peleteriana* (Merat) F.W. Schultz & Sch. Bip. [*Hieracium peleterianum* Merat] -. -. Piloselle de Lepèletier. Shaggy Mouse-ear-hawkweed. PRAT,MAT(ac). 1400-2300 m. cc. VII-VIII.
- Pilosella saussureoides* Arv.-Touv. [incl. *P. tardans* (Peter) Soják; *Hieracium niveum* (Müll.-Arg.) Zahn] Pelosella. Pelosilla nivea. Piloselle. -. PRAT. cc. VI-VIII.
- Podospermum laciniatum* (L.) DC. [*Scorzonera laciniata* L.] Barball. Margallos. Scorsonère à feuilles de chausse-trape. Cutleaf Vipergrass. RUD(t). 1320 m. rrr. VII.
- Prenanthes purpurea* L. Prenantes. Ajonjera. Prénanthe pourpre. Purple lettuce. BOSC(h). 1260-2100 m. c. VII-VIII.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. subsp. *dysenterica* Herba de Sant Roc. Hierba de gato. Pulicaire dysentérique. Fleabane. AQUA(j). 1240-1350 m. rr. VII.
- Rudbeckia laciniata* L. HERB(h),BOSC(r). 1240 m. rrr. AL/INV/ER.
- Schlagintweitia chamaepicris* (Arv.-Touv.) Greuter [*Hieracium chamaepicris* Arv.-Touv.] 2300 m. rrr. EA.
- Scorzoneroideis autumnalis* (L.) Moench subsp. *autumnalis* [*Leontodon autumnalis* L. subsp. *autumnalis*] Leontodon autumnal. -. Liondent d'automne. Autumn Hawkbit. RUD,PRAT (t). 1200-1820 m. c.
- Scorzoneroideis carpetana* subsp. *duboisii* (Sennen) Gallego [*S. duboisii* (Sennen) Greuter; *Leontodon duboisii* Sennen] -. -. Liondent de dubois. -. AQUA(f,m). 1600-2600 m. c.
- Scorzoneroideis pyrenaica* (Gouan) Holub subsp. *pyrenaica* [*Leontodon pyrenaicus* subsp. *pyrenaicus* Gouan] Leontodon pirinenc. -. Liondent des Pyrénées. -. PRAT,ROC(r)(ac) 1820-2700 m. cc. VII-IX.
- Senecio doronicum* (L.) L. subsp. *longifolius* (Willk.) J. Calvo Llengua de bou. -. Séneçon doronic. -. PRAT(h). 1850 m. rrr. VII. EA.
- Senecio inaequidens* DC. Seneci del Cap. Senecio de El Cabo. Séneçon du cap. Narrow-leaved ragwort. RUD,MAT. 1200-2680 m. AL/INV.
- Senecio incanus* L. ERROR.
- Senecio pyrenaicus* L. in Loeff. subsp. *pyrenaicus* Leontodon pirinenc. -. Liondent des pyrénées. Pyrenean hawkbit. ROC(t),MAT. 1800-2750 m. c. VII-VIII.
- Senecio pyrenaicus* subsp. *caespitosus* (Brot.) Franc [*Senecio tournefortii* subsp. *caespitosus* (Brot.) Cout.]. ERROR.
- Senecio viscosus* L. Seneci viscos. Hierba cana viscosa. Séneçon visqueux. Fetid groundsel. ROC(t). 1320-2080 m. c. VII-IX.
- Senecio vulgaris* L. Xenixell. Casamelos. Séneçon commun. Groundsel. ARV,RUD. 1200-2000 m. cc. II-XII.
- Serratula tinctoria* L. Serràtula tintòria. Serratula. Serratule des teinturiers. Dyer's plumeless Saw-wort. BOSC,MAT,PRAT,AQUA(j,m)(ac). 1260-1600 m. cc. VII-IX.
- Silybum marianum* (L.) Gaertn. - RUD(h). 1230 m. AL/AC.
- Solidago canadensis* L. -. Vara de oro del Canadá. Gerbe-d'or. Canadian Goldenrod. HERB(h),BOSC(br). 1320 m. rrr. AL/INV.

- Solidago virgaurea* L. Herba daurada. -. Solidage verge-d'or. Common goldenrod- goldenrod. BOSC,MAT, PRAT. 1200-2680 m. cc. VII-IX.
- Sonchus asper* (L.) Hill subsp. *asper* Lletissó, lletsó. Cerraja dentada. Laiteron piquant. Prickly sow-thistle. RUD,ARV. 1200-2000 m. cc. VI-IX.
- Sonchus oleraceus* L. Lletissó, lletsó. Cerraja. Laiteron maraïcher. Smooth sow thistle. RUD,ARV. 1200-1670 m. c. VI-IX.
- Symphyotrichum pilosum* (Willd.) G.L. Nesom [*Aster pilosus* Willd.] Setembres, setembrines. -. -. Hairy aster. RUD(s),PRAT(s). 1200-1280 m. r. VII-XI. AL/INV.
- Symphyotrichum ×salignum* (Willd.) G.L. Nesom [*Aster salignus* Willd.; *S. lanceolatum* × *S. novi-belgii*] Setembrina. Cielo estrellado. Aster à feuilles de saule. Common New York aster. RUD. 1280 m. rrr. AL/AC.
- Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz Bip. subsp. *corymbosum* Crisantem corimbós. Tanaceto corimboso. Tanaisie en corymbes. Corymb-flower tansy. HERB(v). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.
- Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. Segura. Segura. Grande camomille. Feverfew. RUD. 1220-1430 m. rr. VI. AL/AC.
- Tanacetum vulgare* L. [*Chrysanthemum tanacetum* Karsch, non Vis.] Tanarida. Tanaceto. Tanaisie. Tansy. RUD. 1200-2000 m. rr. VI-X.
- Taraxacum gasparrinii* Lojac. [? *T. laevigatum* auct.] -. -. Pissenlit. -. RUD(t,r). 1280-1700 m. rrr. VI.
- Taraxacum officinale* Weber in Wiggers Pixallits. Diente de león. -. Common dandelion. RUD(t),PRAT(t). ccc. II-XI.
- Taraxacum panalpinum* Soest [*T. alpinum* (Hoppe) Hegetschw., comb. illeg.] 2000 m. rrr. EA.
- Taraxacum pyrenaicum* Reut. [*T. dissectum* auct.] Xicoina, xicoia. -. Pissenlit découpé. -. PRAT(t),RUD(t). 1200-2650 m. cc.
- Thrinia hispida* Roth [*Leontodon taraxacoides* subsp. *hispidus* (Roth) Kerguelen; *L. rothii* Ball, nom. illeg.; *L. saxatilis* subsp. *rothii* Maire; *L. taraxacoides* subsp. *longirostris* Finch & P.D. Sell] -. -. Liondent à bec long. PRAT(s). 1280 m. rrr. VII. EA.
- Tragopogon dubius* Scop. Inflabous. -. Salsifis douteux. -. RUD(h). 1240 m. rrr. VI.
- Tragopogon pratensis* L. Salsifí de prat. -. -. -. subsp. *lamottei* (Rouy) O.Bolòs et Vigo - PRAT(h). 1240-2150 m. c. VI-VIII.
- subsp. *pratensis* L. PRAT(h). 1420-1680 m. rr. VI-VIII.
- Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh. [*Hypochaeris maculata* L.] Herba del porc. -. Porcelle tachetée. -. PRAT(ac). 1340-2240 m. r. VI-VIII.
- Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip. [*Matricaria maritima* subsp. *inodora* (L.) Soó; *M. perforata* Mérat] -RUD(t). 1200 m. rrr. EA.
- Trommsdorffia maculata* (L.) Bernh. [*Hypochaeris maculata* L.; *H. pyrenaica* Sennen] - Herba del porc. -. Porcelle tachetée. -. PRAT(ac). 1550-2400 m. r. VII-VIII.
- Tussilago farfara* L. Pota de cavall, peu d'euga. Tusilago. Pas-d'âne. Coltsfoot. AQUA(j,b),BOSC(br). 1200-2100 m. c. III-IV.

Balsaminaceae

- Impatiens balfourii* Hook. f. BOSC(c). 1220 m. rrr. AL/INV.

Betulaceae

- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. Vern. Aliso. Aulne glutineux. Black alder. BOSC(br). 1200-1600 m. c. III-V. DEC. EA.
- Betula pendula* Roth. Beç, bedoll. Abedul. Bouleau verruqueux. Silver birch. BOSC(h,br). 1200-2200 m. cc. IV-V.
- Betula pubescens* Ehrh. Beç, bedoll pubescent. Chopà blanca. Bouleau blanc. White birch. BOSC(br). 1480-2000 m. r. IV.
- Betula ×aschersoniana* Hayek [*B. pendula* × *B. pubescens*] BOSC(br). 1580 m. rrr.
- Corylus avellana* L. Avellaner. Avellano. Noisetier. Common hazel. BOSC. 1200-2000 m. ccc. II-IV.

Boraginaceae

- Aegonychon purpureocaeruleum* (L.) J. Holub [*Lithospermum purpureocaeruleum* L.; *Buglossoides purpureocaeruleum* (L.) I.M. Johnst.] Mill gruà. -. Grémil bleu pourpre. Purple gromwell. BOSC(br). 1240 m. rrr. V.
- Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. subsp. *arvensis* *Ancusa arvensis*. Miel de avispa. Buglosse des champs. Annual bugloss. ARV. 1250 m. rr. V. AL/ESP.
- Asperugo procumbens* L. - RUD(r). 1550-1750 m. rrr.
- Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. subsp. *arvensis* [*Lithospermum arvense* L. subsp. *arvense*] Mill de sol petit. Mijo de sal. Grémil des champs. Corn Gromwell. ARV. 1240-1310 m. rr. IV-VI.
- Cynoglossum officinale* L. Besneula. Viniega. Cynoglosse officinale. Hound's-tongue. HERB(r). 1680 m. rrr.
- Echinopsium pyrenaicum* Vayr. ERROR.
- Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Bonnier & Layens [*E. vulgare* L. subsp. *argentea* (Pau) Font Quer] Viperina. Viborera común. -. -. PRAT(s),RUD(s). 1200-2000 m. IV-X.
- Echium vulgare* L. subsp. *vulgare* - Viperina. Viborera común. -. -. 1230-1670 m. r. VI-VII.
- Lithospermum officinale* L. Mill del sol, mill gruà. Mijo de sol. Grémil officinal. Gromwell. 1200-2020 m. c. V-VIII.
- Myosotis alpestris* F.W. Schmidt subsp. *alpestris* [*M. sylvatica* subsp. *alpestris* (F.W. Schmidt) Gams] Miosotis alpestre. Nomeolvides alpino. Myosotis des Alpes. Alpine wood forget-me-not. PRAT. 1580-2800 m. V-VIII. cc.
- Myosotis alpestris* subsp. *pyrenaeorum* (Blaise & Kerguelen) Valdes [*M. pyrenaica* auct., non Pourr.; *M. alpina* Lapeyr.] PRAT(r),ROC(t). 2200-2580 m. r. VII-IX.
- Myosotis arvensis* (L.) Hill. subsp. *arvensis* Nomoblidis de camp. Nomeolvides. Myosotis des champs. Common scorpiongrass. ARV,RUD,HERB(v). 1200-2050 m. c. VI-VIII.
- Myosotis decumbens* subsp. *teresiana* (Sennen) Grau [*M. sylvatica* Hoffm. subsp. *teresiana* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] Miosotis de bosc. Nomeolvides de prado. Myosotis. Wood forget-me-not. BOSC(h). 1200-2050 m. cc. V-VIII.
- Myosotis hervei* Sennen [*M. palustris* subsp. *tuxeniana* O. Bolòs & Vigo; *M. tuxeniana* (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo] Miosotis d'aigua. -. -. Water forget-me-not. AQUA(f,cr). 1200-1800 m. r. DEC. EA.
- Myosotis ramosissima* Rochel subsp. *ramosissima*. ERROR.
- Myosotis stricta* Roem. & Schult. PRAT(r). 2000-2340 m. rrr. VII-VIII.
- Pulmonaria affinis* F.W. Schultz Fulles de la mare de déu, pulmonària de fulla ampla. -. Pulmonaire semblable. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. V.
- Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau [*P. longifolia* subsp. *cevennensis* Bolliger] Fulla o fulles de la Mare de Déu, pulmonària de fulla estreta. Pulmonaria. Pulmonaire à feuilles longues. -. BOSC(s),PRAT(s). 1220-1820 m. c. IV-VI.
- Symphytum uplandicum* Nyman Consolda. Consuelda mayor. Consoude. Russian Comfrey. AQUA(h). 1240 m. rrr. VI. AL/AC.
- Symphytum tuberosum* L. subsp. *tuberosum* Consolda. Consuelda menor. Consoude tubéreuse. Tuberous comfrey. BOSC(h,br). 1220-1700 m. rr. V-VI.

Brassicaceae

- Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande Herba d'all. Hierba del ajo. Alliaire. Garlic mustard. RUD(h),BOSC(h). 1200-1620 m. cc. V-VI.
- Alyssum alyssoides* (L.) L. Herba de la ràbia. Alisón calicino. Alysson à calices persistants. -. PRAT(r). 1200-2100 m. c. V-VIII.
- Alyssum cacuminum* Spaniel, Marhold & Lihová [*A. cuneifolium* auct., non Ten.] ROC(t). 2300-2700 m. c. VII-VIII.
- Alyssum montanum* L. Error
- Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. Arabidopsis. -. Arabette de thalius. Mouse-ear cress. PRAT(r),ARV. 1230-1380 m. rrr. IV-VI.
- Arabis alpina* L. subsp. *alpina* Àrabis alpina. Arabieta de los Alpes. Arabette des alpes. Alpine rockcress. ROC(r,t)(h),BOSC(h). 1200-2620 m. c. V-VIII.

- Arabis ciliata*** Clairv. [*A. corymbiflora* Vest.] PRAT(s). 1500-2200 m. c. VI-VIII.
Arabis nova Vill. subsp. *nova* 1240-2000 m. rrr.
Arabis scabra All. Error.
- Arabis serpillifolia*** Vill. ROC(r,ca). 1000-2000 m. c. VI-VII.
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [*Armoracia lapathifolia* Gilib.] ERROR
- Barbarea intermedia*** Boreau *Barbarea* pirinenca. Barbàrea de hoja recortada. Barbarée intermédiaire.
 Intermediate yellow rocket. RUD,BOSC(br). 1200-2060 m. r. IV-VI.
- Barbarea verna*** (Mill.) Asch. RUD,BOSC(br). codolars. V-VI. 1125-1425 m.
- Biscutella coronopifolia*** L. [*B. laevigata* subsp. *coronopifolia* (L.) Rouy & Foucaud] PRAT,HERB(v). 1200-1340 m. r. VI-VIII.
- Biscutella intermedia*** Gouan [*B. pyrenaica* A. Huet; *B. laevigata* subsp. *pyrenaica* (Huet) Nyman] ROC(t). 2000-2700 m. c. VI-VIII.
- Biscutella laevigata*** L. subsp. *laevigata* Herba de les llunetes. Anteojos. Biscutelle commune. Buckler mustard. ROC(t),PRAT(ca). 1500-2340 m. c. VI-VIII.
- Bunias erucago*** L. ARV. 1260-1450 m. rr. V-VI.
- Capsella bursa-pastoris*** (L.) Medik. Caps blancs, bosses de pastor. Bolsa de pastor. Bourse-à-pasteur. Shepherd's purse. ARV,RUD. 1200-2200 m. cc. III-VI.
- Capsella rubella*** Reut. [*C. bursa-pastoris* subsp. *rubella* (Reut.) Hobkirk] RUD(t). 950-2050 m. rr. VI.
- Cardamine alpina*** Willd. [*C. bellidifolia* L. subsp. *alpina* (Willd.) B.M.G. Jones] *Cardamina alpina*. -. *Cardamine* des Alpes. -. AQUA(c)(si). 2500-2650 m. rr. VIII.
- Cardamine amara*** subsp. *pyrenaica* Sennen [*C. amara* L. subsp. *amara* auct., non L.] -. -. *Cresson amer.* -. AQUA(f). 1200-2380 m. c. V-VIII.
- Cardamine crassifolia*** Pourr. [*C. pratensis* subsp. *nuriae* (Sennen) Sennen] *Cardamine* à feuilles épaisses. -. AQUA(m)(f). 1600-2340 m. r. VI-VII.
- Cardamine heptaphylla*** (Vill.) O.E. Schulz Canuguera. Canudera. *Cardamine* à sept folioles. Pinnate coralroot. BOSC(h). 1220-1600 m. rr. IV-VI.
- Cardamine hirsuta*** L. *Cardamine hirsuta*. -. *Cardamine hirsute*. -. PRAT(r). 1200-1350 m. rr. II-V.
- Cardamine impatiens*** L. subsp. *impatiens* BOSC(h)(br). 1220-1670 m. cc. VI.
- Cardamine occulta* Hornem. RUD. 1240 m. rrr. VI. AL/INV.
- Cardamine pentaphyllos* (L.) Crantz NO RETR. DUBT.LOC. EA.
- Cardamine raphanifolia*** Pourr. [*C. pyrenaica* (L.) Rothm., nom. illeg., non Kuntze] *Cardamina* pirinenca. -. *Cardamine* à feuilles de radis. Greater cuckooflower. AQUA(f). 1240-1720 m. cc. V-VI.
- Cardamine resedifolia*** L. -. *Cardamine alpina*. *Cardamine* à feuilles de réséda. Mignonette-leaved bittercress. ROC(r,t,si). 1480-2780 m. cc. VI-VIII.
- Cardamine xenriquei*** Marhold, Lihová & Perny [*C. crassifolia* × *C. amara* subsp. *pyrenaica*] AQUA. 1975 m. rrr.
- Coincya monensis*** (L.) Greuter & Burdet subsp. *cheiranthos* (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. [*C. cheiranthos* (Vill.) Greuter & Burdet; *Hutera cheiranthos* (Vill.) Gómez-Campo] *Brassicella*. -. Moutarde giroflée. wallflower cabbage. ROC(t)(si). 1280-2200 m. c. VI-VIII.
- Descurainia sophia*** (L.) RUD(h)(t). rrr. 1400 m. VI.
- Diplotaxis eruroides*** (L.) DC. subsp. *eruroides* Ravenissa blanca. Rabaniza blanca. Roquette blanche. White wall rocket. ARV. 1200-1310 m. rr. IV-V.
- Diplotaxis muralis*** L.) DC. subsp. *muralis* RUD(t). 800-1250 m. rr. V-VI.
- Draba aizoides*** L. PRAT(c)(r)(ca). 1900-1700 m. r. VI-VII.
- Draba dubia*** Suter [*D. dubia* subsp. *laevipes* (DC.) Braun.-Blanq.] *Draba* dúbia. *Draba* de las cumbres. Drave des frimas. Austrian whitlowgrass. ROC(r). 2200-2700 m. c. V-VII.
- D. incana* L. ERROR.
- Draba nemorosa*** L. RUD(t). 1600-2100 m. rr. V-VI.
- Draba siliquosa*** M. Bieb. [*D. siliquosa* subsp. *carinthiaca* (Hoppe) O. Bolòs & Vigo] ROC(r)(t). 2000-2300 m. rr. VII-VIII.
- Draba subnivalis*** Braun.-Blanq. [*D. tomentosa* subsp. *subnivalis* (Braun.-Blanq.) O. Bolòs & Vigo] ROC(r). 2100-2400 m. rrr. VII-VIII. DEC. EA.
- Draba verna*** (L.) DC. [*Erophila verna* (L.) DC.] Pàpoles de primavera. -. Drave de printemps. -. PRAT(r). 1240-1880 m. r. V.

- Eruca vesicaria* (L.) Cav. [*E. vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell.] Enciam, Eruga, Ruca, Ruqueta. Eruca. Roquette cultivée. Garden rocket. ARV. 875 m. rrr. V-VII.
- Erucastrum nasturtiifolium* (Poir.) O.E. Schulz subsp. *nasturtiifolium* Ravenissa groga. Oruga salvaje. Fausse roquette à feuilles de cresson. Watercress-leaved rocket. RUD. 1220-1450 m. rrr. VI-VII.
- Erysimum ochroleucum* (Schleich.) DC. subsp. *pyrenaicum* Nyman [*E. sylvestre* subsp. *pyrenaicum* (Nyman) O. Bolòs & Vigo; *E. pyrenaicum* Jordan]. Erisim nan. -. Vêlar des pyrénées. Decumbent treacle mustard. ROC(t). 1880-2780 m. c. VI-VIII.
- Erysimum ruscitonense* Jord. [*E. grandiflorum* Desf. subsp. *collisparsum* (Jord.) O. Bolòs & Vigo; *E. australe* Gay] Erisim de flor gran. Erisimo pirenaico. Vêlar de Provence. -. ROC(t),PRAT(s). 1220-1650 m. cc. VI-VIII.
- Fourraea alpina* (L.) Greuter & Burdet [*Arabis pauciflora* (Grimm) Garcke, *Turritis brassica* Leers] -. -. Arabette pauciflore. -. HERB(v)(c). 1280-1780 m. c. VI-VIII.
- Hornungia alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) O. Appel [*Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii* (Willk.) Greuter & Burdet; *Hutchinsia alpina* (L.) R.Rb. in Aiton subsp. *alpina*] Hutquínsia alpina. -. Cresson de chamois. -. ROC(t). 2100-2800 m. c. VI-VII.
- Iberis amara* L. Matablat. Zarapico. Ibéris amer. Wild candytuft. ROC(t),ARV. 1220-1540 m. c. VI-IX.
- Iberis bernardiana* Godr. & Gren. ERROR.
- Iberis saxatilis* L. subsp. *saxatilis* ERROR
- Iberis sempervirens* L. . Carraspic sempreverd. -. Carraspique perenne. Ibéris toujours vert. Evergreen candytuft. PRAT(s). 1400-2700 m. cc. VI-VII.
- Iberis spathulata* DC. subsp. *spathulata* Carraspic espatulat. -. Ibéris spatulé. -. ROC(t)(ca). 2200-2700 m. rr. VI-VIII.
- Kernera saxatilis* (L.) Sweet subsp. *saxatilis* ROC(r,ca). 1800 m. rrr. VII.
- Lepidium campestre* (L.) R. Br. Morritort de camp. Mostaza salvaje. Passerage des champs. Pepperwort. ARV,RUD(t). 1220-1670 m. rr. V-VI.
- Lepidium draba* L. subsp. *draba* [*Cardaria draba* (L.) Desv. subsp. *draba*] Capellans. Draba. Passerage drave. Hoary cress. RUD(t). 1220-1260 m. rrr. IV-V.
- Lepidium graminifolium* L. RUD(t). 1220 m. rrr. VII.
- Lepidium heterophyllum* Benth. subsp. *heterophyllum* -. -. Mastuerzo pirenaico. Passerage à feuilles variables. Smith's pepperwort. PRAT. 1550-2100 m. rr. VI.
- Lepidium villarsii* Gren. & Godr. subsp. *villarsii*. ERROR.
- Lunaria annua* L. subsp. *annua* Setins. Hierba de la plata. Lunaire annuelle. Satin flower. RUD(h). 1200-1350 m. c. V.
- Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K. Mey. [*Thlaspi perfoliatum* L.] -. Mostacilla brava. -. -. PRAT. 1500. rr. VI.
- Murbeckiella pinnatifida* (Lam.) Rothm. Braia pinnatifida. Cardámine pirenaica. Arabette pennatifide. Murbekiella. ROC(t). 1700-2720 m. c. VI-VIII.
- Nasturtium officinale* R. Br. [*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek] Creixen. Berro de agua. Cresson de fontaine. Watercress. AQUA(cr). 1220-1320 m. rr. V-VII.
- Noccaea brachypetalum* (Jord.) F.K. Mey. [*Thlaspi brachypetalum* Jord.; *T. caerulescens* subsp. *brachypetalum* (Jord.) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot; *T. alpestre* subsp. *brachypetalum* (Jord.) Durand et Pittier; *T. virgatum* Godr.] Traspic alpestre. -. Tabouret à pétales courts. Small-flowered Pennycress. PRAT,MAT. 1350 m. rrr. VI. EA.
- Noccaea occitanica* (Jord.) F.K. Mey. [*Thlaspi caerulescens* subsp. *occitanicum* (Jord.) M. Láziz; *T. alpestre* L. subsp. *alpestre* var. *tallonis* (Senn.) O. Bolòs et J. Vigo; *T. tallonis* Sennen] LOC.PROP.
- Pseudoturritis turrita* (L.) Al-Shehbaz [*Arabis turrita* L.] Turrita. -. Arabette tourette.tower cress. HERB(v). 1240- 1860 m. cc. V-VII.
- Raphanus raphanistrum* L. subsp. *raphanistrum* ARV. 1240-1300 m. rrr. VI.
- Rapistrum rugosum* (L.) All. ARV. 1240 m. rrr. VI.
- Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb. RUD(t). 1230-1370 m. rr. VI.
- Rorippa sylvestris* (L.) Besser Creixen silvestre. -. -. RUD(r)(t). 1240 m. rrr. VII.
- Sinapis arvensis* L. subsp. *arvensis* Ravenissa groga. Mostaza de los campos. Moutarde des champs. Charlock Mustard. ARV. 1240 m. rrr. VI-IX.
- Sisymbrella aspera* (L.) Spach subsp. *aspera* [*Rorippa aspera* (L.) Maire subsp. *aspera*] ARV(h). 1300 m. rrr. VI.
- Sisymbrella aspera* subsp. *praeterita* Heywood [*Rorippa aspera* (L.) Maire subsp. *praeterita* (Heywood) O. Bolòs & Vigo] RUD(t)(h) . 1250-1500 m. rrr. V-VII

Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. *chrysanthum* Jord.) Rouy & Foucaud Sisimbri austriac. Sisimbrio austriaco. Vêlar à fleurs dorées. -. RUD. 1220-2100 m. c. VI-IX.

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Herba dels cantaires, herba dels cantors. Erísimo. Herbe aux chantres. Hedge mustard. RUD(t). 1200-2000 m. cc.V-VIII.

Thlaspi arvense L. ARV,RUD(t). 1220-1340 m. r. IV-VIII.

Turritis glabra L. [*Arabis glabra* (L.) Bernh.] Àrabis glabra. -. Arabette glabre. Tower rockcress. HERB(v). 1200-1840 m. cc. V-VI.

Buxaceae

Buxus sempervirens L. Boix. Boj. Buis. Common boxwood. BOSC,MAT(s). 360-1850 m. cc. III-IV. DEC.

Campanulaceae

Campanula caespitosa Scop. ERROR.

Campanula cochleariifolia Lam. Campànula nana. -. Campanule à feuilles de cochléaire. Fairy's thimble. ROC(r)(t)(ca). 1740-2700 m. r. VII-VIII.

Campanula erinus L. -. -. Campanule à petites fleurs. -. PRAT(r). 1280 m. rrr. EA.

Campanula eynensis Sen. in Sched. ERROR.

Campanula glomerata L. Campaneta. Campanula glomerata. Campanule agglomérée. Clustered bellflower. PRAT. 1240-2050 m. cc. VI-VIII.

Campanula linifolia Scop. var. *stenophylla* Rouy. ERROR.

Campanula macrorrhiza Gay ex A. DC. ERROR.

Campanula persicifolia L. Campaneta. Campanilla silvestre. Campanule à feuilles de pêcher. Bellflower. HERB(v). 1220-1580 m. cc. VI-VIII.

Campanula rapunculoides L. HERB(v). rr. 1260-1420 m. VI.

Campanula rotundifolia L. - Campaneta blava, campaneta de fulla rodona. -. Campanule à feuilles rondes. Spanish bellflower.

subsp. *hispanica* (Willk.) O. Bolòs & Vigo [*C. rotundifolia* subsp. *catalanica* (Podlech) O. Bolòs & Vigo]. PRAT(ac). 1200-1500 m. ccc. VI-IX.

subsp. *rhomboidalis* (L.) Bonnier & Layens (sub. *C. rhomboidalis* L.). ERROR.

subsp. *rotundifolia* PRAT,MAT,ROC(ac). 1350-2450 m. c. VII-IX.

Campanula scheuchzeri Vill. [*C. ficarioides* Timb.-Lagr.; *C. scheuchzeri* subsp. *ficarioides* (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo] Campaneta, campaneta alpina. -. Campanule fausse ficaire. -. PRAT(ac). 1600-2700 m. ccc. VII-IX.

Campanula trachelium L. Campaneta d'ortiga. Campanilla. Campanule gantelée. Bats-in-the-belfry. HERB(v),BOSC(h). 1200-1880 m. cc. VII-IX.

Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. *crispa* Jasione nana. Yasione pirenaica. Botón azul rizado. Jasione ondulée. Jasione humble. PRAT(si). 1600-2680 m. c. VII-VIII.

Jasione laevis Lam. subsp. *laevis* Jasione perenne. -. Jasione lisse. Smooth Sheepsbit. PRAT (ac). 1780-2660 m. r. VIII-IX.

Jasione montana L. Guaridora de muntanya. Té de monte. Jasione des montagnes. Sheep's bit scabious. PRAT(si). 1200-2000 m. cc. VI-VIII.

Phyteuma charmelii Vill. Fiteuma de roca. -. Raiponce de Charmeil. -. ROC(r,ca). 1425-2550 m. rrr. VII. DEC. EA.

Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe subsp. *pedemontanum* (Rich. Schulz) Greuter, Burdet & G. Long Fiteuma globularifolia. -. Raiponce du Piémont. Rosette-leaved rampion. PRAT(ac),ROC(ac). 2620-2800 m. I-IX. PROT. DEC. EA.

Phyteuma hemisphaericum L. Fiteuma hemisfèrica. Fiteuma alpina. Raiponce hémisphérique. Globe-headed rampion. PRAT(ac),ROC(ac). 1700-2800 m. ccc. VI-IX

Phyteuma nigrum F.W.Schmidt (*P. halleri* subsp. *nigrum* (F.W.Schmidt) Arcang.] ERROR.

Phyteuma orbiculare L. Fiteuma orbicular. Fiteuma de prado. Raiponce orbiculaire. Round-headed rampion. PRAT(ca). 1250-2000 m. r. VI-VIII.

Phyteuma ovatum Honck. [*P. halleri* All.] ERROR.

Phyteuma spicatum L. Fiteuma d'espiga. -. Raiponce en épi. Spiked Rampion. BOSC(h),HERB(v)(m). 1300-2000 m. c. VI-VIII

Cannabaceae

Humulus lupulus L. Llúpol. Lúpulo. Houblon. Common hop. BOSC(br). 1220-1260 m. rrr. VII-VIII.

Caprifoliaceae

Lonicera alpigena L. Xuclamel alpi. -. Lonicéra des Alpes. Cherry woodbine. BOSC(ca). 1600-1880 m. rrr. VI-VII. EA.

Lonicera nigra L. Xuclamel negre. Madreselva negra. Chèvrefeuille noir. Black-fruited honeysuckle. BOSC(h). 1350-1820 m. ccc. V-VII.

Lonicera pyrenaica L. subsp. *pyrenaica* Xuclamel de roca. Madreselva pirenaica. Chèvrefeuille des pyrénées. Pyrenean honeysuckle. ROC(ca). 1320-2300 m. c. V-VII.

Lonicera xylosteum L. Xuclamel santjoaner. Madreselva. Chèvrefeuille des haies. Fly honeysuckle. BOSC. 1200-1840 m. c. V-VII.

Caryophyllaceae

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. *aggregata* [A. *tetraquetra* L. subsp. *condensata* Arcang.] Arenària de coixinet. Arenaria aglomerada. Sabline capitée. Sandwort. PRAT(r)(ca). 1800 m. rrr. VII.

Arenaria grandiflora L. subsp. *grandiflora* Arenària de flor gran. Hierba de la piedra. Sabline à grandes fleurs. Large-flowered Sandwort. PRAT(r)(s). 1800-2780 m. cc. VI-VIII.

Arenaria hispida L. ERROR.

Arenaria marschlinsii W.D.J. Koch -. -. Sabline de Marschlins. -. ROC(t). 2420-2780 m. rrr. VI-VII. PROT. AME/NT. DEC. EA.

Arenaria purpurascens DC. ERROR.

Arenaria serpyllifolia L. Arenària. Arenaria común. Sabline des murs. Thyme-leaved sandwort. PRAT(r). 1200-2060 m. cc. IV-VI.

Atocion rupestre (L.) Oxelman [*Silene rupestris* L.] Patacs petits. Silene rupestre. Silène des rochers. Rock campion. ROC(r)(t),PRAT(r)(si). 1420-2760 m. cc. VI-VIII.

Cerastium alpinum L. [*C. alpinum* subsp. *lanatum* (Lam.) Gremli; *C. alpinum* subsp. *glabratum* (Hartm.) A. Love & D. Love] Cerasti alpi. Pamplinillas de los borreguiles. Céraiste des alpes. Alpine mouse ear. PRAT(s)(r). 1800-2800 m. cc. VI-VIII.

Cerastium arvense L. -. Oreja de ratón. Céraiste des champs. Field chickweed. PRAT,MAT(ac). 1400-2200 m. cc. VI-VII.

Cerastium cerastoides (L.) Britton -. -. Céraiste à trois styles. -. AQUA(c,f). 2300-2650 m. r. VII-VIII.

Cerastium fontanum subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet [*C. fontanum* subsp. *triviale* (E.H.L.Krause) Jalas] Cerasti de Font. -. -. PRAT(h),AQUA(j). 1220-2000 m. cc. VI-VII.

Cerastium glomeratum Thuill. Pelovella. -. Céraiste aggloméré. Sticky mouse-ear. PRAT(r). 1240 m. rr. III-V.

Cerastium pumilum Curtis [*C. pumilum* subsp. *pallens* (F.W. Schultz) Schinz et Thell] Cerasti menut. -. Céraiste nain. -. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.

Cerastium pyrenaicum J. Gay Cerasti pirinenc. -. Céraiste des pyrénées. -. ROC(t). 2400-2700 m. r. VII-VIII.

Cerastium semidecandrum L. Cerasti semidecandre. -. Céraiste des sables. -. PRAT(r). 1220 m. rrr. V

Cherleria laricifolia (L.) Iamonico subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) A.J. Moore & Dillenb. [*Minuartia laricifolia* (L.) Schinz subsp. *diomedis* (Braun-Blanq.) Mattf.] Minuartia laricifolia. -. Alsine de Diomède. Larch-leaf sandwort. ROC(r),PRAT(r). 1240-2230 m. c. VII-IX.

Cherleria sedoides L. [*Minuartia sedoides* (L.) Hiern] Herba de la penya. -. Minuartie faux orpin. Ciphel. PRAT(c)(ac). 2050-2750 m. c. VII-VIII.

- Dianthus armeria* L. subsp. *armeria* Clavell de bosc. Clavelina de muntanya. Oeillet arméria. Deptford pink. PRAT,HERB(v)(si). 1220-1320 m. rr. VII-VIII.
- Dianthus carthusianorum* L. . -. -. PRAT 1200-1500 m. r. VII.
- Dianthus deltoideus* L. Clavell deltoide. Clavelina de prado. Oeillet couché. -. PRAT(ac)(h). 1550-2500 m. cc. VI-VIII.
- Dianthus gallicus* Pers. ERROR.
- Dianthus hyssopifolius* L. subsp. *hyssopifolius* [*D. monspessulanus* L.] Clavell, clavell de pastor. Clavel de monte. Oeillet de montpellier. -. PRAT,HERB(v). 1200-2550 m. cc.
- Dianthus seguieri* Vill. subsp. *requienii* (Godr.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm. [*D. seguieri* subsp. *cadevallii* (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo; *D. seguieri* subsp. *gautieri* (Sennen) Tutin] Clavell de bosc, clavell de muntanya. -. Oeillet de seguir. Seguir's pink. PRAT. 1200-1800 m. cc. VII-VIII.
- Dianthus superbus* L. ERROR.
- Dianthus sylvestris* Wulfen. ERROR
- Gypsophila repens* L. DUBT.DET.
- Dianthus vigoi* M. Laínz [*D. seguieri* subsp. *vigoi* (M. Laínz) O. Bolòs] PRAT. 1780-2550 m. c.
- Herniaria alpina* Chaix Herniària alpina. -. Herniaire des Alpes. -. ROC(t). 2500 m. rrr. VII. PROT. AM/NT. DEC. EA.
- Herniaria glabra* L. Herba de les mil granes, cent-en-grana. Hierba de la piedra. Herniaire glabre. Rupture wort. PRAT(r),RUD(t). 1230-1480 m. r. V-IX.
- Holosteum umbellatum* L. Holostí. Estrellada. Holostée en ombelle. Umbellate chickweed. PRAT(r),ARV. 1240-1280 m. rrr.
- Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. Minuàrtia recurvada. Minuartia arqueada. Minuartie recourbée. Sickie leaved sandwort. PRAT(si). 1500-2680 m. cc. VI-VIII.
- Minuartia rostrata* (Pers.) Rchb. [*M. rubra* (Scop.) McNeill subsp. *rostrata* (Pers.) M. Laínz] -. -. Minuartie à rostre. -. ROC(r,m). 1340-2020 m. rrr. VIII.
- Moehringia ciliata* (Scop.) Dalla Torre LOC.PROP.
- Moehringia muscosa* L. Herba prima. -. Sabline des mousses. -. ROC(r)(m). 1200-1980 m. c. VI-VII.
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. Herba prima. Arenaria trinervia. Sabline à trois nervures. Three-nerved sandwort. BOSC(h). ROPC(r). 1240-1670 m. c. V-VII.
- Myosoton aquaticum* (L.) Moench Morro d'aigua. Cerastio acuático. Céraiste d'eau. Water starwort. AQUA(c),BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.
- Paronychia kapela* subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebn. Sanguinària, herba sanguinària. -. Paronyque à feuilles de serpolet. -. PRAT(s)(r).ROC. 1240-2560 m. c.
- Paronychia polygonifolia* (Vill.) DC. Paroníquia poligonifolia, Sanguinària. -. Paronyque à feuilles de renouée. -. ROC(t). 1940-2670 m. r. VII-VIII.
- Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood Clavellet prolífer. Clavelina seca. Oeillet prolifère. Proliferous pink. PRAT(r). 1200-1600 m. c. V-IX.
- Polycarpon tetraphyllum* L. subsp. *tetraphyllum* 2000 m. rrr.
- Rabelera holostea* (L.) M.T. Sharples & E. Tripp [*Stellaria holostea* L.] Rèvola. Estrellada. Stellaire holostée. Greater stitchwort. HER(v)(c),MAT(g). 1200-2000 m. ccc. IV-VI.
- Sabulina verna* (L.) Rchb. subsp. *verna* [*Minuartia verna* (L.) Hiern] Minuàrtia vernal. Minuarcia de primavera. Sabline de printemps. Spring sandwort. PRAT(ac)(r). 2160-2770 m. c. VI-VIII.
- Sagina alexandrae* Iamónico [*S. subulata* (Sw.) C. Presl, nom. illeg., non d'Urv.] Error.
- Sagina apetala* Ard. [*S. apetala* subsp. *ciliata* (Fr.) Hook. f.] Sagina apètala. -. Sagine apétale. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VII.
- Sagina procumbens* L. Sagina procumbent. Sagina tendida. Sagine couchée. Procumbent pearlwort. RUD(t). 1220-2100 m. r. V-VII.
- Sagina saginoides* (L.) H. Karst. [*S. linnei* C.Presl] Sagina pirinenca. -. Sagine de Linné. -. AQUA(c)(m)(j)(f)(t). 2000-2500 m. rr. VI-VII
- Saponaria ocymoides* L. Falsa alfàbrega. Saponaria. Saponaire des rochers. Rock soapwort. ROC(r)(t). 1240-1720 m. c. V-VII.
- Saponaria officinalis* L. Herba sabonera, sabonera. Saponaria. Saponaire officinale. Buncing bett, Soapwort. BOSC(br). 1200-1560 m. c. VI-IX.

- Scleranthus annuus* L. Esclerant. Esclerant anual. Escleranto anual. Gnavelle annuelle. Annual knawel. PRAT(r). 1220-1540 m. c. IV-VI.
- Scleranthus perennis* L. Esclerant. -. Scléranthe vivace. -. PRAT(r). 1360-1820 m. c. VI-VII.
- Scleranthus polycarpus* L. [*S. annuus* subsp. *polycarpus* (L.) Bonnier & Layens] PRAT(r). 1300-1720 m. c. V-VII.
- Scleranthus polycnemoides* Willk. & Costa [*S. perennis* subsp. *polycnemoides* (Willk. & Costa) Font Quer] 2250 m. rrr. NO RETR. EA.
- Silene acaulis* (L.) Jacq. Silene acaule. Silene musgo. Silène acaule, Silène sans tiges. Moss campion. PRAT(r). 2000-2900 m. cc. VI-VIII.
- Silene borderei* Jord. Silene de bordère. -. Silène de bordère. -. PRAT,ROC. 2240-2300 m. rrr. VIII.
- Silene ciliata* Pourr. subsp. *ciliata* Herba ronyonera, patacs. Silene ciliada. Silène cilié. -. PRAT(ac). 1460-2700 m. VII-VIII.
- Silene dioica* (L.) Clairv. Melandri vermell. Silene dioica. Compagnon rouge. Red campion. HERB(c)(v),RUD(h). 1200-2060 m. c. VI-VII.
- Silene flos-cuculi* (L.) Clairv. subsp. *flos-cuculi* [*Lychnis flos-cuculi* L. subsp. *flos-cuculi*] Flor de cucut. Flor de cucillo. Silène fleur de coucou. Cuckoo flower. PRAT(h). 1240 m. rrr. VI-VII.
- Silene gallica* L. Molinets. Carmentilla. Silène de France. Small-flowered Catchfly. PRAT(r). 1240-1380 m. rrr. V.
- Silene latifolia* Poir. [*S. alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *divaricata* (Reichb.) McNeill et Prentice] Colitxos. Cabaciñas. Compagnon blanc. White campion. RUD(h). 1200-2000 m.
- Silene nutans* L. subsp. *nutans* [*S. nutans* subsp. *brachypoda* (Rouy) Graebn. & P. Graebn.] Silene nutan. Silene colgante. Silène penché. Nottingham Catchfly. HERB(v). 1200-1980 m. ccc. VI-VIII.
- Silene saxifraga* L. Herba prima. -. Silène saxifrage. -. ROC(r)(ca). 1475-2020 m. rr. VI-VII.
- Silene vulgaris* (Moench) Garcke Pets o esclafidors, colitxos. Collejas. Silène enflé. Bladder campion. subsp. *vulgaris* HERB(v),RUD(h),ROC(t). 1200-2080 m. ccc. VI-VIII.
- subsp. *prostrata* (Gaudin) Schinz & Thell. ROC(t). 2600 m. rr. VIII.
- Spergula arvensis* L. Espèrgula de camp. -. Spergule des champs. -. ARV(si). 1230-1400 m. r. VII.
- Spergularia nicaeensis* Burnat [*Spergula nicaeensis* (Burnat) G. López; *Spergularia rubra* subsp. *nicaeensis* (Burnat) Briq.] PRAT(r). 2200-2300 m. rrr. EA.
- Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl Herba passarella. Arenaria roja. Spergulaire rouge. Sandwort. RUD(t). 1220-2040 m. c. V-VIII.
- Stellaria alsine* Grimm Rèvola de molleríc. Stellaire alsine. -. AQUA(f,m). 1400- 2000 m. r. VI-VII.
- Stellaria graminea* L. Rèvola menuda. Estelaria. Stellaire à feuilles de graminée. Common starwort. PRAT(h),AQUA(j). 1200-1960 m. ccc. VI-VII.
- Stellaria media* (L.) Vill. Morró. Yerba pajarera. Morgeline. Chickweed. RUD. 1200-2100 m. ccc. III-VIII.
- Stellaria neglecta* Weihe [*S. media* subsp. *major* Arcang.] -. -. Grande Stellaire. -. RUD,HERB(c). 1220-1780 m. rr. VI.
- Stellaria nemorum* subsp. *montana* (Pierrat) Berher [*S. nemorum* L. subsp. *glochidisperma* Murb.] BOSC(h)(br). 1260-1520 m. rrr. V-VII.
- Viscaria alpina* (L.) Don [*Lychnis alpina* L.] Licnis alpina. -. Silène de suède. -. PRAT(si). 2270 m. rrr. VII.

Celastraceae

- Parnassia palustris* L. subsp. *palustris* Fetgera blanca. Parnasia. Parnassie des marais. Grass of Parnassus. AQUA(f)(m),PRAT(h). 1200-2700 m. cc. VII-IX.

Cistaceae

- Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godr. ROC(ca). 1560 m. rrr. VI.
- Helianthemum apenninum* (L.) Mill. subsp. *apenninum* DUBT.DET. o AL/AC.
- Helianthemum nummularium* (L.) Mill. [*H. nummularium* subsp. *pyrenaicum* (Janch.) Hegi; *H. nummularium* subsp. *tomentosum* auct.] Morenella, heliantem nummular. Jarilla europea. Herbe d'or. Rockrose. PRAT. 1200-2700 m. ccc. V-VIII.

Helianthemum oelandicum Herba passerella. Jarilla. -. -.

subsp. ***alpestre*** (Jacq.) Ces. [*H. oelandicum* subsp. *italicum* sensu O. Bolòs & Vigo; *H. oelandicum* var. *hirtum* sensu O. Bolòs & Vigo] PRAT(s),ROC(ca). 1700-2480 m. rr. VII-VIII.

subsp. ***italicum*** (L.) Ces. PRAT(s)(r). 1220-1980 m. c.V-VII.

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L. Corretjola. Campanilla europea. Liseron des champs. Field binweed. 1200-1680 m. c. V-VIII.

Convolvulus sepium L. [*Calystegia sepium* (L.) R. Br.] Corretjola gran. Correhuela mayor. -. -. BOSCS(br),HERB(h). 1200-1280 m. rrr. VI-VIII.

Cuscuta epithymum (L.) L. Cabells. Cabello de monte. Cuscuta. Great dodder. PRAT,MAT. 1220-1880 m. cc. VI-X.

Cuscuta europaea L. Cabells. Cabello de monte. Cuscuta. Great dodder. RUD(h). 1220-2020 m. c. VI-VIII.

Cornaceae

Cornus sanguinea L. Sanguinyol. Cornejo. Cornouiller sanguin. Dogwood. BOSC,MAT(b). 1200-1440 m. c. VI-VII.

Crassulaceae

Hylotelephium maximum (L.) Holub [*Sedum maximum* (L.) Suter; *S. telephium* L. subsp. *maximum* (L.) Schinz] ROC(m)(r),HERB(v)(si). 1300-1750 m. c. VII-VIII.

Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba [*Sedum telephium* L.; *S. telephium* L. subsp. *fabaria* (Koch) Kirschl.] Herba grassa, bàlsam. -. Orpin à feuilles de fève. -. ROC(r),HERB(v). 1600-1980 m. r. VII-IX.

Petrosedum montanum (E. P. Perrier & Songeon) Grulich [*Sedum montanum* E. P. Perrier & Songeon subsp. *montanum*; *S. rupestre* subsp. *montanum* (E. P. Perrier & Songeon) Hegi & Em. Schmid.] Crespínell muntanyenc. Siempreviva de montaña. Orpin des montagnes. -. ROC(m)(t),PRAT(r). 1200-2100 m. r. VII-VIII.

Petrosedum reflexum (L.) Grulich [*Sedum rupestre* subsp. *reflexum* (L.) Hegi & Em. Schmid, *S. rupestre* L.] Crespínell rupestre. Siempreviva menor. Orpin des rochers. Reflexed stonecrop. ROC(m)(t),PRAT(r). 1200-2300 m. cc. VI-VIII.

Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich subsp. ***sediforme*** [*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau] Crespínell gros. Trigo pollo. Orpin de Nice. Pale stonecrop. ROC(m)(t),PRAT(r). 1200-2050 m. cc. VI-VIII.

Rhodiola rosea L. [*Sedum roseum* (L.) Scop.] Error.

Sedum acre L. subsp. ***acre*** Crespínell groc. Siempreviva picante. Orpin âcre. Common stonecrop. ROC(m),PRAT(r). 1200-2000 m. c. VI-VIII.

Sedum album L. Arròs de paret, arròs. Pan de cuquiello. Orpin blanc. White stonecrop. ROC(m) PRAT(r). 1220-2300 m. cc. VI-VII.

Sedum alpestre Vill. Crespínell alpestre. Pampajarito alpino. Orpin alpestre. Alpine stonecrop. AQUA(c),ROC(t)(h). 2200-2850 m. r. VII-VIII.

Sedum amplexicaule subsp. ***tenuifolium*** (Sm.) Greuter Error.

Sedum anglicum Huds. [*S. anglicum* subsp. *pyrenaicum* Lange] Crespínell. Pampajarito pirenaico. Orpin d'angleterre. English stonecrop. ROC(t),PRAT(r). 2000-2070 m. r. VII-VIII.

Sedum annuum L. Crespínell anual. Uva de moro. Orpin annuel. Annual stonecrop. PRAT(r). 1380-2100 m. c. VI-VII.

Sedum atratum L. Crespínell fosc. Pampajarito oscuro. Orpin noirâtre. Dark stonecrop. ROC(t),PART(r)(ca). 2100-2800 m. c. VII-VIII.

Sedum brevifolium DC. Crespínell. Pampajarito rojo. Orpin à feuilles courtes. Hort-leaved stonecrop. ROC(m)(r),PRAT(r). 1200-2650 m. VI-VIII.

Sedum candolleianum G. López [*Mucizonia sedoides* (DC.) D.A. Webb; *Sedum candollei* Raym.-Hamet; *Cotyledon sedoides* DC.] Crespínell de congestera. -. Orpin de candolle. -. AQUA(c). 2300-2800 m. r. VII-IX. DEC. EA.

Sedum cepaea L. ROC(m). 1220 m. rrr. VI.

- Sedum dasyphyllum* L. - Arròs de paret. Pampajarito glauco. Orpin à feuilles épaisses. Corsican stonecrop. ROC(m). 1200-2200 m. c. VI-VIII.
- Sedum hirsutum* All. subsp. *hirsutum* Crespínell pelut. Pampajarito peloso. Orpin hirsute. Hairy stonecrop. ROC(r). 1200-2350 m. c. V-VII.
- Sedum villosum* L. Crespínell pilós. Pampajarito de humedal. Orpin velu. -. AQUA(f)(m). 1600-1300 m. r. VII-VIII.
- Sempervivum arachnoideum* L. Matafoc teranyines. Siempreviva de telarañas. Joubarbe-araignée. Cobweb house-leek. ROC(m),PRAT(r). 1200-2700 m. c. VII-IX.
- Sempervivum montanum* L. subsp. *montanum* Matafoc, cebes. Siempreviva. Joubarbe des montagnes. Mountain hends and chicks. ROC(m),PRAT(r). 1300-2800 m. c. VII-VIII.
- Sempervivum tectorum* L. subsp. *tectorum* Matafoc. Siempreviva de muros. Joubarbe des toits. Jupiter's beard. ROC(m). 1200-2560 m. r. VII-VIII.
- Sempervivum xbarbulatum* Schott [*S. arachnoideum* × *S. montanum*] sub. *Sempervivum xcerdanum* Gaut. 2000 m. rrr.
- Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy subsp. *rupestris* Barretets de paret, llombrígol de venus. Omblico de venus. Ombilic de Vénus. Pennywort. ROC(m). 1200-1650 m. c. VI-VII.

Cucurbitaceae

- Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin [*B. dioica* Jacq.] Carabassina. Nueza. -. -. RUD(h),MAT(b). 200-1540. c. V-VIII.
- Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai Xíndria. Sandía. Melon d'eau. Watermelon. ARV,RUD,BOSC(br). 1240-1380 m. rr. VIII. AL/AC.

Dipsacaceae

- Dipsacus fullonum* L. Escardot, cardó. Cardencha. -. -. RUD(h). 1200-1560 m. c. VI-VIII.
- Dipsacus pilosus* L. -. Triquitracó. Cardère poilue. -. RUD(h),BOSC(br). 100-1320 m. rrr. VII-VIII.
- Knautia arvensis* (L.) Coult. HERB(v)1200-1350 m. rrr.
- Knautia collina* (Guérin) Jord. [*K. arvensis* subsp. *collina* (Duby) Schübl. & G. Martens; *K. arvensis* subsp. *meridionalis* (Briq.) O. Bolòs & Vigo] Escabiosa borda. Escabiosa. Scabieuse des champs. -. HERB(r). 1220 m. rrr. VII.
- Knautia subscaposa* Boiss. & Reut. [*K. arvensis* (L.) Coult. subsp. *subscaposa* (Boiss. & Reut.) Maire] Escabiosa. -. -. PRAT(h). 1200-18040 m. r. VI-IX.
- Knautia lebrunii* J. Prudhomme [*K. godetii* subsp. *lebrunii* (J. Prudhomme) O. Bolòs & Vigo; *K. dipsacifolia* subsp. *font-queri* Carrillo Ortuño & Ninot; *K. godetii* auct.] -. -. Knautie de godet. -. HERB(m). 1760-2040 m. rr. VI-IX.
- Knautia nevadensis* (Szabó) Szabó [*Knautia dipsacifolia* Kreutzer subsp. *arvernensis* (Briq.) O. Bolòs et Vigo; *K. arvernensis* (Briq.) Szabó subsp. *arvernensis*] Escabiosa. -. -. BOSC,HERB(v),PRAT. 1200-2000 m. cc. VI-IX.
- var. *nevadensis* [*K. arvernensis* (Briq.) Szabo; *K. dipsacifolia* f. *angustata* (Rouy) O. Bolos & Vigo; *K. arvensis* var. *involucrata* O. Bolos & Vigo, nom. illeg.] HERB(v),PRAT. 1280-1600 m. cc. VI-IX.
- var. *lanceolata* (Pau) Devesa, Ortega Oliv. & J. Lopez [*K. catalaunica* Szabo; *K. dipsacifolia* subsp. *catalaunica* (Szabo) O. Bolos & Vigo] HERB(v). 1450 m. rrr. VII.
- Knautia subscaposa* Boiss. & Reut. [*K. arvensis* subsp. *subscaposa* (Boiss. & Reut.) Maire] PRAT(h). 1200-1840 m. r. VI-IX.
- Scabiosa cinerea* Lam. [*S. columbaria* subsp. *cinerea* (Lam.) Font Quer; *S. pirenaica* auct., non All.] ERROR.
- Scabiosa columbaria* L. subsp. *affinis* (Gren. & Godr.) Nyman [*S. columbaria* subsp. *gramuntia* Bonnier & Layens, nom. illeg.] Escabiosa,Escapiosa. Escabiosa. Scabieuse colominaire. Small scabius. PRAT. 1200-1800 m. cc. VI-IX.
- Scabiosa columbaria* L. subsp. *columbaria* PRAT. 1200-2200 m. r. VII-IX.
- Succisa pratensis* Moench - AQUA(j,m),PRAT(h). 1200-2100 m. cc. Escabiosa,Escabiosa mossegada. Escabiosa mordida. Mors-du-diable. Devil's bit scabious. AQUA(j,m),PRAT(h). 1220-2020 m. ccc. VII-IX.

Droseraceae

Drosera rotundifolia L. LOC.PROP.

Ericaceae

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Boixerola. Gayuba. Raisin-d'ours commun. Bearberry. MAT(n), BOSC(per). 1400-2400 m. r. VI-VIII.

Calluna vulgaris (L.) Hull Brossa, bruguerola. Brecina. Callune. Heather. MAT,PRAT(ac). 1200-2620 m. VIII-X. ccc.

Empetrum nigrum L. subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher Èmpetrum. -. -. MAT. 2180-1270 m. VI. rrr. DEC. EA.

Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don [*Monotropa hypophegea* Wallr.; *M. hypopitys* var. *glabra* Roth] Xuclapins. -. -. BOSC(h). 1340 m. rr. VI.

Hypopitys monotropa Crantz [*Monotropa hypopitys* L.] BOSC(h). 1620-1780 m. r. VII.

Kalmia procumbens (L.) Galasso, Bansi & F. Conti [*Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.] Herba pedrera. Azalea alpina. Azalée couchée. -. MAT. 2080-2600 m. r. VI-VII. DEC. EA.

Moneses uniflora (L.) A. Gray [*Pyrola uniflora* L.] Pírola uniflora. -. Pirole à une fleur. -. BOSC(per) (ca). 1320-1780 m. r. VI-VII.

Pyrola minor L. Pírola petita. Peralito menor. Petite pirole. Small shinleaf. BOSC(per)(h). 1420-2000 m. r. VI-VIII.

Pyrola chlorantha Sw. Pírola de flor verda. -. -. BOSC(per). 1340-1720 m. c. VI-VII.

Rhododendron ferrugineum L. Neret. Rododendro. Rhododendron ferrugineux. Alpenrose. 1200-2750 m. cc. VI-VII.

Rhodothamnus chamaecistus (L.) Rchb. ERROR

Vaccinium myrtillus L. Nabiu. Arándano. Myrtille. Bilberry. MAT(n),BOSC(per)(si). 1200-2800 m. cc. VI-VII.

Vaccinium uliginosum L. Nabiu uliginós. -. Myrtille des marais. Bog bilberry. MAT,BOSC,AQUA(c). 1800-2800 m. c. VI-VII.

Vaccinium vitis-idaea L. subsp. *vitis-idaea* NO RETR. PROT. DUBT.DET. LOC.PROP. EA.

Euforbiaceae

Euphorbia amygdaloides L. subsp. *amygdaloides* Lleteresa de bosc. Lechetrezna del bosque. Euphorbe des bois. Wood spurge. BOSC,HERB(v). 1200-1600 m. c. V-VI.

Euphorbia cyparissias L. Lletera de fulla estreta. Lechetrezna común. Euphorbe petit-cyprés. -. PRAT. 1200-2200 m. cc. V-VI.

Euphorbia exigua L. subsp. *exigua* -. Lechetrezna romeral. -. PRAT(r),ARV. rrr. VI.

Euphorbia helioscopia L. subsp. *helioscopia* Lleterola d'hort. Lechetrezna. Euphorbe réveille-matin, Sun spurge. ARV,RUD. 1200-2000 m. c. IV-IX.

Euphorbia lathyris L. Herba talpera. Tártao. Euphorbe épurge. Caper spurge. ARV. 1220-1260. rr. VI. AL/AC.

Euphorbia nicaeensis All. subsp. *nicæensis* Lleteresa. -. -. PRAT(s). 1240-1580 m. c. VI-VII.

Euphorbia peplus L. RUD(t). 1240-1320 m. r. VI-IX.

Euphorbia prostrata Aiton [*Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small] RUD(t). 1220-1250 m. r. VI. AL/ESP.

Euphorbia serrata L. f. *phylloclada* (Lge. in Wk. et Lge.) O. Bolòs et Vigo PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.

Euphorbia villosa Willd. Lleteresa pilosa. -. Euphorbe poilue. -. HERB(c). 1220-1240 m. rrr. VI.

Mercurialis annua L. Melcoratge. Malcoraje. Mercuriale annuelle. -. ARV,RUD. 1200-1780 m. c. III-VI.

Mercurialis perennis L. Melcoratge de bosc. Berza perruna. Mercuriale vivace. -. 1220-1980 m. c. IV-VI.

Fabaceae

Anthyllis montana L. Antil·lis de muntanya. -. Anthyllide des montagnes. Mountain kidney vetch. ROC, PRAT. 1450-2225 m. r. V-VI.

- Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Schult.) Asch. & Graebn. [*A. vulneraria* subsp. *boscii* Kerguelen; *A. vulneraria* subsp. *pyrenaica* (Beck) Cullen; *A. dillenii* Schult. ex Steud.] Citada a PRAT(ca), 1880-2450 m. rrr, però algunes de les citacions no corresponen al tàxon. Caldria comprovar la seva presència. DUBT.DET.
- Anthyllis vulneraria* subsp. *sampaioana* (Rothm.) Vasc. [*A. vulneraria* subsp. *forondae* (Sennen) Cullen] Vulnerària. Vulneraria. Anthyllide vulnéraire. Common Kidneyvetch. PRAT(s) 1200-1920 m. c. VI-VII.
- Anthyllis vulneraria* subsp. *vulnerarioides* (All.) Arcang. Vulnerària alpina. Vulneraria. Anthyllide fausse vulnéraire. - . PRAT(ca). 1670-2660 m. c. VI-VII.
- Astragalus alpinus* L. [*A. monspessulanus* subsp. *monspessulanus* var. *alpinus* Foucault] PRAT(ca) 2000-2700 m. rr. VII-VIII.
- Astragalus australis* (L.) Lam. PRAT(ca). 1750-2800 m. rr. VII-VIII.
var. *gerardii* (Vill.) Coulot & Rabaute [*Phaca gerardii* Vill.] ERROR.
- Astragalus glycyphyllos* L. Regalíssia borda. Regaliz borde. Astragale réglisse. Wild Liquorice. BOSC(h),HERB(v). 1200-1400 m. rr. V-VI.
- Astragalus incanus* L. subsp. *incanus* ERROR
- Astragalus monspessulanus* L. Herba de sant Llorenç. Astrágalo espigado. Astragale de montpellier. False vetch. subsp. *gypsophyllus* Rouy [*A. monspessulanus* L. subsp. *chlorocyaneus* (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja] PRAT(s),ROC(r). 1240-1820 m. c. V-VI.
subsp. *monspessulanus* PRAT(s),ROC(r). 1280-1700 m. rrr. VII.
- Astragalus sempervirens* Lam. [*A. sempervirens* subsp. *catalaunicus* (Braun-Blanq.) M. Láinz] PRAT,ROC(ca). 1500-2700 m. r. VI-VII.
- Bituminaria bituminosa* (L.) C.H. Stirt. [*Psoralea bituminosa* L.] LOC.PROP.
- Coronilla minima* L. subsp. *minima* Coroneta de fulles menudes. -. Coronille naine. -. PRAT(s)(ca). 1400-2020 m. r. VI.
- Cytisophyllum sessilifolium* (L.) O. Lang [*Cytisus sessilifolius* Mill.]. Ginesta sessilifolia. -. Cytise à feuilles sessiles. -. ROC(ca). 1700 m. rrr. VI.
- Cytisus oromediterraneus* (G. López & C.E. Jarvis) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas [*Genista balansae* (Boiss.) Rouy subsp. *europaea* (G. López et C. E. Jarvis) O. Bolòs et Vigo] Bàlec. Piorno. Gênet purgatif. Pyrenean broom. MAT(s). 1600-2450 m. cc. V-VII.
- Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *scoparius* [*Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. subsp. *scoparius*] Ginesta, ginestell, gódua. Retama de escobas. Genêt à balais. Broom. MAT(b)(g). 1200-1600(1950) m. cc. IV-VII.
- Eroilia hirsuta* (L.) Opiz [*Vicia hirsuta* (L.) Gray] HERB(v),RUD(h). 1220-1980 m. cc. VI-VII.
- Genista hispanica* L. subsp. *hispanica* PRAT(s),ROC (ca). 1500-1800 m. rr. V-VI.
- Genista multicaulis* Lam. [*G. cinerea* (Vill.) DC. subsp. *ausetana* O. Bolòs & Vigo; *G. ausetana* (O. Bolòs & Vigo) Talavera] ERROR.
- Genista pilosa* L. Ginestola pilosa. Ginestola. Genêt velu. Gold flash broom. PRAT,MAT,ROC(ac).1220-2100 m. cc.V-VII.
- Genista sagittalis* L. [*Chamaespartium sagittale* (L.) P.E. Gibbs subsp. *sagittale*] Itjol, gaiol, Abulaga. Genistrelle. Arrow-jointed broom. PRAT,MAT(ac). 1200-2260 m. c. V-VII.
- Genista scorpius* (L.) DC. Argelaga. -. -. PRAT(s)(ca). 1400-1800 m. rr. IV-VI
- Genista tinctoria* L. ERROR. LOC.PROP.
- Hippocrepis emerus* (L.) Lassen subsp. *emerus* [*Coronilla emerus* L.] Coronil·la boscana. Aliagueto. Coronille des jardins. False senna. BOSC(s). 1220-1560 m. c. V-VI.
- Hippocrepis comosa* L. Desferracavalls. Herraduras. Hippocrépide chevelue. Horseshoe vetch. PRAT(s). 1220-2450 m. c. V-VI.
- Lathyrus aphaca* L. Gerdell. Arvejo. Gesse aphaca. Yellow vetchling. ARV. 1240-1280 m. rr. V-VI.
- Lathyrus cirrhosus* Ser. Pèsol cirrós. -. Gesse à vrilles. Cirrhose Vetchling. HERB(v),MAT(b). 1400-1900 m. rrr. VI-VIII. EA.
- Lathyrus latifolius* L. Pèsol bord. Albejana basta. Gesse à larges feuilles. Perennial sweet pea. HERB(v). 1240-1280 m. rr. VI-VII.
- Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler [*L. montanus* Bernh.] Guixó de muntanya. -. Gesse à feuilles de lin. -. BOSC,MAT,HERB(v)(ac). 1220-2080 m. cc. V-VIII.
- Lathyrus occidentalis* (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch [*L. laevigatus* (Waldst. et Kit.) Gren.] Guixó groc. -. -. -. BOSC(h),HERB(v)(m). 1340-1980 m. r. VI-VII.

- Lathyrus pratensis** L. Guixó de prat. Latiro de prado. Gesse des prés. Meadow pea. PRAT(h) AQUA. 1200- 2080 m. cc. VI-VIII.
- Lathyrus sylvestris** L. [*L. sylvestris* subsp. *pyrenaicus* (Jord.) O. Bolòs & Vigo] DUBT.DET.
- Lathyrus vernus** (L.) Bernh. Guixó vernal. -. -. BOSC(h),HERB(v). 1430-1780 m. rr. V-VI.
- Lotus alpinus** (DC.) Ramond [*Lotus corniculatus* L. subsp. *alpinus* (DC.) Rothm.] Corona de rei. Cuernecillo alpino. Lotier des alpes. Alpine bird's-foot trefoil. PRAT. 1940-2850 m. cc. VI-VIII.
- Lotus corniculatus** L. Banya de cabra, corona de rei. Corona de rey. Lotier corniculé. Bird's foot trefoil. PRAT. 1200-2100 m. ccc.
- Lotus delortii** F.W. Schultz [*L. corniculatus* subsp. *delortii* (F.W. Schultz) O. Bolòs & Vigo] -. -. Lotier de Delort. -. PRAT. 1350 m. rrr.VII.
- Lotus maritimus** L. [*Tetragonolobus maritimus* (L.) Rothm.] . -. -. AQUA(m)(j). 1240-1650 m. rr. V-VII.
- Lotus pedunculatus** Cav. Lot d'aiguamoll. Cuernecillo de turbera. Lotier des des marais. Greater bird's-foot-trefoil. AQUA(j)(m). 1320-1800 m. c. VI-VIII.
- Medicago arabica** (L.) Huds. [*M. maculata* Willd.] Herba de la taca. Mielga pintada. Luzerne tachetée. Spotted bur-clover. PRAT,ARV,RUD(t). 1230-1460 m. rr. V. AL/ESP.
- Medicago lupulina** L. Fenarola menuda. Carretón. Luzerne lupuline. Black medick. PRAT(h). 1200-2080 m. cc. V-VIII.
- Medicago minima** (L.) L. Melgó mínim. Carretilla menor. Luzerne naine. Bur medick. PRAT(r). 1230-1625 m. r. V-VI.
- Medicago orbicularis** (L.) Bartal. ERROR.
- Medicago sativa** L. subsp. *sativa* Userda, alfals. Alfalfa. Luzerne cultivée. Alfalfa. RUD,ARV,HERB. 1200-1560 m. c. V-X. AL/ESP.
- Medicago suffruticosa** DC. Melgó fruticós. -. Luzerne sous-ligneuse. -. PRAT. 1260-2600 m. c. V-VIII.
- Melilotus albus** Medik. Almegó blanc. Meliloto blanco. Mélilot blanc. White melilot. RUD(h). 1220-2000 m. c. VI-VII.
- Melilotus altissimus** Thuill. Melilot altíssim. -. Grand mélilot. -. RUD(h). 1200-1470 m. r. VI-VIII.
- Melilotus officinalis** (L.) Pall. Almegó oficial. Meliloto oficial. Mélilot officinal. Common melilot. RUD(h). c. 1200-1500 m. VI-VIII.
- Onobrychis viciifolia** Scop. Trepadella. -. -. HERB(r). 1260 m. rrr. VI. AL/ESP.
- Ononis cristata** Mill. Gavó alpí. Garbancilla. Bugrane à crête. -. PRAT(r),ROC(t)(ca). 1700-2450 m. rr. VII-IX.
- Ononis natrix** L. . -. -. PRAT(s,r),ROC(t) 1450-2000 m. r. VI-VIX.
- Ononis pusilla** L. subsp. *pusilla* . -. -. PRAT(r)(s). 1450-1620 m. rr. VII-VIII.
- Ononis rotundifolia** L. . -. -. ROC(c),PRAT(r). 1700-1800 m. rrr. VII. EA.
- Ononis spinosa** L. Gavó espinós. Gatuña. Bugrane épineuse. Spiny rest harrow. PRAT. 1220-1720 m. c. VI-VII.
- Ononis striata** Gouan PRAT(r),ROC(r). 1450-2100 m. r. VII-IX.
- Ornithopus perpusillus** L. Serradella menuda. Serradilla. Ornithope délicat. Bird's-foot. PRAT(r). 1430 m. rrr.VI.
- Oxytropis campestris** (L.) DC. subsp. *campestris* Oxítrop campestre. -. Oxytropis des alpes. Yellow oxytropis. PRAT (s)(r)(ca). 1600-2800 m. cc. VI-VIII.
- Oxytropis foucaudii** Gillot ERROR.
- Oxytropis halleri** Bunge subsp. *halleri* [*O. halleri* Bunge subsp. *halleri* var. *ochroleuca* Costa] Oxítrop de haller. Oxytropis azul. Oxytropis de haller. Purple Oxytropis. PRAT(s)(r)(ca). 1900-2800 m. c. VI-VIII.
- Oxytropis neglecta** Ten. [*O. pyrenaica* Godr. & Gren.] ERROR.
- Oxytropis nuriae** Sennen ERROR.
- Oxytropis pilosa** (L.) DC. ERROR
- Robinia pseudoacacia** L. Escàcia. Falsa acacia. Robinier faux acacia. Black locust. BOSC,PRAT. 1200-1350 m. r. V-VI. AL/INV.
- Trifolium alpinum** L. Regalíssia, regalíssia de muntanya. Regaliz de puerto. Trèfle alpin. Alpine clover. PRAT(h). 1650-2850 m. cc. VI-VIII.
- Trifolium arvense** L. Peu de llebre. Pata de liebre. Trèfle pied-de-lièvre. Stone clover. PRAT(r). 1200-1560 m. c. VI.

- Trifolium aureum* Pollich Trèvol daurat. Trébol de prado. Trèfle doré. Hop clover. PRAT,HERB(v). 1240-1800 m. r. VI-VII.
- Trifolium badium* Schreb. PRAT(h). 1980-2200 m. rrr. VII-VIII. EA.
- Trifolium campestre* Schreb. Fenarola. Trébol campesino. Trèfle des champs. Low hop clover. PRAT(s)(r). 1200-1860 m. cc. V-VIII.
- Trifolium cernuum* Brot. [*Trifolium perreymondii* Gren. & Godr.] ERROR.
- Trifolium dubium* Sibth. Trèvol menut. Trébol amarillo. Petit Trèfle jaune. Lesser trefoil. PRAT(h). 1200-1560 m. c. V-VI.
- Trifolium incarnatum* L. subsp. *incarnatum* trèfola, fenc, fe. Fenc ver. Trébol encarnado. Trèfle du Rousillon. Crimson Clover. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/AC.
- Trifolium medium* L. subsp. *medium* Trèvol mitjà. Trébol de bosque. Trèfle flexueux. Zigzag clover. HERB(v). 1200-1800 m. c. VI-VII.
- Trifolium montanum* L. Trèvol de muntanya. Trébol de montaña. Trèfle des montagnes. Mountain clover. PRAT. 1230-2000 m. c. VI-VIII.
- Trifolium ochroleucon* Huds. Trèvol ocreoleuc. Trébol pálido. Trèfle jaune pâle. Sulphur clover. PRAT,HERB(v). 1230-1720 m. c. V-VII.
- Trifolium pallescens* Schreb. ROC(t). 1900-2300 m. rrr. VIII. EA.
- Trifolium patens* Schreb. ERROR.
- Trifolium pratense* L.
- var. *pratense* Trèfola, trèvol de prat. Trébol de prado. Trèfle des prés. Broad-leaved clover. PRAT(h). 1200-2200 m. ccc. V-IX.
- var. *villosum* DC. in Lam. et DC. [var. *alpinum* Hoppe in Sturm; var. *nivale* Koch] PRAT(h)(ca). 1890-2400 m. r. VII-IX.
- Trifolium repens* L. - Trefolet, trevolet de prat. Trébol blanco. Trèfle blanc. White clover. PRAT(h),RUD(t). 1200-2400 m. ccc. V-X.
- Trifolium rubens* L. HERB(v). Fenc bord. -. Trèfle pourpré. Foxtail Clover. 1480 m. rrr. VII.
- Trifolium scabrum* L. Trèvol escabre. Trébol áspero. Trèfle scabre. Rough clover. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
- Trifolium spadiceum* L. . -. -. PRAT(h),AQUA(m). 1400-1770 m. rrr. VII. EA.
- Trifolium striatum* L. subsp. *brevioidens* (Lange) Munoz Rodr. PRAT(r). 1240-1560 m. r. VI-VII.
- Trifolium thalii* Vill. . -. -. PRAT(ca). 1920-2670 m. rr. VII-VIII.
- Vicia angustifolia* L. [*V. sativa* subsp. *nigra* (L.) Ehrh.] Veça. Veza. Vesce commune. Common vetch. PRAT,ARV,RUD(h). 1240- 1780 m. c. V-VI.
- Vicia benghalensis* L. ARV. 1250 m. rrr.
- Vicia cracca* L. [*V. cracca* subsp. *cracca*] HERB(c)(v). 1350-1700 m. r. V-VII.
- Vicia dasycarpa* Ten. [*V. villosa* Roth subsp. *varia* (Host.) Corb.] Garlanda pilosa. -. Vesce bigarrée. Hairy vetch. ARV,RUD(h). 1200-1900 m. c. V-VII.
- Vicia incana* Gouan [*V. cracca* subsp. *incana* (Gouan) Rouy; *V. incana* subsp. *gerardii* Gaudin] Garlanda. Alverja. Vesce blanchâtre. Tufted vetch. HERB(v). 1200-1700 m. rrr. VII.
- Vicia lathyroides* L. PRAT. 1220 m. rrr. VI.
- Vicia onobrychioides* L. HERB(v),PRAT. 1260-1700 m. rr.VII.
- Vicia orobus* DC. -. -. *Orobe des landes*. -. HERB(m). 1250-1940 m. rrr. VI. EA.
- Vicia pannonica* Crantz subsp. *striata* (M. Bieb.) Nyman [*V. pannonica* subsp. *purpurascens* (DC.) Arcang.] LOC.PROP.
- Vicia peregrina* L. LOC.PROP.
- Vicia pyrenaica* Pourr. Arvellola pirinenca. Arveja de los Pirineo. Vesce des pyrénées. -. PRAT(s)(ca). 1560-2460 m. cc. VI-VII.
- Vicia pseudocracca* Bertol. [*V. villosa* subsp. *pseudocracca* (Berol.) Rouy; *V. villosa* subsp. *ambigua* (Guss.) Kerguelen] ARV. 1240. rrr. VII.
- Vicia sativa* L. Vecera. Alverja. Vesce fourragère. Common Vetch. ARV,RUD. 1410 m. rrr. VI.
- Vicia sepium* L. Veça de bosc. Arveja silvestre. Vesce des haies. Bush vetch. HERB(v). 1200-2040 m. cc. V-VII.
- Vicia tenuifolia* Roth [*V. cracca* subsp. *tenuifolia* (Roth) Gaudin] HERB(v)(c). 1260-1620 m. cc. VII-VIII.
- Vicia villosa* Roth [*V. villosa* Roth subsp. *villosa*] ARV. 1220-1230 m. rrr VI-VII.

Fagaceae

- Fagus sylvatica* L. Faig. Haya. Hêtre. Beech. BOSC(h). 1240-1700 m. r. IV-V.
Quercus petraea (Matt.) Liebl. Roure de fulla gran. Roble albar. Chêne sessile. Sessile oak. BOSC(s). 1220-1800 m. cc. V-VI.
Quercus pubescens Willd. [*Q. humilis* Mill.] Roure martinenc. Roble común. Chêne pubescent. Downy oak. BOSC(s). 1450-1580 m. rr. IV-V.

Gentianaceae

- Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata* Centaura groga. Centaurea amarilla. Chlore perfoliée. Yellow-wort. PRAT(h),AQUA(j). 1240-1600 m. rr. VI-VII.
Centaureum erythraea Rafn subsp. *erythraea* Herba de santa margarida. Centaura menor. Petite-centaurée commune. Common centaury. PRAT. 1540 m. rrr. VI.
Centaureum pulchellum (Sw.) Druce AQUA(j). 1240 m. rrr. VII.
Cicendia filiformis (L.) Delarbre ERROR.
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok. [*Gentiana tenella* Rottb.] AQUA(c)(ca). 1980-2740 m.rr. VII-IX.
Gentiana acaulis L. [*Gentiana acaulis* L. subsp. *acaulis*] Genciana, genciana acaule. Genciana acaule. Gentiane acaule. Stemless gentian. PRAT(h). 1440-2400 m. cc. IV-VII.
Gentiana alpina Vill. Genciana alpina. -. Gentiane des Alpes. -. PRAT(ac). 1900-1760 m. c. VI-VIII.
Gentiana burseri Lapeyr. subsp. *burseri* Genciana de burser. Genciana amarilla. Gentiane de burser. -. MAT(n),HERB(m). 1500-2400 m. c. VII-VIII.
Gentiana cruciata L. Genciana cruciada. Genciana cruciada. Gentiane croisetie. Cross gentian. PRAT(h),HERB(v). 1500-1680 m. r. VII-VIII.
Gentiana lutea L. subsp. *lutea* Genciana, genciana groga. Genciana amarilla. Gentiane jaune. Yellow gentian. PRAT(h). 1200-2280 m. cc. VI-VII.
Gentiana nivalis L. Genciana nival. Genciana nival. Gentiane des neiges. Snow gentian. PRAT(ca). 1940-2400 m. rr. VII-X.
Gentiana pneumonanthe L. Gentiana d'aiguamoix. -. -. -. AQUA(m). 2000 m. PROT. AME/EN. EX-RE. VII-X. EA.
Gentiana pyrenaica L. Genciana pirinenca. Genciana pirenaica. Gentiane des pyrénées. Pyrenean gentian. PRAT(h). 1640-2400 m. cc. V-VIII.
Gentiana utriculosa L. ERROR.
Gentiana verna L. [*G. schleicheri* (Vacc.) Kunz; *G. terglouensis* subsp. *schleicheri* (Vacc.) Tutin] Pastorella. Genciana azul. Gentiane de printemps. Spring gentian. PRAT. 1200-2840 m. cc. IV-IX.
Gentiana ×marcaillouana Rouy [*G. lutea* × *G. burseri*] MAT(n). 2080 m. rrr. VII.
Gentianella campestris (L.) Börner subsp. *campestris* [*Gentiana campestris* L. subsp. *campestris*] Genciana, genciana campestre. Genciana alpina. Gentiane des champs. Field gentian. PRAT(h). 1200-2800 m. cc. VI-IX.
Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp. *ciliata* [*Gentiana ciliata* L. subsp. *ciliata*; *Gentianella ciliata* (L.) Borkh.] Genciana ciliada. Genciana ciliada. Gentiane ciliée. Fringed gentian. PRAT(h). 1300-1880 m. r. VIII-X.
Swertia perennis L. Esvertia. Genciana morada. Swertie vivace. Star swertia. AQUA(m). 1980-2350 m. r. VII-IX.

Geraniaceae

- Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. Agulles de bruixa. Aguja de pastor. Bec-de-grue à feuilles de ciguë. Common storks bill. ARV,RUD(t),PRAT(r). 1200-2100 m. c. III-VII.
Geranium columbinum L. Gerani de colom. Geranio pie de paloma. Pied-de-pigeon. Long-stalked crane's-bill. RUD(h),ARV,PRAT. 1200-1750 m. c. V-VIII.

- Geranium dissectum* L. Gerani de fulles retallades. Geranio recortado. G ranium d coup . Cut-leaf geranium. RUD(h). 1200-1600 m. r. V-IX.
- Geranium molle* L. Suassana blana. Geranio peloso. G ranium   feuilles molles. Dove's-foot crane's-bill. RUD. 1200-1450 m. IV-VI.
- Geranium nodosum* L. Gerani nu s. Geranio nodoso. G ranium   tige noueuse. Knotted cranesbill. BOSC(h). 1200-1380 m. rrr. VI-VII.
- Geranium phaeum* L. Gerani obscur. Geranio oscuro. G ranium brun.. Dusky cranesbill. HERB(c),BOSC(h). 1250 m. rrr. VI-VII.
- Geranium pratense* L. Gerani de prat. Geranio de prado. G ranium des pr s. Meadow geranium. PRAT(h),HERB(m). 1550-1600 m. rrr. VI-VII. DEC. EA.
- Geranium pusillum* L. Suassana de flor menuda. -. G ranium flu t. Small Geranium .RUD(t). 1240-1560 m. r. VII-IX.
- Geranium pyrenaicum* Burm. f. subsp. *pyrenaicum* Suassana pirinenca. Geranio pirenaico. G ranium des pyr n es. Pyrenean cranesbill. RUD, HERB(v). 1200-2120 m. cc. V-IX.
- Geranium robertianum* L. Cicuta, herba de Sant Robert. Geranio de San Roberto. Herbe   Robert. Herb Robert. ROC,HERB(v)(h). 1200-2000 m. cc. V-VIII.
- Geranium rotundifolium* L. Suassana rotundif lia. Sausana. G ranium   feuilles ronde. Round-leaved crane's-bill. RUD. 1200-1520 m. c. V-VII.
- Geranium sanguineum* L. Gerani sanguini. Geranio sangu neo. G ranium rouge sang. Blood-red crane's-bil. HERB(v). 1520-1700 m. rrr. VI.
- Geranium sylvaticum* L. subsp. *sylvaticum* Gerani de bosc. Geranio de bosque. G ranium des for t. Wood cranesbill. HERB(m)(c)(v),PRAT(h). 1340-1980 m. c.

Gesneriaceae

- Ramonda myconi* (L.) Rchb. Orella d' s. Oreja de oso. Ramondie des pyr n es. -. ROC(r). 1200-1800 m. rrr. VI.

Grossulariaceae

- Ribes alpinum* L. Cirerola. Grosellero de muntanya. Groseillier des alpes. Alpine currant. MAT(n),HERB(c)(m). 1250-1880 m. c. V-VI.
- Ribes petraeum* Wulfen Grosella, riber silvestre. Grosellero pirenaico. Groseillier des rochers. Rock red currant. BOSC,MAT(h). 1260- 1540 m. rr. V-VI.
- Ribes rubrum* L. DUBT.DET. AL/AC.

Hipericaceae

- Hypericum humifusum* L. Hip ric humif s. -. Millepertuis couch . -. AQUA(j). 1500 m. rrr.
- Hypericum maculatum* Crantz subsp. *maculatum* Hip ric maculat. Hip rico no perforado. Millepertuis tach . Imperforate St, John's-wort. HERB(m)(v)(c),PRAT,MAT(g). 1200-2200 m. ccc. VI-VII.
- Hypericum montanum* L. Hip ric muntanyenc. -. Millepertuis des montagnes. -. HERB(v),BOSC. 1240-1620 m. c. VI-VII.
- Hypericum perforatum* L. Flor de cop, herba de Sant Joan. Hiperic n. Millepertuis perfor . Perforate St. John's wort. HERB(v),PRAT(s). ccc. 1200-2000 m. VI-VIII.
- Hypericum tetrapterum* Fr. Hip ric tetr pter. -. -. -. AQUA(j)(c). 1220-1660 m. c. VI-VII.

Juglandaceae

- Juglans regia* L. Noguer. Nogal. Noyer. Walnut. BOSC(h). 1240 m. rr. V. AL/AC.

Lamiaceae

Ajuga genevensis L. ERROR.

Ajuga pyramidalis L. subsp. *pyramidalis* Bújula piramidalis. Búgula piramidal. Bugle pyramidale. Pyramidal buble. PRAT,MAT(n). 1560-2330 m. c. VII-VIII.

Ajuga reptans L. Búgula. Consuelda media. Bugle rampante. Bugleweed. BOSC(h). 1220-1780 m. r. IV-V.

Ballota nigra L. [*B. nigra* subsp. *foetida* (Vis.) Hayek] Malrubí nere. Manrubio bastardo. -. -. RUD(h). 1240-1620 m. c. VI-VII.

Betonica officinalis L. [*Stachys officinalis* (L.) Trevisan] Betònica. Betónica. Bétoine officinal. Betony. MAT, BOSC,PRAT(ac). 1200-2000 m. VI-VII.

Clinopodium nepeta subsp. *sylvaticum* (Bromf.) Peruzzi & F. Conti [*Calamintha nepeta* subsp. *sylvatica* (Bromf.) R. Morales] HERB(v),ROC(m). 1230-1250 m. rrr. VIII-XI.

Clinopodium vulgare L. [*Satureja vulgaris* (L.) Fritsch; *Calamintha clinopodium* Benth.] Orenga borda. Clinopodio. Grand basilic. Cushion calaminth. HERB(v)(s),PRAT(s). 1200-1600 m. ccc. VII.VIII.

Galeopsis angustifolia Hoffm. [*G. ladanum* subsp. *angustifolia* (Hoffm.) Celak.] Galeopsis de fulla estreta. -. Galéopsis à feuilles étroites. Red hemp-nettle. ROC(t). 1380-1680 m. rr. VI-VII.

Galeopsis blanquetii Sen. ERROR

Galeopsis filholiana Timb.-Lagr. ERROR.

Galeopsis ladanum L. subsp. *ladanum* Galeopsis vermella. -. Galéopsis intermédiaire. Red hemp nettle. ARV,ROC(t). 1220-1450 m. r. VI-VII.

Galeopsis nardalis Sen. ERROR.

Galeopsis pyrenaica Bartl. [*Galeopsis ladanum* L. subsp. *pyrenaica* (Bartl.) O. Bolòs] Galeopsis pirinenca. -. Galeopse des Pyrénées. Pyrenean hemp-nette. ROC(t). 1320-2680 m. cc. VIII-IX.

Galeopsis tetrahit L. subsp. *tetrahit* Tetrahit. Galeópside de bosque. Galéopsis tétrahit. Bristle-stem hemp nettle. RUD(h),HERB(c). 1240-2040 m. c. VII-VIII.

Glechoma hederacea L. - Heura de terra. DUBT.LOC.

Lamium album subsp. *album* - Ortiga blanc, ortiga morta blanca. Ortiga muerta blanca. Lamier blanc. White archangel. RUD(h). 1620-2120 m. r. VI-VIII.

Lamium amplexicaule L. Flor-rubí. Patica de gallo. -. -. ARV. 1220-1430 m. c. IV-VI.

Lamium galeobdolon (L.) Crantz subsp. *montanum* (Pers.) Hayek [*L. galeobdolon* auct.] Ortiga morta groga. Ortiga muerta amarilla. Lamier jaune. Yellow archangel. BOSC(h)(br). 1220- 1720 m. r. V-VI.

Lamium hybridum Vill. ARV. 1240 m. rrr. V.

Lamium maculatum L. Lami maculat. -. Lamier tacheté. Spotted dead-nette. HERB(c)(v),RUD(h). r. 1200-1850 m. V-VII.

Lamium purpureum L. ARV,HERB(h). 1240-1280 m. rr. VI.

Lavandula pyrenaica DC. [*L. angustifolia* Mill. subsp. *pyrenaica* (DC.) Guinea] - Espígol. -. -. PRAT(r). 1100-1300 m. rrr.

Lycopus europaeus L. Malrubí d'aigua. Menta de lobo. Lycope. Gypsywort. AQUA(j)(cr). 1220-1250 m. rrr. VII-VIII.

Marrubium vulgare L. RUD(h). 1480 m. rrr. VII.

Melissa officinalis L. BOSC(br). 1240 m. rrr. VI. AL/INV.

Melittis melissophyllum L. Melissot. Melisa bastarda. Mélitte à feuilles de mélisse. Bastard balm. HERB(v)(s),BOSC(s). 1240 m. rrr. VI.

Mentha aquatica L. Menta d'aigua. Menta acuática. Menthe aquatique. Water mint. AQUA(cr). 1240 m. rrr. VII.

Mentha arvensis L. Menta arvensis. Menta. -. -. AQUA(j)(c). 1200-1480 m. rr. VII

Mentha longifolia (L.) Huds. Menta de llop, menta boscana. Mastranzo silvestre. Menthe des bois. Downy mint. AQUA(j)(c)(m). 1220-2100 m. cc. VII-VIII.

Mentha spicata L. 1240 m. AQUA(h). rrr. VII. AL/ESP.

Mentha suaveolens Ehrh Menta borda. Mastranzo. Menthe suave. Apple Mint. AQUA(h)(j). rrr. VII.

Mentha xrotundifolia (L.) Huds. [*M. longifolia* x *M. suaveolens*] AQUA(h)(j). rrr. VII.

Nepeta cataria L. RUD(h). 1250 m. rrr. VII. AL/AC.

Nepeta nepetella L. subsp. *nepetella* ROC(t). 2100-2500 m. rrr. VII.

- Nepeta latifolia* DC. [*N. nuda* subsp. *latifolia* (DC.) O. Bolòs & Vigo] Nepta violàcia. -. Népéta à feuilles larges. -. RUD(h). 1300-1780 m. rr. VII-VIII.
- Origanum vulgare* L. Orega, moradui. Orégano. Marjolaine sauvage. European oregano HERB(v)(s),PRAT(s). 1200-1600 m. cc. VII-IX.
- Prunella grandiflora* (L.) Scholler [*P. grandiflora* (L.) Scholler subsp. *pyrenaica* (Gren. et Godr.) A. et O. Bolòs] Herba del traïdor, prunel·la grandiflora. Consuelda mayor. Brunelle à grandes fleurs. Bigflower selfheal. MAT(g),PRAT,HERB(v)(h). 1200-2275 m. cc. VI-IX.
- Prunella laciniata* (L.) L. Prunella blanca. Prunela blanca. Brunelle blanche. Cut leaved self-heal. PRAT(s). 1200-1620 m. c. VI-VIII.
- Prunella vulgaris* L. Prunel·la vulgar. Hierba de las heridas. Brunelle commune. Self-heal. PRAT(h),AQU(m)(j). 1200-2180 m. cc.
- Prunella ×bicolor* Beck [*P. grandiflora* × *P. laciniata*] PRAT(ac). 1460 m. rrr. VII.
- Prunella ×intermedia* Link [*P. laciniata* × *P. vulgaris*] PRAT. 1560 m. rrr. VII.
- Prunella ×surrecta* Dumort. [*Prunella x coutinhoi* Rouy; *P. grandiflora x vulgaris*] PRAT(ac). 1480 m. rrr. VII
- Salvia glutinosa* L. Sàlvia de flor groga. -. Sauge glutineuse. Jupiter's distaff, sticky sage. BOSC(cl). 1240-1480 m. rr. VIII-IX.
- Salvia pratensis* L. Sàlvia silvestre, sàlvia de prat. Salvia de prado. Sauge des prés. Meadow clary. PRAT(s). 1220-1720 m. c. V-VII.
- Satureja montana* L. subsp. *montana* ROC(r). 1450-1800 m. rr. VII-IX.
- Scutellaria alpina* L. subsp. *alpina* Escutel·lària alpina. Tercianera alpina. Scutellaire des alpes. -. ROC(t)(ca). 1580-2580 m. r. VII-VIII.
- Sideritis endressii* Willk. ERROR.
- Sideritis eynensis* Sen. ERROR.
- Sideritis hirsuta* L. Herba de la feridura. Sajareña. Crapaudine hirsute. -. PRAT,ROC (s). 1380 m. rrr. VII.
- Sideritis hyssopifolia* L. Herba del bàlsam. Rabogato pirenaico. Crapaudine à feuilles d'hysope. -. 1420-2620 m. ccc. VI-VIII.
- Sideritis mariae* Sen. ERROR.
- Stachys alpina* L. Estaquis alpina. -. Épiaire des alpes. -. HERB(cl)(m). 1500-1980 m. rrr. VI-VII.
- Stachys palustris* L. Estaquis palustre. Ortiga hedionda. Épiaire des marais. Marsh woundwort. AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI-VII.
- Stachys recta* L. Herba de Sant Antoni. Hierba de la perlesia. Épiaire droite. Perennial yellow woundwort. PRAT(s). 1240-1680 m. c. VI-VIII.
- Stachys sylvatica* L. Ortiga pudent. Betónica mayor. Épiaire des bois. Hedge woundwort. HERB(c)(v). c. 1200-1780 m. VI-VII.
- Teucrium botrys* L. Bengranat, teucri de codina. Pinillo hembra de jaraba. Germandrée en grappe. Cutleaf Germander. ROC(c). 1340 m. rrr. VII.
- Teucrium chamaedrys* L. [*T. chamaedrys* subsp. *pinnatifidum* (Sennen) Rech. fil.; *T. chamaedrys* subsp. *germanicum* (F. Hermann) Rech. fil.] Camedris. Camedrio. Germandrée petit-chêne. Wild germander. ROC. 1220-1560 m. r. VI-VIII.
- Teucrium pyrenaicum* L. subsp. *guarensis* P. Monts. Angelins. Zamarrilla pirenaica. Germandrée des Pyrénées. Pyrenean germander. PRAT(s). 1220-1880 m. c. VI-VII.
- Teucrium scorodonia* L. Escorodònia.Camedrio de los bosques. Germandrée scorodaine. Wood sage. BOSC,MAT(g)(ac). 1200-1700 m. cc. VI-VIII.
- Thymus callitrichifolius* Sen. ERROR.
- Thymus drucei* Ronniger [*Th. praecox* Opiz subsp. *britannicus* (Ronniger) Holub] PRAT. 1770 m. rr. VII.
- Thymus mariae* Sen. ERROR.
- Thymus nervosus* Willk. [*Th. serpyllum* subsp. *nervosus* (Benth.) Nyman] Farigoleta de pastor, serpoll. Thym à nervures saillantes. -. PRAT,ROC. 1820-2740 m. cc. VI-VIII.
- Thymus oreus* Charbonnel ERROR.
- Thymus praecox* Opiz subsp. *polytrichus* (Borbas) Jalas [*T. serpyllum* subsp. *polytrichus* (Borbas) Briq.] PRAT(h)(ac). 1780-2440 m. c. VI-X.

Thymus pulegioides L. [*Th. chamaedrys* Fr.; *T. serpyllum* L. subsp. *chamaedrys* (Fr.) Vollm.; *T. froelichianus* Opiz; *T. carniolicus* Déségl., *T. pulegioides* var. *vestitus* (Lange) Jalas] Farigoleta de pastor, serpoll. Tomillo de prado. Serpolet petit-chêne. Larger wild thyme. PRAT. 1200-2200 m. ccc. VI-IX.

Thymus serpyllum subsp. *carolii* Sennen & Ronniger PRAT(r). 1240-1330 m. rr. VII.

Thymus vulgaris L. subsp. *vulgaris* Farigola. Tomillo. Thym commun. Common thyme. PRAT(s),ROC. 1240-1800 m.

Thymus x nuriensis Sennen & Pau [*T. nervosus* x *T. praecox* subsp. *polytrichus*] PRAT. 1900-2400 m. rr.

Ziziphora acinos (L.) Melnikov subsp. *acinos* [*Clinopodium acinos* (L.) Kuntze subsp. *acinos*; *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy subsp. *arvensis*; *Satureja acinos* (L.) Scheele subsp. *acinos*] - PRAT(r). 1200-2200 m. c.

Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *alpina* (L.) Bräuchler & Gutermann [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze; *Acinos alpinus* (L.) Moench] Calament alpi. Albahaca silvestre. Calament des Alpes. Alpine calamint. ROC(t)(ca). 1500-2300 m. c. VI-VII.

Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. *granatensis* [*Clinopodium alpinum* (L.) Kuntze subsp. *meridionale* (Nyman) Govaerts; *Satureja acinos* subsp. *meridionalis* (Nyman) O. Bolòs & Vigo] Calament alpi. -. Calament des Alpes. -. PRAT(s)(r). 1240-1700 m. c. VI-VII.

Lentibulariaceae

Pinguicula grandiflora Lam. Viola d'aigua. Grasilla mayor. Grassette à grandes fleurs. Large-floowered butterwort. AQUA(m)(f)(ca). 1220-2100 m. c. VI-VII..

Pinguicula vulgaris L. Pingüícula. Grasilla. Grassette commune. Butterwort. AQUA(m)(f)(ca). 1400-2380 m. r. VII-VIII.

Linaceae

Linum alpinum Jacq. subsp. *alpinum* [*L. perenne* subsp. *alpinum* (Jacq.) Stoj. & Stefanov] PRAT(s)(t). 1980-2200 m. rr. VII.

Linum bienne Mill. [*L. usitatissimum* subsp. *bienne* (Mill.) Stank.; *L. usitatissimum* subsp. *angustifolium* (Huds.) Thell.] Lli. Lino. Lin à feuilles étroites. Pale flax. PRAT(s). 1220-1480 m. r. V-VII.

Linum catharticum L. Llinet purgant. Lino purgante. Lin cathartique. Fairy flax. PRAT(h)(ac),AQUA(j). 1220-1880 m. ccc. VI-VII.

Linum narbonense L. subsp. *narbonense* Lli de Narbona. Lino. Lin de narbonne. Heavenly blue flax. PRAT(ca). 1700 m. rrr. VI.

Linum trigynum L. PRAT(s)(r). 1340 m. rrr. VII.

Lythraceae

Lythrum salicaria L. Salicària. Salicaria. Salicaire commune. Purple loosestrife. AQUA(j). 1200-1280 m. rr. VI-VIII.

Malvaceae

Alcea rosea L. [*Althaea rosea* (L.) Cav.] Malva reial. Malva real. Passe-rose. Hollyhock. RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/AC.

Althaea officinalis L. Malví. Malvavisco. Mauve blanche. Marsh mallow. RUD. 1260 m. rrr. VII. AL/AC.

Malva alcea L. [*M. alcea* subsp. *fastigiata* (Cav.) O. Bolòs & Vigo] Alcea. -. -. RUD(h). 1260 m. rrr. VII.

Malva moschata L. Malva moscada. -. Mauve musquée. Musk-mallow. PRAT. 1340 m. rrr. VII.

Malva neglecta Wallr. Malva de fulla petita. Malva enana. Petite mauve. Dwarf mallow. RUD(t). 1200-2100 m. cc. VI-X.

Malva setigera K.F. Schimp. & Spenn. [*Althaea hirsuta* L.] ROC(m). 1380 m. rrr. VI.

Malva sylvestris L. Malva. Malva. Grande mauve, Common mallow. RUD. 1200-1700 m. cc. V-VIII.

Tilia platyphyllos Scop. Tell, tell de fulla gran. Tilo común. Tilleul à grandes feuilles. Large leaved lime. BOSC(h)(br). 1200-1650 m. cc. VI-VII..

Tilia x europaea L. [*T. x vulgaris* Hayne; *T. cordata* x *T. platyphyllos*] RUD. 1240 m. rrr. VI.

Montiaceae

Montia fontana L. subsp. *fontana* [*M. fontana* subsp. *variabilis* Walters] Mòntia. Verdolaga de agua. Montie des fontaines. Blinks. AQUA(f). 1350-2000 m. c. VI-VII..

Moraceae

Ficus carica L. ROC. 1500 m. rrr.

Nictaginaceae

Mirabilis jalapa L. Flor de nit. Dondiego de noche. Belle-de-nuit. Four o'clock flower. RUD. 1240 m. rrr. IX. AL/AC.

Oleaceae

Fraxinus excelsior L. subsp. *excelsior* Freixe (de fulla gran). Fresno. Frêne commun. Ash. BOSC(h)(br). 1200-1780 m. ccc.

Ligustrum vulgare L. Olivereta. Aligustre. Troène commun. Common privet. BOSC(s),MAT(b). 1340 m. rrr. VI.

Onagraceae

Circaea lutetiana L. Herba de les encantades. Hierba de la bruja. Circée commune. -. BOSC(h)(br). 1200-1460 m. rr. VI-VII.

Epilobium alsinifolium Vill. Epilobi alsinifoli. Epilobio alpino. Épilobe à feuilles d'alsine. Chickweed willowherb. AQUA(f). 1400-2600 m. c. VII-VIII.

Epilobium anagallidifolium Lam. AQUA(f)(c),ROC(t)(h). 2100-2580 m. r. VII-IX.

Epilobium angustifolium L. subsp. *angustifolium* Cameneri. Epilobio de hojas estrechas. Laurier de saint antoine. Willow herb. HERB(c)(v). 1200-2400 m. c. VII-VIII.

Epilobium collinum C.C. Gmel. Epilobi roquer. -. Épilobe des collines. Hill willowherb. ROC(r)(t). 1200-2620 m. c. VI-VIII.

Epilobium hirsutum L. Epilobi hirsut. Hierba de San Antonio. Épilobe hirsute. Great willow herb. AQUA(j)(cr)(b). 1200-1520 m. c. VI-VIII.

Epilobium montanum L. Epilobi muntanyenc. -. Épilobe des montagnes. -. HERB(c)(v),BOSC(h). 1240 1780 m. cc.VI-VII.

Epilobium obscurum Schreb. AQUA(f). 1820 m. rrr. VIII.

Epilobium palustre L. AQUA(j)(m)(f) .1320-1900 m. c. VII-VIII.

Epilobium parviflorum Schreb. Epilobi de flor petita. -. Épilobe à petites fleurs. -. AQUA(j)(cr)(b). 1240-1600 m. c. VII-VIII.

Epilobium roseum Schreb. subsp. *roseum* -. -. Épilobe rose au sens large. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. VII.

Oenothera biennis L. [*O. suaveolens* Desf.; *O. biennis* subsp. *suaveolens* (Pers.) Rouy & Camus] Enotera groga. Enotera. Onagre bisannuelle. Common evening-primrose. RUD(h),ROC(t)(h). 1220-1780 m. c. VII. VIII. AL/AC.

Oenothera rosea Aiton Onagra rosada. Yerba del golpe. Onagre rosée. Pink evening primrose. RUD(h). 1240-1280 m. r. VI. AL/AC.

Orobanchaceae

Bartsia alpina L. Bàrstia alpina. Bartsia alpina. Bartsie des Alpes. Alpine bartsia. AQU(m)(f). 1820-2400 m. c. VI-VII.

Euphrasia alpina Lam. subsp. *alpina* [*E. alpina* subsp. *pulchra* (Sennen) O. Bolos & Vigo]. Eufràsia. Eufrasia alpina. Euphrase des Alpes. Alpine eyebright. PRAT. 1500 m. rr. EA.

- Euphrasia hirtella* Reut. Eufràsia. Eufrasia. Euphrase hérissée. -. PRAT(h). 1450-1710 m. c. VII-VIII.
- Euphrasia minima* DC. [*E. minima* subsp. *masclansii* O. Bolos & Vigo; *E. minima* subsp. *sicardii* (Sennen) O. Bolos & Vigo] -. -. Petite Euphrase. Dwarf Eyebright. PRAT(si),AQUA(c). 1980-2650 m. r. VII-IX.
- Euphrasia nemorosa* (Pers.) Wallr. [*E. officinalis* L. var. *nemorosa* Pers.] -. -. Euphrase des bois. Common Eyebright. PRAT(h). 1430-1720 m. r. VII-VIII.
- Euphrasia officinalis* subsp. *rostkoviana* (Hayne) F. Towns. ERROR.
- Euphrasia pectinata* Ten. (*E. stricta* var. *pectinata* (Ten.) O. Bolòs & Vigo] Eufràsia. Eufrasia. Euphrase pectinée. -. PRAT(h). 1260-1550 m. r. VI-VIII.
- Euphrasia salisburgensis* Hoppe -. -. Euphrase de Salzbouurg. -. PRAT(ca). 1230-2340 m. c. VII-IX.
- Euphrasia stricta* J.F. Lehm. -. -. Euphrase dressé. Drug Eyebright. PRAT. 1240-1820 m. c. VII-IX
- Lathraea squamaria* L. Esquamària. Escumaria. Clandestine écailleuse. Great toothwort. BOSC(h). 1340 m rrr. VI.
- Melampyrum pratense* subsp. *latifolium* Schübl. & G. Martens [*M. pratense* subsp. *oligocladum* (Beauverd) Soó; *M. pratense* subsp. *vulgatum* auct.] - Xuclador. Trigo de vaca. Mélampyre des prés. Cow-wheat. BOSC(ac). 1500 m. rrr. VII-VIII. EA.
- Melampyrum pratense* L. subsp. *pratense* [*M. pratense* subsp. *alpestre* Ronniger, nom. illeg] Xuclador. Trigo de vaca. Mélampyre des prés. Cow-wheat. BOSC(ac). 1200-2140 m. r. VI-VIII.
- Melampyrum sylvaticum* L. subsp. *sylvaticum*. DUBT.DET.
- Odontites cebennensis* Coste & Soulié [*O. lanceolatus* subsp. *olotensis* (Cadevall) O. Bolòs & Vigo] -. -. Euphrase d'Olot. -. PRAT(ca). 1200-1480 m. r. VIII-IX.
- Odontites vernus* subsp. *serotinus* Corb. PRAT(s). 1260 m. rrr. VIII.
- Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. subsp. *vernus* -. -. Euphrase rouge. -. PRAT(h),AQUA(j). 1230-1480 m. c. VI-VIII.
- Orobanche amethystea* Thuill. Frare. -. Orobanche couleur d'améthyste. -. PRAT (sobre *Eryngium*). 1340-1380 m. r. VI-VII.
- Orobanche caryophyllacea* Sm. -. -. Orobanche à odeur d'oeillet. Bedstraw Broomrape. PRAT,ROC(m) (sobre *Rubiaceae*). 1250-1420 m. r.
- Orobanche crenata* Forssk. Frare de les faveres. Jopo. Orobanche crénelé. Bean Broomrape. ARV. 1240 m. rrr. VI.
- Orobanche gracilis* Sm. [*O. crinita* auct.] Frare grácil. -. Orobanche grêle. -. PRAT (sobre *Fabaceae*). 1230-1880 m. cc. VI-VII.
- Orobanche haenseleri* Reut. BOSC(s) (sobre *Helleborus foetidus*). 1450-1820 m. rrr. VI-VII.
- Orobanche hederæ* Duby BOSC,ROC(m) (sobre *Hedera*). 1220-1430 m. r. VII.
- Orobanche minor* Sm. Frare. Rabo de lobo. Orobanche du trèfle. Common Broomrape. PRAT (sobre *Trifolium*). 1240-1520 m. cc. VI-VII.
- Orobanche rapum-genistæ* Thuill. Frare de ginesta. Espárrago de lobo. Orobanche du genêt. -. MAT(g)(bg),PRAT (sobre *Cytisus*). 1220-1720 m. c. VI-VII.
- Orobanche reticulata* Wallr. Frare de cardassa. Jopo. Orobanche réticulée. -. RUD,PRAT (sobre *Cirsium eriophorum*). 1620-1780 m. rrr. VII. DEC. EA.
- Orobanche variegata* Wallr. ERROR.
- Pedicularis comosa* L. subsp. *comosa* Pedicularis comosa. Gallarito amarillo. Pédiculaire chevelue. Crested lousewort PRAT(s),HERB(m). 1550-2300 m. c. VI-VII.
- Pedicularis comosa* subsp. *asparagoides* (Lapeyr.) P. Fourn. [*P. asparagoides* Lapeyr.] ERROR.
- Pedicularis foliosa* L. subsp. *foliosa* Pedicularis foliosa. Gallarito folioso. Pédiculaire feuillée. Leafy lousewort. HERB(m). 1560-2000 m. rr. VI-VII.
- Pedicularis palustris* L. ERROR.
- Pedicularis pyrenaica* J. Gay Pedicularis pirinenca. Felguera de puerto. Pédiculaire des pyrénées. Pyrenean lousewort. PRAT(ac). 1660-2800 m. cc. VI-VIII.
- Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica* Pedicularis selvàtica. Gallarito. Pédiculaire des bois. Lousewort. PRAT(h),AQUA(m). 1300-1880 m. r. VI-VII.
- Pedicularis tuberosa* L. ERROR.
- Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják subsp. *purpurea* [*Orobanche purpurea* Jacq.] Frare. Dedal azul de viuda. Orobanche pourpre. -. PRAT(t). 1240 m. rrr. VI. DEC. EA.

Rhinanthus minor L. Esquellada petita. -. Petit Rhinanth. Little Yellowrattle. PRAT(h). 1200-1880 m. c. VII-VIII.

Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau subsp. *pumilus* [*Rh. mediterraneus* (Sterneck) Sennen]Esquellada. Cascabelera. Rhinanth. nain. -. PRAT(h). 1200-1880 m. cc. VI-VIII.

Oxalidaceae

Oxalis acetosella L. subsp. *acetosella* Pa de cucut de bosc. Acederilla. Pain de coucou. Cuckoo bread, Woodsorrel. BOSC(h)(br). 1230-2000 m. c. V.

Oxalis corniculata L. Agrella. Acederilla. Oxalide corniculée. Creeping oxalis, Creeping wood-sorrel, Procumbent yellow-sorrel. RUD,ROC(m). 1200-1420 m. c. VI-VII. AL/ESP.

Oxalis debilis Kunth [*O. debilis* subsp. *corymbosa* (DC.) O. Bolos & Vigo] -. -. Oxalide chétive. Pink shamrock. ARV,RUD. 1260-1320 m. rr. VI. AL/AC.

Oxalis latifolia Kunth Pa de cucut de fulla ampla. Aleluya. Oxalide à larges feuilles. Garden Pink-sorrel. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/AC.

Oxalis vallicola (Rose) R. Kunth RUD(t). 1240-1360 m. rr. VI. AL/AC.

Papaveraceae

Chelidonium majus L. Lletdeteresa, herba de les orenetes. Celidonia. Grande chélidoine. Greater celandine. RUD(h). 1200-1450 m. c. V-VII.

Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. *solida* BOSC(h),HERB(c). 1500-1900 m. rrr. IV-V. EA

Fumaria officinalis L. subsp. *officinalis* ARV,RUD,ROC(m). 1240-1310 m. rr. VI.

Papaver alpinum L. [*P. aurantiacum* Loisel., *P. rhaeticum* Leresche; *P. lapeyrousianum* Greuter & Burdet; *P. alpinum* subsp. *suaveolens* (P. Fourn.) O. Bolòs & Vigo; *P. pyrenaicum* (L.) Willd.]. Paramà alpi. -. -. ROC(t). 1920-2700 m. c. VI-VIII. PRO. EA.

Papaver dubium L. subsp. *dubium* LOC.PROP.

Papaver rhoeas L. Rosella. Amapola. Coquelicot. Common poppy. ARV,RUD. 1200-2000 m. c. VI-VIII. AL/ESP.

Papaver somniferum L. subsp. *setigerum* (DC.) Arcang. Cascall. LOC.PROP.

Roemeria argemone (L.) C. Morales, R. Mend. & Romero García [*Papaver argemone* L.] LOC.PROP.

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. ERROR.

Plantaginaceae

Antirrhinum majus L. subsp. *majus* Gossos. Conejitos. Grand mufler. Snapdragon. ROC(r)(m). 1200-1680 m.c. VI-VIII.

Asarina procumbens Mill. [*Antirrhinum asarina* L.] Asarina. Asarine couchée. Creeping snapdragon. ROC(r)(si). 1220-2460 m. IV-IX.

Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. *minus* ROC(t),ARV. 1220-2080 m. c. VI-VIII.

Chaenorhinum organifolium (L.) Kostel. subsp. *organifolium* ROC(ca). 2000-2250 m. rrr. EA

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. *muralis* Picardia. Palomilla de muro. Cymbalaire des murs. Ivy-leaved toadflax. ROC(m). 1230-1260 m. r. V-VIII. AL/ESP.

Digitalis lutea L. subsp. *lutea* Didalera groga. Digital amarilla. Digitale jaune. Yellow foxglove. HER(v)(c)(m)(h). 1200-1960 m. cc. VI-VIII.

Digitalis purpurea L. subsp. *purpurea* - BOSC(cl). 1925 m. rrr. DEC. EA.

Erinus alpinus L. Erinus. -. Érine des alpes. -. 1420-2200 m. rr. VI-VII.

Globularia cordifolia L. Lluqueta. Hierba negra. Globulaire à feuilles cordées. Matted globularia. ROC(r)(ca). 1200-2200 m cc. V-VII.

Globularia repens Lam. [*G. cordifolia* subsp. *repens* (Lam.) Wettst.] Lluqueta de roca. Hierba negra. Globulaire naine. Thyme-leaved glove-daisy. ROC(r)(ca). 1230-2650 m. cc. V-VIII.

- Globularia bisnagarica** L. [*G. punctata* Lapeyr.; *G. vulgaris* subsp. *willkommii* (Nyman) Wettst.] Barbes de vell, Senet de pobre. Globularia mayor. Globulaire commune. Common globularia. PRAT(s). 1450-1520 m. rrr. V.
- Linaria alpina** L. subsp. *alpina* Linària alpina. Linaria alpina. Linaire des Alpes. Alpine toadflax. ROC(t). 1880-2680 m. c. VI-VIII.
- Linaria repens** (L.) Mill. Linària estriada. Linaria blanca. Linaire rampante. Pale toadflax. ROC(t). 1550-2120 m. c. VI-VIII.
- Linaria supina** (L.) Chaz. subsp. *supina* Linària supina. Mosquitas doradas. Linaire couchée. Prostrate toadflax.
var. *supina* ROC(t),ARV. 1340-1820 m. r. VI-VIII.
var. *pyrenaica* (DC.) Duby ROC(t),ARV. 1820-2540 m. r. VI-VIII.
- Misopates orontium** (L.) Raf. [*Antirrhinum orontium* L.] RUD(t). 1230 m. rrr. VI.
- Plantago argentea** Chaix Plantatge argentí. -. Plantain argenté. -. PRAT(s)(ca). 1740-1800 m. rrr. VI-VII. EA.
- Plantago lanceolata** L. Plantatge, plantage llarg, plantatge estret, plantatge de fulla estreta. Llantén de hojas estrechas. Plantain lancéolé. Ribwort plantain. RUD,PRAT(t). 1200-2150 m. cc. V-X.
- Plantago major** subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange [*P. major* subsp. *pleiosperma* Pilg.] Plantatge, plantatge rodó, plantatge gros. Llantén mayor. Plantain à grandes feuilles. Englishman's foot. AQUA(j).1500 m. rrr.
- Plantago major** L. subsp. *major* Plantatge, plantatge rodó, plantatge gros. Llantén mayor. Plantain à grandes feuilles. Englishman's foot. RUD(t),PRAT(t). ccc. 1200-1880 m. VII-X.
- Plantago maritima** L. subsp. *serpentina* (All.) Arcang. Pedrenca serpentina. -. Plantain serpentant. -. ROC(h),PRAT(h). 1560 m. rrr. VI.
- Plantago media** L. Plantatge, plantatge mitjà. Llantén medio. Plantain blanc. Hoary plantain. PRAT(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.
- Plantago monosperma** Pourr. subsp. *monosperma* Plantatge monosperm. Llantén pirenaico. Plantain à une graine. Buckhorn plantain. PRAT,ROC(t). 1720-2750 m. cc. VI-VIII.
- Plantago sempervirens** Crantz [*P. cynops* L.] Plantatge de ca. Zaragatona mayor. Plantain toujours vert. Evergreen plantain. PRAT(s). 1460-1980 m. rr. V-VIII.
- Plantago subulata** L. [*P. holostium* Scop., *P. subulata* subsp. *holostium* (Scop.) O. Bolòs & Vigo; *P. subulata*] Pedrenca de prat. -. Plantain à feuilles en alène. -. PRAT(r),ROC(r). 1300-1780 m. r. VI-VII.
- Plantago ×mixta** Domin. [*P. major* × *P. media*] PRAT. 1320 m. rrr.VI.
- Veronica alpina** L. Verònica alpina. -. Véronique des Alpes. Alpine Speedwell. AQUA(c). 2000-2600 m. r. VII-VIII.
- Veronica anagallis-aquatica** L. subsp. *anagallis-aquatica* Herba de folls. Berula. Véronique mouron d'eau. Blue water speedwell. AQUA(cr). 1200-1520 m. rr. V-VIII.
- Veronica aphylla** L. Verònica afil·la. -. Véronique à tige nue. Leafless-stemmed Speedwell. 1800-2340 m. PRAT,AQUA(c) (ca). rr. VII-VIII.
- Veronica arvensis** L. Morró negre. Veronica arvense. Véronique des champs. Corn Speedwell. ARV,PRAT(r). 1240-2080 m. cc. V-VIII.
- Veronica beccabunga** L. subsp. *beccabunga* Creixen de cavall. Verónica de agua.Véronique des ruisseaux. Brooklime. AQUA(cr). 1200-2280 m. cc. V-IX.
- Veronica bellidioides** L. Verònica bel·lidoide. -. Véronique fausse pâquerette. -. PRAT(s). 1940-2740 m. c. VI-VIII.
- Veronica chamaedrys** L. subsp. *chamaedrys* Verònica camedris. Verónica de bosque. Véronique petit-chêne. Germander speedwell. BOSC(h),HERB(h)(v)(m). 1220-2080 m. cc. VI-VIII.
- Veronica fruticans** subsp. *cantabrica* M. Lainz ROC(t),PRAT(r). 1500-2720 m. cc. VII-IX.
- Veronica fruticans** Jacq. subsp. *fruticans* [*Veronica fruticulosa* L. subsp. *saxatilis* (Scop.) Arcang.] Verònica fruticulosa. Verónica de la rocas. Véronique des rochers. Rock speedwell. Citada en PRAT(s), entre 1550 i 2760 m, com a rrr. VII-VIII. Diversos plecs revisats corresponen tots a *V. fruticans* subsp. *cantabrica*. DUBT.DET.
- Veronica fruticulosa** L. - PRAT(r). 1700-2780 m. c.
- Veronica hederifolia** L. Herba de sínia. Veronica. Véronique à feuilles de lierre. Ivy-leaf Speedwell. ARV,RUD,ROC(m). 1200-1620 m. c. V-VII.

- Veronica montana* L. Verònica de muntanya. -. Véronique des montagnes. -. 1200-1600 m. rr. V-VI.
- Veronica nummularia* Gouan Verònica nummulària. -. Véronique nummulaire. Pyrenean Speedwell. ROC(t)(ca). 2200-2700 m. r. VII-VIII.
- Veronica officinalis* L. Herba de Santa Caterina, verònica oficinal. Verónica macho. Véronique officinale. Common speedwell. BOSC,MAT,PRAT(ac). 1220-2120 mm. cc. VI-VIII.
- Veronica orsiniana* Ten. [*V. austriaca* subsp. *teucrium* sensu O. Bolòs & Vigo] Verònica austríaca. -. Véronique germandrée. -. PRAT(s). 1220-1920 m. cc. VI-VIII.
- Veronica persica* Poir. Blauet, verònica pèrsica. Borroncillo. Véronique commune. Common field speedwell. ARV,RUD. 1220-1380 m. r. IV-VI. AL/ESP.
- Veronica polita* Fr. Verònica polida. Veronica polita. Véronique brillante. Grey Field-speedwell. ARV,RUD(t). 1220-1460 m. r. V-VII.
- Veronica ponae* Gouan Verònica de Pona. Verónica pirenaica. Véronique de gouan. Spiked Pyrenean speedwell. AQUA(f). 1680-2180 m. c. VI-VIII.
- Veronica praecox* All. ERROR.
- Veronica serpyllifolia* L. subsp. *serpyllifolia* [*V. serpyllifolia* subsp. *humifusa* (Dicks.) Syme] Herba de l'ull, herba del mal d'ull, verònica serpil-lifòlia. Verónica de prado. Véronique à feuilles de serpolet. Thymeleaf speedwell. RUD(t). 1320-2080 m. c. VI-VII.
- Veronica spicata* L. subsp. *spicata* Verònica d'espiga. -. Véronique en épi. Spiked speedwell. PRAT(s). 1900-2380 m. rrr. VII-VIII. EA.
- Veronica triphyllus* L. Verònica trifil·la. -. Véronique digitée. -. Fingered speedwell. ARV. 1260 m. rrr. V.
- Veronica urticifolia* Jacq. Verònica latifòlia. -. Véronique à feuilles d'ortie. Nettle-leaved speedwell. BOSC(h),ROC(h). 1220-1800 m. cc. VI-VIII.
- Veronica verna* L. -. Veronica verna. Véronique de printemps. Spring Speedwell. PRAT(r). 2020-2150 m. rrr. VI.

Plumbaginaceae

- Armeria alpina* Willd. [*A. maritima* subsp. *alpina* (Willd.) P. Silva] Gasó alpi. Mermasangre. Arméria des Alpes. Alpine thrift. Vigo (1983) i altres autors la citen a PRAT(ac), 2040-2800 m, c i VI-VIII. Caldria comprovar la distribució real del tàxon ja que diversos plecs revisats corresponen a *A. muellerii* o formes intermèdies.
- Armeria arenaria* (Pers.) Schult. subsp. *arenaria* [*A. alliacea* subsp. *bupleuroides* (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo; *A. alliacea* subsp. *plantaginea* (All.) O. Bolòs & Vigo] Gasó (al·liaci). Armeria arenaria. Arméria faux buplèvre. Plantain-leaved thrift. PRAT. 1280-2280 m. cc. VI-VIII.
- Armeria filicaulis* (Boiss.) Boiss. ERROR.
- Armeria marginata* (Levier) Bianchini [*A. majellensis* var. *marginata* Levier]. ERROR.
- Armeria mariae* Sennen ERROR.
- Armeria muelleri* Huet [*A. maritima* subsp. *muelleri* (A. Huet) O. Bolòs & Vigo] Gasó alpi. -. Arméria de Müller. -. PRAT(si). 2020-2700 m. c. VII-VIII.
- Armeria nuriensis* Sennen ERROR.
- Armeria nuriae* Sennen ERROR.
- Armeria stenophylla* Gir. ERROR.

Polygalaceae

- Polygala alpestris* Rchb. subsp. *alpestris* [*P. vulgaris* subsp. *alpestris* (Rchb.) Rouy & Foucaud] PRAT(h)(ac). 1450-2280 m. c. VI-VIII.
- Polygala alpina* (DC.) Steud. Polígala alpina -. Polygala des Alpes. Alpine Milkwort. PRAT(ca). 2000-2800 m. rr. VII.
- Polygala calcarea* F.W. Schultz Herba blava. Lechera amarga. Polygala du calcaire. Chalk milkwort. PRAT(ca). 1500-2120 m. c. V-XI.
- Polygala nicaeensis* W.D.J. Koch subsp. *gerundensis* (O. Bolòs & Vigo) A.M. Hern. [*P. vulgaris* subsp. *gerundensis* (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot; *P. nicaeensis* Risso ex Koch in Röhling subsp. *caesalpini* Bubani ex McNeill] -. -. Polygale de Gérone. -. PRAT(s). 1380 m. rrr. VII.

Polygala rupestris Pourr. DUBT.DET.

Polygala serpyllifolia Hosé. ERROR.

Polygala vulgaris L. Polígala vulgar. -. Polygale commun. -. PRAT(ac). 1240-2100 m. cc. VI-VIII.

Polygonaceae

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub [*F. aubertii* (L. Henry) Holub; *Polygonum aubertii* L.] Vinya del Tibet. -. Renouée de chine. -. MAT(b). 1220-1240 m. rrr. VI. AL/INV.

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve [*Polygonum convolvulus* L.] Fajol bord. -. -. ARV,RUD. 1220-1500 m. c. VI-VII.

Fallopia dumetorum (L.) Holub MAT(b). 1230-1490 m. rr. VI-VII.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. [*Reynoutria japonica* Houtt.] -. Hierba nudosa japonesa. Renouée à feuilles pointues. Japanese knotweed. AQUA(h). 1240 m. rrr. AL/INV/ER.

Koenigia alpina (All.) T.M.Schust. & Reveal [*Polygonum alpinum* L.] Presseguera alpina. Polígono alpino. Renouée des Alpes. Alpine knotweed. HERB(c)(si). 1520-2460 m. c. VI-VIII.

Oxyria digyna (L.) Hill Oxíria. -. Oxyria à deux styles. -. ROC(t). 2020-2700 m. r. VII-VIII.

Persicaria amphibia (L.) Delarbre [*Polygonum amphibium* L.] AQUA(cr). 1260 m. rrr. VII.

Persicaria bistorta (L.) Samp. subsp. *bistorta* [*Polygonum bistorta* L. subsp. *bistorta*] Bistorta. Bistorta. Bistorte. Bistort. PRAT(h),AQUA,HERB(m). 1300-2180 m. cc. VI-VIII.

Persicaria hydropiper (L.) Pebre d'aigua. Persicaria picante. Poivre d'eau. Water pepper. AQUA(j)(cr). 1240-1480 m. rr. VII-VIII.

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre [*Polygonum lapathifolium* L.] Presseguera borda. Renouée à feuilles d'oseille. Curlytop knotweed. AQUA. 1220-1280 m. rr. VII.

Persicaria maculosa Gray [*Polygonum persicaria* L.] Herba presseguera. Persicaria. Persicaire. Willow weed. RUD,ARV. 1220-1780 m. r. VI-VIII.

Persicaria mitis (Schrank) Holub [*Polygonum mite* Schrank] AQUA(j)(cr). 1360 m. rrr. VII.

Persicaria orientalis (L.) Spach [*Polygonum orientale* L.] ARV. 1320 m. rrr. AL/AC.

Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr. [*Polygonum viviparum* L.] Bistorta vivípara. Bistorta vivípara. Renouée vivipare. Viviparous bistort. PRAT,HERB,MAT. 1700-2720 m. c. VI-VII.

Polygonum aviculare L. Passacamins. Centinodia. Renouée des oiseaux. Common knotgrass.. RUD(t). cc. VI-VIII.

Rumex acetosa L. subsp. *acetosa* Xiscoll, agrella. Acedera. Grande oseille. Common sorrel. PRAT(h). 1240-2080 m. cc. V-VII.

Rumex acetosella L. subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb. Agrelleta. Acederilla. Petite oseille des Pyrénées. Sheep's sorrel. PRAT(r). 1240-2480 m. c. V-VII.

Rumex alpinus L. [*R. pseudalpinus* Höfft]. RUD. 1450-1850 m. rrr. EA.

Rumex aquaticus L. ERROR.

Rumex arifolius All. [*R. acetosa* subsp. *amplexicaulis* (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo] Agrella. Ruibarbo bastardo. Rumex à feuilles amplexicaules. Mountain dock. HERB(m). 1780-2200 m. r. VI-VIII.

Rumex conglomeratus Murray Paradella conglomerada. Romaza. Oseille agglomérée. Clustered dock. AQUA(j)(cr),RUD(h). 1240-1540 m. r. VI-VIII.

Rumex crispus L. Paradella cresa. Romaza rizada. Oseille crépue. Curled dock. RUD(h)(p). 1200-2080 m. cc.

Rumex longifolius DC. RUD(h). 1780 m. rrr. VII. DEC. EA.

Rumex obtusifolius L. Llengua de bou. Romaza de hoja grande. Patience sauvage. Broad leaved dock. RUD(h). 1220-2000 m. cc. VII.VIII.

Rumex pulcher L. subsp. *pulcher* Paradella mollerosa. Romaza menor. Oseille gracieuse. Fiddle dock. RUD(t). 1220-1350 m. rr. VII-VIII.

Rumex scutatus L. Badola, agrella. Acedera romana. Oseille ronde. Shield dock. ROC(t). 1220-2050 m. cc. VI-VIII.

Rumex xpratensis Mert. et Koch [*R. obtusifolius* x *crispus*] RUD. 1240 m. rr. VII.

Portulacaceae

Portulaca oleracea L. Verdolaga. Verdolaga común. Pourpier. Green purslane. RUD,ARV. 1230-1250 m. rr. VI.

Primulaceae

- Androsace argentea* (C.F. Gaertn.) Lapeyr. [*A. vandellii* auct., non Chiov.] Andròsace imbricada. -. -. ROC(r)(si). 1700-2200 m. c. VI-VII.
- Androsace halleri* L. subsp. *nuria* Schönsw. & Schneew. [*A. halleri* auct., non L.] Andròsace càrnia. -. -. PRAT. 1980-2750 m. r. VI-VII. EA.
- Androsace villosa* L. subsp. *villosa* Androsace pelosa. -. -. Rock jasmin. PRAT(r). 1600-2640 m. cc. V-VII.
- Androsace vitaliana* (L.) Lapeyr. subsp. *vitaliana* [*Vitaliana primuliflora* Bertol. subsp. *canescens* O. Schwarz] . -. -. ROC(t),PRAT(r). 2080-2780 m. c. VII-VIII.
- Lysimachia arvensis* (L.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis arvensis* L. subsp. *arvensis*] Morró (blau, vermell). Morrón. Mouron des champs. Common pimpernel. RUD. 1200-1540 m. c. V-X.
- Lysimachia foemina* (Mill.) U. Manns & Anderb. [*Anagallis foemina* Mill.; *A. arvensis* subsp. *foemina* (Mill.) Schinz & Thell.] RUD(t). 1240 m. rrr. VI.
- Primula hirsuta* All. (sub *P. viscosa* Vill.). ERROR.
- Primula integrifolia* L. *Primula integrifolia*. *Primula alpina*. Primevère à feuilles entières. Entire-leaved primrose. PRAT(si). 1740-2640 m. cc. V-VII.
- Primula intricata* Gren. & Godr. [*P. elatior* (L.) L. subsp. *intricata* (Gren. & Godr.) Widmer] *Primula gran.* Primavera. Primevère intriquée. Oxlip. PRAT. 1220-2200 m. c. V-VI.
- Primula latifolia* Lapeyr. subsp. *latifolia* *Primula latifolia*. Primavera de hojas grandes. Primevère à larges feuilles. Viscid primrose. ROC(si). 1500-2700 m. cc. VI-VII.
- Primula veris* L. [*P. veris* L. subsp. *columnae* (Ten.) Maire et Petitm.] *Primula vera*. *Primula común*. Primevère de colonna. Cowslip. BOSC(s),HERB(v)(s). cc. V-VI.
- Soldanella alpina* L. subsp. *alpina* Soldanel·la alpina. Soldanella alpina. Soldanelle des alpes. -. AQU(c)(m),PRAT(h). 1520-2500 m. c. V-VII.

Ranunculaceae

- Aconitum anthora* L. Tora groga. Acónito amarillo. Aconit anthore. Yellow monkshood. HERB(m), PRAT(h)(ca). 1620-1840 m. rr. VIII-IX. DEC. EA.
- Aconitum lycoctonum* L. [*A. vulparia* subsp. *ranunculifolium* (Rchb.) M. Laínz; *A. pyrenaicum* subsp. *lamarckii* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] Tora pirinenca. Hierba lobuna. -. -. HERB(m)(c). 1200-2500 m. c. VII-IX.
- Aconitum napellus* L. subsp. *vulgare* Rouy & Foucaud. Tora, tora blava. Acónito azul. Aconit commun. -. HERB(m). 1380-2600 m. ccc. VII-IX.
- Aconitum variegatum* L. ERROR.
- Actaea spicata* L. Herba de sant cristòfol. Yerba de San Cristóbal. -. -. BOSC(h). 1440-1720 m. rr. VI-VII.
- Adonis aestivalis* L. subsp. *aestivalis* Ull de perdiu. -. Adonis d'été. Pheasant's-eye. ARV. 1300 m. rrr. VI.
- Adonis pyrenaica* DC. Adonis pirinenc. -. Adonis des Pyrénées. -. ROC(r)(t). 1800-2500 m. rr. VI-VII.
- Anemonastrum narcissiflorum* (L.) Holub subsp. *narcissiflorum* [*Anemone narcissiflora* L. subsp. *narcissiflora*]. LOC.PROP.
- Anemone nemorosa* L. Búixol. Anémone de los bosques. Anémone des bois. Wood anemone. BOSC(h)(br). 1250-1580 m. rr. IV-VI.
- Anemone ranunculoides* L. Buixol groc. Anémone fausse renoncule. -. BOSC(h)(br). 1250-1400 m. rrr. IV-V.
- Aquilegia alpina* L. ERROR.
- Aquilegia hirsutissima* Timb.-Lagr. ERROR.
- Aquilegia vulgaris* L. Campana, corniol. Aguileña. Ancolie commune. Columbine. BOSC(h),HERB(v)(m). 1200-2140 m. cc. V-VII.
- Caltha palustris* L. Calta. Calta. *Caltha des marais*. -. AQUA(f)(m). 1220-2200 m. cc.V-VI.
- Clematis recta* L. Herba bormera. Flámula de júpiter. Clématite dressée. -. HERB(v)(h),BOSC(br). 1225 m. rrr. VI-VII.
- Clematis vitalba* L. Ridorta, vidalba. Hierba de los pordioseros. Clématite des haies. Evergreen clematis. MAT(b),BOSC. 1200-1500. c. VI-VII.
- Delphinium montanum* DC. [*D. elatum* subsp. *montanum* (DC.) Nyman; *D. elatum* auct.] Esperó de muntanya. -. Dauphinelle des montagnes. -. ROC(t),HERB(m). 1640-2650 m. rr. PROT. AME/NT. DEC. EA.

- Delphinium verdunense* Balb. (*D. peregrinum* subsp. *verdunense* (Balb.) Cout.] ARV,ROC(t). 1220-1280 m. rrr. VII.
- Ficaria verna* Huds. subsp. *verna* [*Ranunculus ficaria* L.] Gatassa. Celidonia menor. Ficaire. Lesser celandine. BOSC(h)(br). 1220-1600 m. rr. IV-V.
- Helleborus foetidus* L. Marxívol. Heléboro común. Ellébore fétide. Bear's foot. BOSC(s). 1200-1880 m. cc. IV.
- Helleborus viridis* L. subsp. *occidentalis* (Reut.) Schiffr. El-lèbor verd. Eléboro verde. -. Green hellebore. BOSC(h)(br). 1240- 2020 m. cc.III-IV.
- Hepatica nobilis* Schreb. [*Anemone hepatica* L.] Herba fetgera, viola de llop. Hepática. Anémone hépatique. Kidneywort. BOSC. 1200-2000 m. cc. IV-VI.
- Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre
- subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman [*Anemone alpina* L. subsp. *apiifolia* (Scop.) O. Bolòs & Vigo] Herba del Vent. Pulsatilla. -. -. PRAT,BOSC(si). 1620-2650 m. cc. VI-VII.
 - subsp. *font-queri* M. Lláinz & P. Monts. [*Anemone alpina* subsp. *font-queri* (M. Lláinz & P. Monts.) O. Bolòs & Vigo] PRAT,BOSC(ca). 1400-2150 m. c. V-VII.
- Pulsatilla vernalis* (L.) Mill. [*Anemone vernalis* L.] Anémone vernal. -. -. -. PRAT(si). 1800-2720 m. c. V-VI.
- Ranunculus aconitifolius* L. [*R. aconitifolius* L. subsp. *aconitifolius*] Ranuncle aconitifoli. Ranúnculo con hojas de acónito. Renoncule à feuilles d'aconit. Aconite-leaved Buttercup. AQUA(h). 1680-2380 m. rrr. VII. EA.
- Ranunculus acris* L. subsp. *acris* ERROR.
- Ranunculus acris* subsp. *despectus* M. Lláinz [*R. acris* subsp. *friesianus* (Jord.) Rouy & Foucaud] Gata rabiosa, botó d'or. Botón de oro de bosque. -. -. 1200-2080 m. cc. V-VII.
- Ranunculus amplexicaulis* L. LOC.PROP.
- Ranunculus angustifolius* DC. [*R. pyrenaicus* subsp. *angustifolius* (DC.) Rouy & Foucaud] AQUA(m). 2000 m. rrr. VII. EA.
- Ranunculus arvensis* L. Ranuncle arvense. -. Renoncule des champs. -. ARV. 1260-1280 m. r. VI-VII.
- Ranunculus bulbosus* L.
- subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Foucaud PRAT(t). 1240 m. rrr.
 - subsp. *bulbifer* (Jordan) Neves ERROR.
 - subsp. *bulbosus* [*R. bulbosus* subsp. *bulbifer* (Jord.) J.B. Neves] Gata rabiosa, ranuncle bulbós. Botón de oro peloso. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup. 1200-2180 m. ccc. V-VIII.
- Ranunculus envalirensis* Grau [*R. auricomus* auct., p.p.] Ranuncle daurat. -. Renoncule à têtes d'or. -. PRAT,BOSC(h). 1600-2450 m. cc. V-VII.
- Ranunculus flammula* L. Mataanyells. -. Renoncule flammette. -. AQUA(f),BOSC(br). 1320-1380 m. rrr. VIII.
- Ranunculus glacialis* L. Ranuncle glacial. Ranúnculo de los glaciares. Renoncule des glaciers. Glacier Buttercup. ROC(r)(t)(h). 2630-2720 m. rrr. VII. DEC. EA.
- Ranunculus gramineus* L. Ranuncle de codina. -. Ranuncle à feuilles de graminée. -. 1720 m. rrr. VI.
- Ranunculus hederaceus* L. -. -. Renoncule à feuilles de lierre. Ivy Buttercup. AQUA(f). 1480-1500 m. rrr. VI-IX. AME/NT. DEC. EA.
- Ranunculus parnassifolius* L. subsp. *parnassifolius* Herba del mal gra. -. Renoncule à feuilles de parnassie. -. 1920-2780 m. c. VI-VII.
- Ranunculus platanifolius* L. [*R. aconitifolius* subsp. *platanifolius* (L.) Rikli] Ranuncle platanifoli. Ranúnculo hoja de platanero. Renoncule à feuilles de platane. -. HERB(m). 1430-1890 m. r. VI-VII.
- Ranunculus pyrenaicus* L. Ranuncle pirinenc. -. Renoncule des pyrénées. -. PRAT(h)(si). 2000-2640 m. cc. V-VII.
- Ranunculus repens* L. - Botó d'or (repent). Botón de oro reptante. Renoncule rampante. Renoncule bulbeuse. Bulbous buttercup. PRAT(t),RUD(t). 1200- 2080 m. ccc. V-VII.
- Ranunculus rusciniensis* Landolt [*R. montanus* subsp. *rusciniensis* (Landolt) O. Bolòs & Font Quer] PRAT(h) (ac). 1350-2200 m. cc VI-VII.
- Ranunculus tuberosus* Lapeyr. [*R. serpens* Schrank subsp. *nemorosus* (DC.) G. López] -. Botón de oro tuberoso. -. Renoncule des bois. -. BOSC(h). 1200-2100 m. cc. VI-VIII.
- Ranunculus ×luizetii* Rouy [*R. parnassifolius* × *pyrenaicus*] 2400-2620 m. rr.
- Thalictrum alpinum* L. Talictr alpí. -. Pigamon des Alpes. -. AQUA(c)(m). 1800-2600 m. r. VI-VII.
- Thalictrum aquilegifolium* L. Talictr aquilegífoli. Talictr de bosque. Colombine panachée. -. HERB(m),PRAT(h). 1280-2040 m. r. VI-VII.

Thalictrum minus L. subsp. *saxatile* Ces. [*T. minus* L.] Gata rabiosa. Talictro de pedregal. -. -. HERB(v),PRATS. 1200-2040 m. cc. VI-VIII.

Thalictrum simplex L. subsp. *simplex* [*T. flavum* subsp. *simplex* (L.) O. Bolòs & Vigo; *T. flavum* subsp. *costae* (Debeaux) Rouy & Foucaud; *T. flavum* subsp. *flavum* sensu O. Bolòs & Vigo] Ruibarbre de pobre. Ruibarbo de los pobres. Pigamon des rives. Common meadow rue. AQUA(j),PRAT(h). 1470 m. rrr. VII. DEC. EA.

Thalictrum tuberosum L. ERROR.

Trollius europaeus L. Cloclou o flor de Sant Pere, rovell d'ou. Calderones. Trolle. -. PRAT(h), HERB(m),AQUA(f). 1220-2230 m. c. VI-VII.

Resedaceae

Reseda glauca L. ROC(t,ca). 1900-2200 m. c. VI-VII.

Reseda lutea L. subsp. *lutea* Gandaia. Gualdón. Réséda jaune. Wild mignonette. RUD(h). 1240-1480 m. r. VI-VIII.

Reseda luteola L. subsp. *luteola* Galda. Gualda. Réséda des teinturiers. Weld. RUD,ROC(t). 1230-1550 m. r. VI-VIII.

Reseda phyteuma L. subsp. *phyteuma* Pebrots de ruc. Gualdilla. Réséda raiponce. Corn mignonette. ARV. 1240-1260 m. rrr. V-VI.

Sesamoides interrupta (Boreau) G. López [*Sesamoides pygmaea* (Scheele) O. Kuntze] Astrocarp. -. -. -. ROC(t),PRAT(r). 2000-2660 m. r.

Rhamnaceae

Atadinus alpinus (L.) Raf. (*Rhamnus alpina* L.) Púdol. -. Nerprun des Alpes. -. ROC(r)(t)(ca).1400-2200 m. c. V-VI.

Atadinus pumilus (Turra) Hauenschild [*Rhamnus pumila* Turra] Púdol menut. -. Nerprun nain. -. 1600-2500 m. rr. V-VII.

Frangula alnus Mill. subsp. *alnus* Fràngula. Arraclán. Bourdaine. -. BOSC(h)(br),MAT(b). 1220-1400 m. rr. V-VI.

Rosaceae

Agrimonia eupatoria L. subsp. *eupatoria* Herba cuquera, herba del mal estrany, agrimònia. -. Aigremoine eupatoire. Agrimony. HERB(v)(c),PRAT. 1200-1600 m. cc. VI-IX.

Agrimonia procera Wallr. HERB(v,h). 1240-1480 m. rr. VI-VII.

Alchemilla Gènere que requereix més estudi a la zona.

Alchemilla alpigena Hegi [*A. alpina* subsp. *asterophylla* sensu O. Bolòs & Vigo; *A. fontqueri* Rothm.; *A. plicatula* auct., p.p.] PRAT(ca). 1480-2400 m. r. VII.

Alchemilla alpina L. Peucrist o peu de rei, alchemil·la alpina. Pie de león alpino. Alchémille des Alpes -. MAT(n),PRAT(si). 1800-2650 m. c. VI-VII.

Alchemilla borderei S.E. Fröhner [*A. pyrenaica* L.] ERROR.

Alchemilla catalaunica Rothm. [*A. alpina* subsp. *catalaunica* (Rothm.) O. Bolòs & Vigo; *A. alpina* auct., p.p.; *A. plicatula* auct., p.p.] PRAT(r),ROC. 1300-2650 m. r. VII-VIII.

Alchemilla colorata Buser [*A. hybrida* subsp. *colorata* (Buser) Gams] PRAT(h)(ac). 1520-2320 m. r. VII-VIII.

Alchemilla connivens Buser [*A. vulgaris* subsp. *connivens* (Buser) E.G. Camus] PRAT. 1480-2230 m. r. VI-VIII.

Alchemilla coriacea Buser [*A. vulgaris* subsp. *coriacea* (Buser) E.G. Camus] Pota de lleó. Pie de león coriáceo. -. -. AQUA(f). 1500-2100. c. VI-VII.

Alchemilla demissa Buser [*A. vulgaris* subsp. *demissa* (Buser) O. Bolòs & Vigo] DUBT.DET.

Alchemilla fallax Buser PRAT(r)(h). 2080-2480 m. rrr. VII.

Alchemilla fissa Günther & Schummel [*A. fissa* subsp. *pyrenaica* (Dufour) O. Bolòs & Vigo; *A. pyrenaica* Rothm.] AQUA(c). 2150-2750 m. rr. VIII-IX.

Alchemilla flabellata Buser [*A. hybrida* subsp. *flabellata* (Buser) Gams] Pota de lleó. -. Alchémille en éventail. -. PRAT,MAT. 1200-2500 m. cc. VI-VIII.

- Alchemilla glabra* Neygenf. [*A. vulgaris* subsp. *glabra* (Neygenf.) O. Bolòs & Vigo] PRAT(ac). rrr.
- Alchemilla glaucescens* Wallr. [*A. hybrida* subsp. *glaucescens* (Wallr.) O. Bolòs & Vigo] PRAT. 1280 m. rrr. VII.
- Alchemilla lapeyrousii* Buser [*A. hybrida* subsp. *lapeyrousii* (Buser) P. Fourn.; *A. hybrida* (L.) L., nom. ambig.] DUBT.DET.
- Alchemilla lineata* Buser [*A. vulgaris* subsp. *lineata* (Buser) Gams] DUBT.DET.
- Alchemilla saxatilis* Buser [*A. alpina* subsp. *saxatilis* (Buser) E.G. Camus; *A. alpina* auct.] Herba de plata. -. Alchémille des rochers. -. ROC(r),PRAT,MAT(n). 1200-2700 m. cc. VI-VIII.
- Alchemilla straminea* Buser [*A. vulgaris* subsp. *straminea* (Buser) O. Bolòs & Vigo] PRAT(h),AQUA(f). 1780-1990 m. rrr. EA.
- Alchemilla subsericea* Reut. ERROR.
- Alchemilla tenerrima* S.E. Fröhner [*A. subsericea* auct., non Reut.] -. -. Alchémille délicate. -. PRAT(r). 2850 m. rrr. EA.
- Alchemilla transiens* (Buser) Buser [*A. alpina* subsp. *transiens* (Buser) O. Bolòs & Vigo] PRAT(ac). 2200 m. rrr. EA.
- Alchemilla xanthochlora* Rothm. [*A. vulgaris* subsp. *xanthochlora* (Rothm.) O. Bolòs & Vigo, *A. vulgaris* auct.] PRAT(h). 1250-2000 m. c. V-VIII.
- Amelanchier ovalis* Medik. ROC(r)(ca). 1520 m. rrr. IV-VI.
- Aphanes arvensis* L. -. -. Alchémille des champs. -. PRAT(r),ARV. 1020-1040 m. rr. V.
- Aria edulis* (Willd.) M. Roem. [*Sorbus aria* (L.) Crantz] Moixera. Mostajo. Alisier blanc. -. BOSC(s). 1200-2050 m. V-VI. cc.
- Aruncus dioicus* (Walter) Fernald HERB(v). 1500 m. rrr. DEC. EA.
- Cotoneaster integerrimus* Medik. Cornera. Cotonéaster commun. -. MAT(bg),PRAT. 1450-2080 m. c. VI.
- Crataegus monogyna* Jacq. Arç blanc. Majuelo. Aubépine à un style. Hawthorn. MAT(b),BOSC. 200-1760 m. ccc. V-VI.
- Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb. [*Potentilla fruticosa* L.] Potentil·la fruticosa. -. Potentille arbustive. -. 1780-2180 m. AQUA(f)(m). r. VI-VIII. PROT. AME/NT. DEC. EA.
- Dryas octopetala* L. subsp. *octopetala* Drias. -. Dryade à huit pétales. -. PRAT,MAT(ca). 2000-2750 m. c. VI-VII.
- Drymocallis rupestris* (L.) Soják [*Potentilla rupestris* L.] ROC. 2050 m. rrr. EA.
- Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. Reina dels prats. Reina de los prados. Reine-des-prés. Meadow sweet. HERB(h)(m). 1200-1680 m. cc. VII-VIII.
- Filipendula vulgaris* Moench Filipéndula. Filipéndula. Filipendule commune. -. PRAT(h). 1640 m. rrr. VII.
- Fragaria vesca* L. Maduixera. Fresa silvestre. Fraisier des bois. Wild strawberry. HERB(v)(cl). 1200-2000 m. ccc. V-VII.
- Geum montanum* L. Gèum muntanyenc. -. Benoîte des montagnes. -. PRAT(ac). 2000-2600 m. r. VII-VIII.
- Geum pyrenaicum* Mill. ERROR.
- Geum rivale* L. Gèum de ribera. -. Benoîte des ruisseaux. -. 1780-1980 m. rr. VII-VIII.
- Geum urbanum* L. Herba de Sant Benet. Cariofilada común. Benoîte commune. Herb bennet. RUD(h)(he),BOSC(h)(br). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.
- Malus sylvestris* (L.) Mill. [*Pyrus malus* L.] Pomer. Manzano. Pommier des bois. Crab apple. MAT(b). 1200-1460 m. r. V-VI.
- Potentilla alchimilloides* Lapeyr. DUBT.LOC.
- Potentilla argentea* L. Agram de porc, Argentina, Maduixera borda, Potentil·la argentina. Cincoenrama recortada. Potentille argentée. -. PRAT(r). 1260-1850 m. r. V-VIII.
- Potentilla aurea* L. subsp. *aurea*. ERROR.
- Potentilla brauniana* Hoppe [*P. brauneana* Hoppe] 2400 m. rrr. EA.
- Potentilla cinerea* Vill. [*P. arenaria* Borkh.; incl. *P. cinerea* subsp. *velutina* (Lehm.) Nyman] ERROR.
- Potentilla crantzii* (Crantz) Fritsch Potentil·la estipular. Cincoenrama alpina. -. -. PRAT(s). 1600-2700 m. cc. VI-VIII.
- Potentilla erecta* (L.) Raeusch. Tormentil·la. Siete en rama. Potentille tormentille. Common tormentil. PRAT,MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. V-VIII.
- Potentilla frigida* Vill. PRAT(r). 2900 m. rrr. EA.
- Potentilla micrantha* DC. Fragassa de flor petita. -. Potentille à petites fleurs. -. MAT(g),HERB(v). 1260-1880 m. c. V-VII.
- Potentilla nivalis* Lapeyr. subsp. *nivalis* Potentil·la nival. Cincoenrama nival. Potentille des neiges. -. ROC(r)(t). 2220-2680 m. c. VII-IX.

Potentilla pyrenaica DC. PRAT(ac). 1700-2220 m. c. VII-VIII.

Potentilla recta L. Potentil·la recta. Cincoenrama erguida. Potentille dressée. Roughfruit cinquefoil. PRAT(s)(r). 1240-1440 m. rrr. VI-VII.

Potentilla reptans L. Gram negre. Cinco en rama. Potentille rampante. Creeping cinquefoil. RUD(t)(h). 1200-2000 m. cc. VI-VIII.

Potentilla sterilis (L.) Garcke Fragassa de bosc. Cincoenrama fresal. Potentille stérile. -. BOSC(h). 1300-1400 m. r. IV-V.

Potentilla verna L. [*P. neumanniana* Rchb.] Flors de la fam. Cincoenrama verna. Potentille de Neumann. -. PRAT(s). 1200-2000 m. cc.

Poterium sanguisorba L. subsp. *sanguisorba* [*Sanguisorba minor* Scop. subsp. *minor*] Pimpinella. Pimpinela menor. Petite pimprenelle. -. PRAT. 1200-2000 m. ccc. VI-VIII.

Prunus avium (L.) L. Cirer, cirerer. Cerezo. -. Wild cherry BOSC(h). 1200-1500 m. cc. IV-V.

Prunus domestica L. Pruner. Ciruelo. Prunier. Common plum. MAT(b). 1240-1450 m. r. IV-V.

Prunus spinosa L. Aranyoner. Espino negro. Épine noire. Blackthorn. MAT(b). 1200-1500 m. cc. IV-V.

Rosa Gènere que requereix més estudi a la zona.

Rosa agrestis Savi MAT(b). 900-1600 m. c. VI-VII.

Rosa andegavensis Bastard [*R. canina* subsp. *andegavensis* (Bastard) Nyman] MAT(b), 1290 m. rrr.

Rosa canina L. [*R. canina* L. subsp. *canina*] Roser de pastor, roser caní. Rosal silvestre. Églantier des chiens. Dog rose MAT(b). 1200-188 m. c. VI-VIII.

Rosa montana Chaix ERROR.

Rosa pendulina L. [*R. alpina* L.] Roser alpi. Rosal alpino. Églantier des alpes. -. MAT(n),BOSC(p),HERB(m). 1500-2200 m. cc. VI-VII.

Rosa rubiginosa L. MAT(b). 1340-2000 m. cc. VI-VIII

Rosa spinosissima L. [*R. pimpinellifolia* L.] MAT(b). 1600-2100 m. rr. VII.

Rosa stylosa Desv. [*R. canina* subsp. *stylosa* (Desv.) Masclans] MAT(b). 1240-1520 m. r. VI-VII.

Rosa tomentosa Sm. MAT(b). 1300-1525 m. rrr.

Rosa villosa L. [*R. villosa* subsp. *mollis* (Sm.) Hook. fil.; *R. mollis* Sm.] MAT(b). 1450 m. rrr. VII.

Rosa vosagiaca N.H.F. Desp. MAT(b). 1380-1760 m. r. VII-VIII.

Rubus Gènere que requereix localment més estudi.

Rubus caesius L. Romeguero. Zarzamora reptante. Ronce bleu. Dewberry. BOSC(br). 1200-1970 m. cc. V-VII.

“*Rubus godronii* Lecoq. & Lamotte subsp. *amplistipulus* Sudre” MAT(b),BOSC(h). 1220-1600 m. c. VI-VII. DUBT.DET.

Rubus hirtus Waldst. & Kit. [*R. ser. Glandulosi* sensu Bolòs & Vigo] Esbarzer glandulós. -. -. MAT(b), BOSC(h). 1280-1480 m. rrr. VII-VIII.

Rubus idaeus L. Jordonera, gerdera. Frambueso. Framboisier. Raspberry. MAT(b),HERB(c). 1200-2200 m. cc. V-VII.

Rubus saxatilis L. BOSC(ca). 1725. rrr. VII-VIII. EA.

Rubus ulmifolius Schott [*R. discolor* auct., non Weihe et Nees] Romeguera, esbarzer. Zarzamora. Ronce à feuilles d'orme. Bramble. MAT(b). 1200-1575 m. cc. VI-VIII.

Sanguisorba officinalis L. Pimpinella major. Sanguisorba mayor. Grande pimprenelle. -. PRAT(h). 1240-2100 m. c. VII-VIII.

Sibbaldia procumbens L. Sibàldia. -. Sibbaldie couchée. -. AQUA(c). 2100-2740 m. rr. VII-VIII.

Sorbus aucuparia L. subsp. *aucuparia* Moixera de guilla. -. Serbal de cazadores. Sorbier des oiseleurs. -. BOSC(p). 1280-2020 m. c. V-VII.

Rubiaceae

Asperula arvensis L. ARV. 1900 m. rrr. AL/AC.

Asperula cynanchica L. subsp. *cynanchica* [incl. *A. cynanchica* subsp. *brachysiphon* (Lange) O. Bolos & Vigo] ROC(r),PRAT(r). 1400-1800 m. r. VI-VII.

- Asperula cynanchica* subsp. *pyrenaica* (L.) Nyman [*A. pyrenaica* L.] ROC(r),PRAT(r). 1700-2200 m. rrr. VII.
Cruciata glabra (L.) Ehrend. [*Galium vernum* Scop.] Te de bosc. Cruciada glabra. Croisette glabre. -. PRAT, ROC,BOSC(h). 1200-2700 m.cc. V-VII.
Cruciata laevipes Opiz [*Galium cruciata* (L.) Scop.] Creuera. Cruzada. Croisette commune. Crosswort. RUD. 1220-2020 m. c. V-VI.
Galium album Mill. [*G. mollugo* subsp. *erectum* Syme] Espunyidera blanca. -. Caille-lait commun. -. PRAT(h). 1200-1480 m. r. VI-VIII.
Galium aparine L. Rèvola, apegalós. Amor de hortelano. Gaillet accrochant. Goosegrass. ARV,RUD. 1200-2000 m. cc. V-VIII.
Galium cometerhizon Lapeyr. Espunyidella de pedrusca. -. Gaillet à racines chevelues. -. ROC(t). 2200-2870 m. c. VI-VIII.
Galium estebanii Sennen [*G. pumilum* Murray subsp. *pinetorum* (Ehrend.) Vigo; *G. pinetorum* Ehrend.] Espunyidella prima. -. -. PRAT,MAT,BOSC. 1200-1900 m. cc. VI-VIII.
Galium lucidum All. subsp. *lucidum* Espunyidella blanca. -. -. HERB(v),PRAT(r). 1200-1760 m. c. VI-VIII.
Galium marchandii Roem. & Schult. [*G. pumilum* Murray subsp. *marchandii* (Roem. & Schult.) O. Bolos & Vigo] PRAT,BOSC,MAT,ROC(t). 1800-2680 m. c. VI-VIII.
Galium maritimum L. Espunyidella peluda. -. -. HERB(v). 1200-1810 m. cc. VI-VIII.
Galium mollugo L. - PRAT(h)(d). 1300 m. rrr.
Galium odoratum (L.) Scop. [*Asperula odorata* L.] Espunyidella d'olor. -. Aspérule odorante. -. BOSC(h). 1700 m. rrr. VI. DEC. EA.
Galium palustre L. Espunyidella palustre. Galio de río. Gaillet des marais. -. AQUA. 1340-1720 m. r. VI-VIII.
Galium pusillum L. ERROR.
Galium pyrenaicum Gouan - Espunyidella pirinenca. -. Gaillet des pyrénées. -. PRAT, ROC(ca). 1750-2720 m. c. VI-VIII.
Galium saxatile L. ERROR.
Galium saxosum (Chaix) Breistr. ERROR.
Galium scabridum Jord. ERROR.
Galium spurium L. [*G. aparine* subsp. *spurium* (L.) Hartm.] ARV,RUD(h). 1450 m. rrr. VI.
Galium uliginosum L. PRAT,RUD(t)(h). 1450 m. rrr. VII.
Galium verum L. subsp. *verum* Espunyidella groga. Cuajaleche. Gaillet jaune. Lady's bedstraw. PRAT(h). 1200-2290 m. cc. VI-IX.
Sherardia arvensis L. Rèvola borda. Azulilla. Shérardie des champs. -. PRAT(r),ROC(m). 1200 m.rr. VI.

Salicaceae

- Populus ×canadensis* Moench [*P. deltoides* × *P. nigra*] Aure poll, pollangre, pollancre. Álamo negro. Peuplier noir. Black poplar. BOSC(br). 1260-1620 m. cc. AL/INV.
Populus nigra L. Pollancre. Alamo negro. Peuplier noir. Black poplar. BOSC(br). 1200-1550 m. rr. III-IV. DEC. EA.
Populus tremula L. subsp. *tremula* Trèmol. Álamo temblón. Peuplier tremble. Aspen poplar. BOSC(h), HERB(c). 1240-1980 m. cc. IV-V.
Salix atrocinerea Brot. (*S. cinerea* subsp. *oleifolia* Macgreith) Gatsaule, gatell. Salguera. Saule roux-cendré. Grey willow. BOSC(br). 1260-1700 m. c. IV-V.
Salix bicolor Willd. [*S. phylicifolia* L. subsp. *bicolor* (Willd.) O. Bolòs & Vigo] Salze bicolor. Saule bicolore. -. AQUA(t). 2080 m. rrr. EA.
Salix caprea L. Gatsaule. Sauce cabruno. Saule des chèvres. Goat willow. BOSC(h),HERB(c),ROC(t).1200-2000 m c. III-IV.
Salix elaeagnos Scop. Sarga. Sargatillo. Saule à feuilles étroites. Elaeagnus Willow. BOSC(br),AQUA. 1200-1600 m. r. IV-V.
Salix herbacea L. Salenca herbàcia. -. Saule herbacé. -. AQUA(c). 2100-2680 m. r. VI-VII.
Salix lapponum L. [*S. lapponum* subsp. *ceretana* P. Monts.; *S. ceretana* (P. Monts.) Chmelar] Caldria confirmar si es tracta de la subsp. *ceretana* P. Mont. LOC.PROP.
Salix myrsinifolia Salisb. DUBT.DET.

- Salix purpurea* L. Saulic. Sauce rubión. Saule pourpre. -. BOSC(br),AQUA. 1220-1640 m. c. IV-V.
Salix pyrenaica Gouan Salenca dels Pirineus. -. Saule des pyrénées. -. AQUA(c)(f)(t) (ca). 2040-2200 m. rrr. VI-VII. EA.
Salix reticulata L. AQUA(c)(ca). 2300 m. rrr. EA.
Salix retusa L. Salenca retusa. -. Saule à feuilles rétuses. -. AQUA(c). 2000-1680 m. cc. VI-VII.
Salix triandra L. Salze triandre. -. Osier brun. -. BOSC(br). 1480 m. rrr. IV.
Salix ×fragilis L. [*S. alba* × *S. euxina* I.V. Belyaeva; *S. x rubens* Schrank] Salze blanc. Sauce. Saule fragile. Crack willow. BOSC(br). 1220-1680 m. r. IV-V.
Salix ×quercifolia Sennen [*S. caprea* × *S. cinerea* var. *atrocinerea*] BOSC(br). 1450 m. rrr.
Salix ×schinziana Braun-Blanq. [*S. herbacea* × *S. pyrenaica*] AQUA(c). 2110-2400 m. rrr.

Santalaceae

- Thesium alpinum* L. subsp. *alpinum* Tèsium alpí. Mimbrera roja. Thésium des alpes. -. PRAT(h),ROC(r) (h). 1530-2120 m. r. VI-VII
Thesium humifusum DC. [*T. divaricatum* Jan et Mert. et Koch in Röhling] Tèsium divaricat. Tesio común. Thésium couché. -. PRAT,ROC(s). 1400-1720 m. VI-VII.
Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. *pyrenaicum* DUBT.DET. EA.
Viscum album L. subsp. *abietis* (Wiesb.) Janch. Vesc. Muérdago. -. -. BOSC sobre *Abies alba*. 1700 m. rrr. EA.
Viscum album L. subsp. *album* Vesc. Muérdago. -. -. BOSC(h) sobre *Fraxinus excelsior*. 1340 m. rrr. VII.

Sapindaceae

- Acer campestre* L. Auró blanc. Arce común. Érable champêtre. Hedge maple. BOSC(h). 1200-1560 m. c. IV-V.
Acer negundo L. Negund. Negund. Arce negundo. Érable negundo. -. BOSC(br). 1200-1420 m. rrr. IV-V. AL/INV.
Acer opalus Mill. subsp. *opalus* Blada. Acirón. Érable à deuilles d'obier. Italian mapple. BOSC(s). 1340-1600 m. rrr. IV-V.
Acer platanoides L. Erable. Arce real. -. -. BOSC(br). 1200-1440 m. rr. IV.
Acer pseudoplatanus L. Fal plàtan. Arce sicómoro. Érable sycomore. -. BOSC(br). 1220 m. rrr. V.

Saxifragaceae

- Chrysosplenium oppositifolium* L. Crisospleni. Hepática dorada. Dorine à feuilles opposées. Opposite-leaved golden-saxifrage. AQUA(c). 1200-1840 m. c. IV-V.
Micranthes clusii (Gouan) Fern. Prieto, V. Vázquez, Vallines & Cires [*Saxifraga clusii* Gouan] ROC(r)(h). 2480-2700 m. rrr. VIII.
Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano subsp. *stellaris* [*Saxifraga stellaris* L.] Saxifraga estelada. -. Saxifrage d'engler. -. AQUA(f)(m). 1600-2550 m. c. VI-VIII.
Saxifraga adscendens L. ERROR.
Saxifraga aizoides L. Saxifraga groga. Saxífraga amarilla. Saxifrage faux orpin. -. AQUA(f),ROC(h). 1200-2760 m. c. VI-VIII.
Saxifraga androsacea L. AQUA(c)(f). 2200-2700 m. rr. VII-VIII.
Saxifraga aquatica Lapeyr. Enciam de font. -. Saxifrage aquatique. -. AQUA(f). 1400-2700 m. c. V-VIII.
Saxifraga aspera L. ROC(r),PRAT(r)(ac). 1800-2200 m. rrr. VII-VIII.
Saxifraga bryoides L. Saxífraga brioiide. -. Saxifrage d'auvergne. -. ROC(r)(t). 2100-2900 m. cc. VII-VIII.
Saxifraga caesia L. ERROR.
Saxifraga callosa Sm. ERROR.
Saxifraga cotyledon L. ERROR.
Saxifraga cuneifolia L. ERROR.
Saxifraga exarata Vill. ERROR.
Saxifraga geranioides L. Herba de les setsagnies, saxífraga geranioide. -. Saxifrage faux géranium. -. ROC(t),MAT(n)(si). 1900-2800 m. cc. VI-VIII.
Saxifraga granulata L. subsp. *granulata* Saxífraga granulosa. Saxífraga común. Saxifrage granulée. -. HERB(v). 1200-2300 m. cc. V-VII.

Saxifraga hirsuta L. subsp. *hirsuta* ERROR.

Saxifraga intricata Lapeyr. ERROR.

Saxifraga longifolia Lapeyr. ROC(r)(ca). 1500-1750 m. rrr

Saxifraga media Gouan Saxifraga mitjana. -. Saxifrage intermédiaire. -. ROC(r)(ca). 1125-2650 m. r. VI-VII.

Saxifraga moschata Wulfen [*S. moschata* subsp. *fastigiata* (Luizet) P. Fourn.] Saxifraga moscada. -. Saxifrage musquée. -. ROC(r)(t),PRAT(r). 2000-2875 m. cc. VII-VIII.

Saxifraga muscoides All. (sub. *S. planifolia* Lap.). ERROR.

Saxifraga oppositifolia L. subsp. *oppositifolia* Saxifraga opositifolia. Saxifraga ártica. Saxifrage à feuilles opposées. -. ROC(t)(ca). 1800-2800 m. cc. V-VII.

Saxifraga paniculata Mill. subsp. *paniculata* Corona de rei, saxifraga paniculada. -. Saxifrage paniculée. -. ROC(r)(ca). 1200-2720 m. cc. VI-VIII.

Saxifraga pentadactylis Lapeyr. subsp. *pentadactylis* Saxifraga de cinc dits. -. -. -. ROC(si)(r). 2600-2850 m. r. VII-VIII.

Saxifraga petraea L. ERROR.

Saxifraga praetermissa D.A. Webb Saxifraga preterida. -. -. -. ROC(t)(h),AQUA(c)(f). 2200-2700 m. rr. VIII-IX.

Saxifraga pubescens Pourr.

- subsp. *iratiana* (F.W. Schultz) Engl. & Irmsch. ERROR.

- subsp. *pubescens* Saxifraga pubescent. -. Saxifrage pubescente. -. ROC(r)(t)(si). 1550-2850 m. cc. VI-VII.

Saxifraga rotundifolia L. ERROR.

Saxifraga tridactylites L. ERROR.

Saxifraga xcapitata Lapeyr. [*S. aquatica* x *S. praetermissa*] AQUA(f). 2000-2500 m. rr.

Saxifraga xgautieri Rouy [*S. geranioides* x *S. media*] ROC. 2720 m. rrr.

Saxifraga xjeanpertii Luizet [*S. moschata* x *S. pubescens* subsp. *pubescens*] ROC. 2100-2800 m. rr.

Saxifraga xlecomtei Luizet & Soulié [*S. geranioides* x *S. pentadactylis*] ROC(t). 2900 m. rrr.

Saxifraga xmartyii Luizet & Soulié [*S. moschata* x *S. pentadactylis*] ROC(r)(si). 2800-2900 m. rr.

Saxifraga x nuriemis Sen. ERROR.

Saxifraga x sudrei Luizet et Soulié [*S. moschata* x *nervosa*] ERROR.

Saxifraga xverguini Luizet & Soulié [*S. pubescens* subsp. *pubescens* x *S. pentadactylis*] ROC(r). 2100 m. rrr.

Scrophulariaceae

Buddleja davidii Franch. Budlèia. Lila de verano. Buddléia de david. -. ROC. 1200-1960 m. cc. VII-IX. AL/INV.

Scrophularia alpestris Benth. Escrofulària alpestre. Escrofularia alpina. Scrofulaire des alpes. BOSC(br)(h),HERB(m). 1200-2000 m. c. VI-VIII.

Scrophularia auriculata subsp. *valentina* (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. [*S. auriculata* subsp. *pseudoauriculata* (Sennen) O. Bolòs & Vigo] Escrofulària aquàtica. Escrofularia acuàtica. Scrofulaire aquatique. Water figwort. AQUA(j)(cr). 1240-1280 m. rrr. VI. M. Marcer (2020).

Scrophularia crithmifolia Boiss. [*S. canina* subsp. *crithmifolia* (Boiss.) O. Bolòs & Vigo] Escrofulària de ca. Escrofularia de muntanya. Scrofulaire à feuilles de criste marine. -. ROC(t). 1240-1680 m. c. V-VII.

Scrophularia nodosa L. Escrofulària nodosa. Hierba de San Pedro. Scrofulaire noueuse. Figwort. BOSC(h),HERB(v)(c). 1200-1560 m. c. VII-IX.

Verbascum blattaria L. - HERB(v). 1240 m. rrr.

Verbascum boerhavii L. RUD. 1250-2020 m. c. VI-VIII.

Verbascum chaixii Vill. Cua de guilla, trepó. -. -. -. HERB(v),MAT(g),PRAT. 1340 m. rrr. VII.

Verbascum lychnitis L. Cua de guilla, trepó candeler. Gordolobo hembra. Molène lychnite. -. HERB(v)(c). 1200-2200 m. cc. VI-IX.

Verbascum macrurum Ten. ERROR.

Verbascum phlomoides L. ERROR.

Verbascum pulverulentum Vill. Cua de guilla, trepó pulverulent. Gordolobo de muntanya. Molène floconneuse. -. RUD(h). 1240-2000 m. r. VI-VIII.

Verbascum thapsus L. [*V. thapsus* subsp. *crassifolium* (Lam.) Murb; *V. thapsus* subsp. *montanum* (Schrad.) Bonnier & Layens] Cua de guilla, trepó joanal. Gordolobo. Molène des montagnes. Aaron's rod. RUD(h). 1200-2180 m. c. VII-IX.

Verbascum xgonzaloi Sennen [*V. thapsus* × *lychnitis* var. *nuriense*]. ERROR.

Verbascum xregelianum Wirtg. [*V. lychnitis* × *V. pulverulentum*] HERB(v). 1280 m. rr. VII.

Verbascum xthaspi L. [*V. xspurium* W.D.J. Koch; *V. lychnitis* × *V. thapsus*] HERB(v). 1300 m. rr. VII.

Solanaceae

Atropa belladonna L. Belladona. Belladona. Belladone. Deadly nightshade. RUD(t). 1250 m. rrr. VII. EA.

Datura stramonium L. Herba talpera. Estramonio. Datura officinal. Thorn apple. ARV,RUD. 1260 m. rrr. AL/ESP.

Hyoscyamus niger L. Herba queixalera. Beleño negro. Jusquiame noire. Henbane. RUD(s). 1540 m. rrr. VI. EA.

Solanum dulcamara L. Dolçamara. Dulcamara. Morelle douce-amère. Bittersweet. BOSC(br), HERB(h)(c). 1220-1420 m. rr. VI-VII.

Solanum lycopersicum L. Tomaquera. Tomatera. -. -. RUD. 1220 m. rrr. VI. AL/AC.

Solanum nigrum L. Morella. Hierba mora. Morelle noire. Black nightshade. ARV,RUD(h). 1200-1600 m. rr. VI-IX.

Solanum tuberosum L. RUD. 1220 m. rrr. VI. AL/AC.

Solanum villosum Mill. [*S. nigrum* subsp. *miniatum* Willd.] RUD. 1460 m. rrr. VIII.

Thymelaceae

Daphne cneorum L. subsp. *cneorum* Dafne pirinenc. -. -. -. PRAT(ca). 2300 m. rrr. VI.

Daphne laureola L. subsp. *laureola* Senet, senet bord, lloreret. Lauréola. Daphné lauréole. -. BOSC(s). 1200-1540 m. c. IV-V.

Daphne mezereum L. subsp. *mezereum* Senet, tintorell. Lauréola hembra. Daphné bois-gentil. Dwarf laurel. Spurge daphne. BOSC(h),HERB(m). 1400-2350 m. cc. V-VII.

Thymelaea dioica (Gouan) All. Bufalaga de roca. -. Passerine dioïque. -. ROC(r)(ca). 1370-2100 m. r. V-VII.

Thymelaea sanamunda All. ERROR.

Thymelaea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. *nivalis* (Ramond) Nyman LOC.PROP.

Ulmaceae

Ulmus glabra Huds. Om, oma. -. Orme de montagne. -. BOSC(h)(br). 1200-1460 m. r. IV.

Ulmus minor Mill. Om. Olmo. Petit orme. English elm. BOSC(h)(br). 1200-1480 m. rr. III-IV.

Urticaceae

Parietaria judaica L. [*P. officinalis* L. susp. *judaica* (L.) Béguinot] Blet de paret, morella roquera. Parietaria. Pariétaire couchée. Pellitory of the wall. RUD,ROC(m). 1200-1460 m. rr.

Urtica dioica L. subsp. *dioica* Otriga, ortiga gran. Ortiga mayor. Grande ortie. Stinging nettle. RUD(h). 1200-2200 m. ccc. VI-VIII.

Urtica urens L. Ortiga. -. -. -. ARV,RUD. 1240-1450 m. rr. VI.

Valerianaceae

Centranthus ruber (L.) DC. subsp. *ruber* Herba de Sant Jordi. Centranto. -. -. ROC(m),HERB(v). 1220 1560 m. c. VI. AL/ESP.

Valeriana apula Pourr. [*V. globulariifolia* Ramond ex DC. in Lam. et DC.] Valeriana globularifolia. -. Valériane à feuilles de globulaire. -. ROC(r)(ca). 1780-2650 m. c. VI-VIII.

Valeriana montana L. Valeriana muntanyenca. -. Valériane des montagnes. -. ROC(t)(r)(ca). 1200-2010 m. c. VI-VII.

- Valeriana officinalis* L. Valeriana. Valeriana. Valériane officinale. Valerian. HERB(v)(h),PRAT. rr. VI-VII.
- Valeriana pyrenaica* L. Valeriana pirinenca. -. -. Valériane des Pyrénées. -. HERB(m),AQUA. 1270-1700 m. rr. VII-VIII.
- Valeriana stolonifera* Czern. subsp. *angustifolia* Soo [*V. wallrothii* Kreyer; *V. officinalis* subsp. *collina* (Wallr.) Nyman; *V. officinalis* subsp. *tenuifolia* (Vahl: Schübl. & G. Martens.) Valeriana. -. -. -. HERB(v),AQUA(he). cc.
- Valeriana tripteris* L. subsp. *tripsteris* [*V. montana* subsp. *tripsteris* (L.) Rouy] Valeriana trisecta. -. Valériane à trois folioles. -. ROC(r)(t)(si). 1340-2320 m. c. VI-VII.
- Valerianella dentata* (L.) Pollich [incl. *V. ramosa* Bast.] ROC(m). 1250 m. rrr. VI.

Verbenaceae

- Verbena officinalis* L. Berbena. Verbena. Verveine officinale. Vervain. RUD(t). 1220-2000 m. c. VI-IX.

Viburnaceae

- Sambucus nigra* L. subsp. *nigra* Sabuc, saüc. Saúco. Sureau noir. Common elder. BOSC. 1200-1600 m. ccc. V-VI.
- Sambucus racemosa* L. Sabuc, saüc racemós. Saúco de montaña. Sureau de montagne. Red elder. BOSC(h). 1300-2000 m. V-VI.
- Sambucus ebulus* L. . Èvol, saüc pudent. Saúco menor. Hièble. Dwarf elder. 1200-1680 m. RUD. cc. V-VII.
- Viburnum lantana* L. Cartellatge, tortellatge. Lantana. Lantane,. Wayfaring tree. BOSC(s). 1200-1660 m. c. V-VII.

Violaceae

- Viola alba* Besser subsp. *denhardtii* (Ten.) W. Becker Viola, viola boscana. Violeta. Violette blanche. -. BOSC(s),HERB(v). 1240-1550 m. c. IV.
- Viola arvensis* Murray [*V. tricolor* subsp. *arvensis* (Murray) Gaudin] Pensament de camp. Pensamiento. Pensée des champs. Heartsease. ARV,RUD. 1200-2450 m. c. IV-V.
- Viola biflora* L. subsp. *biflora* Viola groga. -. Violette jaune. -. HERB(m),MAT(n). 1820-2400 m. c. VI-VII.
- Viola canina* L. [*V. canina* subsp. *montana* (L.) Hartm.; *V. canina* subsp. *silvensis* (Font Quer) O. Bolòs & Vigo] Viola, viola canina. Violeta de robledal. Violette des chiens . -. PRAT,MAT(ac). 1360-2020 m. c. V-VI.
- Viola diversifolia* (Ging.) W. Becker [*V. cenisia* L. subsp. *lapeyrousiana* Rouy & Foucaud] Pensament alpí. -. Pensée de Lapeyrouse. -. ROC(t). 2100-2760 m. r. VII-VIII.
- Viola hirta* L. Viola, viola hirta. -. Violette hérissée. -. PRAT(s). 1260-1540 m. r. IV-V.
- Viola mirabilis* L. Viola de fulla gran. -. Violette admirable. -. BOSC(h). rrr. 1380 m. IV.
- Viola palustris* L. subsp. *palustris* Viola, viola palustre. Violeta palustre. Violette des marais. -. AQUA(m)(f). 1700-1880 m. rr. IV-V.
- Viola pyrenaica* DC. PRAT. 1300 m. rrr. EA.
- Viola reichenbachiana* Jord. [*V. sylvestris* Lam., nom. illeg.] Viola, viola silvestre. Violeta elevada. -. -. 1260-2100 m. cc. IV-VI.
- Viola riviniana* Rchb. [*V. sylvestris* Lam. subsp. *riviniana* (Rchb.) Tourlet] Viola, viola silvestre. -. Violette de rivinus. -. 130-2120 m. cc. V-VI.
- Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *rupestris* Viola, viola rupestre. Violeta de roca. -. -. PRAT(s). 1280-2020 m. r. V-VI.
- Viola tricolor* L. subsp. *subalpina* Gaudin Pensament subalpí. Pensamiento. Pensée subalpine. -. RUD,PRAT,MAT. 1460-2460 m. cc. V-VII.

MONOCOTILEDÒNIES

Amaryllidaceae

- Allium oleraceum* L. All de serp. Ajo de cigüena. Ail des jardins. Fied garlic. PRAT,ROC(m)(s). 1220-1620 m. rr. VII-VIII.
- Allium pyrenaicum* Costa & Vayreda Error.
- Allium schoenoprasum* L. All junciforme. Cebollino. Ciboulette. Chives. AQUA(f)(m). 1600-2250 m. VI-VIII. c.
- Allium senescens* L. subsp. *montanum* (F.W. Schmidt) Holub [*A. lusitanicum* Lam.; *A. fallax* Schult. & Schult.f.; *Allium fallax* Don.] -. -. Ail. -. PRAT(r). 1560-1880 m. r. VII-IX.
- Allium sphaerocephalon* L. All vermell. Ajo de cabeza redonda. Ail à tête ronde. Round-headed leek. PRAT(s),ROC. 1260-1980 m. r. VII-VIII.
- Allium ursinum* L. subsp. *ursinum* All de bruixa. Ajo de oso. Ail des ours. Ransoms. BOSC(h)(br). 1320 m. rrr. VI.
- Allium victorialis* L. All victorial. Ajo victorial. Ail des cerfs. Pyrenean leek. HERB(m). 1600-2200 m. c. VI-VIII.
- Galanthus nivalis* L. Llàgrimes de Sant Josep, lliri de neu. Campanilla de nieve. Perce-neige. Snowdrop. BOSC(r),HERB(m). 1200-1760 m. r. I-V.
- Narcissus moschatus* subsp. *moleri* (Fern. Casas) Aedo [*N. moleroi* Fern. Casas] Narcís de muntanya. -. Jonquille de montagne. -. PRAT. 1430-2500 m. cc. V-VII.
- Narcissus poeticus* L. 1900 m. rrr. EA.

Araceae

- Lemna minor* L. Llentia d'aigua. Lenteja de agua. Petite lentille-d'eau. Common duckweed. AQUA. 1220-1260 m. rr. VI.
- Lemna minuta* Kunth AQUA. 1480 m. rrr. AL/INV.

Asparagaceae

- Anthericum liliago* L. Lliri de Sant bru. Antérico. Anthéricum à fleurs de lis. -. PRAT(r). 1240-2000 m. c. VI-VIII.
- Aphyllanthes monspeliensis* L. Jonça. Junquillo. Aphyllanthe de Montpellier. Blue aphyllanthes. PRAT(r). 1300 m. rrr. IV-VI.
- Brimeura amethystina* (L.) Chouard [*B. amethystina* subsp. *fontqueri* (Pau) O. Bolòs & Vigo] Error.
- Convallaria majalis* L. Muguet. Muguet. Muguet. Lily of the valley. HERB(m). 1600-1700 m. rrr. VI. DEC. EA.
- Dipcadi serotinum* (L.) Medik. subsp. *serotinum* Marcet. Jacinto bastardo. Dipcadi. Dipcadi. PRAT(r),ROC. 1280-1770 m. rr. VI-VII.
- Leopoldia comosa* (L.) Parl. [*Muscari comosum* (L.) Mill.] Calabruixa grossa. Ajipuerro. Muscari à toupet. Feather Hyacinth. RUD(t). 1240 m. rrr. VI.
- Loncomelos pyrenaicum* (L.) J. Holub subsp. *pyrenaicum* [*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *pyrenaicum*] Ornitògal pirinenc. -. Ornithogale des Pyrénées -. PRAT(r),ROC(r). 1780-1900 m. rrr. VII.
- Maianthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt Maiàntem. -. Maïanthème à deux feuilles. -. BOSC,HERB(cl). 1500 m. rrr. VI-VII. PROT. AME/EN. DEC. EA.
- Muscari latifolium* J. Kirk. PRAT(t). 1240 m. rrr. IV. AL/AC.
- Muscari neglectum* Ten. Calabruixa petita. Penitentes. Muscari à grappe. Grape hyacinth. PRAT,RUD. 1200-1780 m. r. V-VI.
- Ornithogalum divergens* Boreau Llet d'ocell. Leche de gallina. Ornithogale en ombelle. Star of bethlehem. RUD,PRAT. 1200-1420 m. r. VI-VII.
- Paradisea liliastrum* (L.) Bertol. Lliri blanc, paradísia. -. Lis des Alpes. -. PRAT(s)(h). 1220-2080 m. r. VI-VIII.
- Polygonatum multiflorum* (L.) All. Segell de ram. -. Sceau-de-Salomon multiflore. Common Solomon's seal. 1380 m. rrr. VI. EA.
- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce Segell de Salomó. Lágrimas de David. Sceau-de-Salomon odorant. Scented Solomon's seal. BOSC,HERB(m). 1240-1980 m. r. VI-VII.

Polygonatum verticillatum (L.) All. Segell verticil·lat. Sello de Salomón verticilado. Sceau-de-Salomon verticillé. Whorled Solomon's seal. BOSC(h),HERB(d). 1430-2100 m. c. VI-VII.
Puschkinia scilloides Adams -. Escila de rayas. -. RUD. 1320 m. rrr. VI. AL/AC. M. Marcer (2019).
Scilla lilio-hyacinthus L. Joliu. -. Scille lis-jacinthe. -. BOSC(br). 1340 m. rrr. VI.
Streptopus amplexifolius (L.) DC. Stréptopus. -. Sceau-de-Salomon nouveau. -. HERB(m). 1960-2080 m. rrr. DEC. EA.

Asphodelaceae

Asphodelus albus Mill. subsp. *subalpinus* Nyman [*A. albus* subsp. *delphinensis* (Gren. & Godr.) Z. Díaz & Valdés; *A. albus* auct., non Mill.]. ERROR. DUBT.LOC. EA.
Asphodelus macrocarpus Parl. subsp. *macrocarpus* [*A. albus* subsp. *villarsii* (Billot) I.B.K. Richardson & Smythies] Albó de muntanya. Asphodèle de villars. -. PRAT,MAT(s). 1500-2050 m. r.
Hemerocallis fulva (L.) L. Assutzena rossa. Lirio de día. Lis rouge. Orange day-lily. ROC(m),PRAT(s). 1240 m. rrr. AL/AC.

Colchicaceae

Colchicum bulbocodium Ker Gawl. [*Bulbocodium vernum* L.] PRAT. 2000 m. rrr.
Colchicum montanum L. [*Merendera montana* (L.) Lange] DUBT/LOC.

Cyperaceae

Carex appropinquata Schumacher. ERROR.
Carex atrata L. subsp. *atrata* Càrex negre. -. Laîche noirâtre. Black alpine sedge. PRAT,AQUA(c),MAT(c), HERB(m). 2040-2300 m. rr. VII.
Carex brachystachys Schrank ERROR.
Carex capillaris L. PRAT(ca),AQUA(m). 1820-2100 m. rrr. VII. EA.
Carex caryophyllea Latourr. Càrex vernal. -. Laîche de printemps. -. PRAT. 1240-2580 m. ccc. V-VII.
Carex curvula All.
 subsp. *curvula* Càrex corbat. -. Laîche courbée. Alpine sedge. PRAT(h). 2200-2780 m. c. VII-VIII.
 subsp. *rosae* Gilomen -. -. Carex courbé à feuilles épaisses. -. PRAT. 2000-2670 m. rr. VII-VIII.
Carex demissa Hornem. [*C. flava* subsp. *oedocarpa* (Andersson) O. Bolòs & Vigo]. LOC.PROP.
Carex depressa Link subsp. *basilaris* (Jord.) Kerguelen PRAT. 2200-2320 m. rrr. VII. EA.
Carex digitata L. Càrex digitat. Càrice digitada. Laîche digitée. Finger sedge. BOSC(h). 1220-1600 m. r. V-VI.
Carex dioica L. ERROR.
Carex distans L. Càrex distant. Càrice distante menor. Laîche à épis distants. Distant sedge. AQUA(j), PRAT(h). 1340-1780 m. rr. V-VI.
Carex disticha Huds. -. -. Laîche distique. Brown sedge. AQUA(j)(m). 1440-1880 m. rr. VII-VIII.
Carex divulsa Stokes [*C. muricata* subsp. *divulsa* (Stokes) Celak] Càrex muricat. Càrice de espiga laxa. Laîche écartée. Grey sedge. RUD(t),PRAT. 1280-1380 m. rr. VI.
Carex echinata Murray Càrex estel·lat. Càrice estrellada. Laîche étoilée. Star sedge. AQUA(m)(j)(si). 1420-2220 m. r. VI-VII.
Carex ericetorum Pollich -. -. Laîche des bruyères. Rare spring sedge. PRAT(h)(ac). 1880-2600 m. cc. VI-VIII.
Carex flacca Schreb. subsp. *flacca* Càrex glauc. -. Laîche glauque. Blue sedge. PRAT(h),AQUA(j)(cr). 1200-2000 m. ccc. V-VI.
Carex flava L. [*C. flava* subsp. *alpina* (Kneuck.) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Càrex groc. Càrice amarillenta. Laîche glauque. Yellow sedge. AQUA(m)(j). 1800-2460 m. c. VI-VIII.
Carex ferruginea Scop. ERROR.
Carex foetida All. LOC.PROP.
Carex frigida All. Càrex frigid. -. Laîche des lieux froids. -. AQUA(m)(f). 1550-2080 m. r. VI-VII.

- Carex hallerana* Asso Càrex d'haller. Càrex hallerià. Cárice de monte. Laîche de Haller. -. PRAT,ROC(s,ca). 1480-1880 m. rr. V-VI.
- Carex hirta* L. Càrex hirsut. Cárice pelosa. Laîche hérissée. Hairy sedge. AQUA(j),RUD(t,h). 1380-1880 m. rr. VI-VII.
- Carex humilis* Leyss. Càrex humil. -. Laiche basse. Dwarf Sedge. PRAT(s),ROC(r). 1600-2000 m. rr. IV-V.
- Carex lepidocarpa* Tausch [*C. flava* subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Lange] -. Cárice amarillenta esférica. Laîche à beaux fruits. -. AQUA(m)(j)(ca),PRAT(h). 1680-1900 m. rr. V-VI.
- Carex leporina* L. [*C. ovalis* Gooden.] Càrex oval. Cárice ovalada. Laîche des lièvres. Oval sedge. PRAT(h),AQUA(m)(f). 1250-2230 m. c. V-VII.
- Carex macrostyla* Lapeyr. ERROR.
- Carex mairei* Coss. & Germ. [*C. mairii* Coss. et Germ.] -. -. Laiche de Maire. AQUA(j)(m). rrr. 1300 m. VI.
- Carex montana* L. PRAT. 1480-2010 m. rrr. VII.
- Carex muricata* L. ERROR.
- Carex myosuroides* Vill. [*Kobresia myosuroides* (Vill.) Fiori] Elina. -. Cobrésia queue-de-souris. Bellardi's Bog-sedge. PRAT(r)(ca). 1860-2780 m. r. VII-VIII.
- Carex nevadensis* Boiss. & Reut. ERROR.
- Carex nigra* (L.) Reichard Càrex fosc. Cárice negra densa. Laîche brune. Black sedge. AQUA(m)(f)(ac). 1480-2400 m. c. VI-VII.
- Carex nuriae* Sen. ERROR.
- Carex oederi* Retz ERROR.
- Carex ornithopoda* Willd. [*C. ornithopoda* subsp. *ornithopododioides* (Hausm.) Nyman] -. -. Carex pied-d'oiseau. Bird's-foot Sedge. PRAT(r)(ca). 1420-2340 m. rr. VI-VII.
- Carex otrubae* Podp. [*C. cuprina* auct., non (Heuff.) A. Kern.] AQUA(j)(h). 1320 m. rrr. VI.
- Carex pairae* F.W. Schultz [*C. muricata* subsp. *pairae* (F.W. Schultz) Celak.; *C. muricata* auct., non L.] Càrex muricat. -. -. -. RUD(t). 1380 m. rrr. VI.
- Carex pallescens* L. -. -. Laîche pâle. Pale sedge. PRAT(h),HERB(m). 1510-1880 m. rr. VII.
- Carex panicea* L. -. Cárice negra laxa. Laîche bleuâtre. -. AQUA(j)(m)(ca). 1700-1900 m. r. VI-VII.
- Carex paniculata* L. subsp. *paniculata* [*C. vaginata* auct. iber., non Tausch] Càrex paniculat. Cárice paniculada. Laîche paniculée. Greater tussock-sedge. AQUA(m)(j)(f)(ca). 1400-1780 m. r. V-VII.
- Carex parviflora* Host [*C. atrata* subsp. *nigra* (Gaudin) Hartm.] -. -. Laiche à petites fleurs. -. AQUA,PRAT(ca). Estatge alpi, rr. 2250-2800 m. VII-VIII.
- Carex praecox* Schreb. DUBT.DET.
- Carex pyrenaica* Wahlenb. Càrex pirinenc. -. Laîche des Pyrénées. Pyrenean sedge. AQUA(c)(si). 2100-2500 m. rr. VII-VIII.
- Carex remota* L. Càrex remot. Cárice remota. Laîche à épis espacés. Remote sedge. BOSC(br),AQUA(j). 1220-1260 m. rr. VI.
- Carex rupestris* All. ROC(ca) 2400 m. rrr. VII. EA.
- Carex sempervirens* Vill. subsp. *pseudotristis* (Domin) Pawl. LOC.PROP.
- Carex sempervirens* Vill. subsp. *sempervirens* LOC.PROP.
- Carex spicata* Huds. [*C. muricata* subsp. *contigua* (Hoppe) Moravec]. LOC.PROP.
- Carex sylvatica* Huds. subsp. *sylvatica* Càrex selvàtic. Cárice de bosque. Laiche des bois. Wood-sedge. BOSC(h). 1380-1500 m. rr. VI.
- Carex umbrosa* Host subsp. *huetiana* (Boiss.) Sóo Càrex ombrós. Cárice umbrosa. Laîche de Huet. Shady sedge. AQUA(m),PRAT(h). 1640- 2600 m. cc. VI-VIII.
- Carex umbrosa* Host subsp. *umbrosa* Càrex ombrós. Cárice umbrosa. Laîche de Huet. Shady sedge. PRAT(h). 1550-1780 m. rrr. VI-VII.
- Carex vaginata* Tausch [*Carex panicea* subsp. *vaginata* (Tausch) Rouy]. DUBT.DET.
- Cyperus eragrostis* Lam. Serrana d'Amèrica. Juncia americana. Souchet robuste. Nutgrass. AQUA(j), HERB(h),RUD(h). 1220-1340 m. r. VIII. AL/INV.
- Cyperus flavescens* L. [*Pycnus flavescens* (L.) Rchb.]. AQUA(j). 1260 m. rrr. VIII.
- Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult. subsp. *palustris* Jonquet. Junco palustre. Souchet des marais. Common spike-rush. AQUA(cr). 1680 m. rrr.
- Eleocharis quinqueflora* (Hartmann) O. Schwarz AQUA(j)(m). 1400-2100 m. rrr.

Eriophorum angustifolium Honck. Cotonera angustifòlia. Algodonera de hoja estrecha. Linaigrette à feuilles étroites. Common cottongrass. AQUA(m). 1450-2000 m. rrr. VI.

Eriophorum latifolium Hoppe ERROR.

Eriophorum vaginatum L. LOC.PROP.

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. [*Scirpus cernuus* Vahl] -. -. Isolépis penché. Low Bulrush. AQUA(j). 1220 m. rrr. VII. EA.

Isolepis setacea (L.) R. Br. [*Scirpus setaceus* L.] -. -. Isolépis sétacé. Bristle Club-rush. AQUA(j). 1375-1525 m. rrr. VII.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják [*Scirpus holoschoenus* L.; *Holoschoenus vulgaris* Link] Jonc boval. Junco. Scirpe-jonc. Round-headed club-rush. AQUA(j). 1200-1550 m. rr. VII.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. [*Eriophorum alpinum* L.], ERROR.

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. [*Scirpus cespitosus* L.] Tricòfor. -. Scirpe cespiteux. Tufted bulrush. AQUA(m)(j)(ac). 2080-2250 m. rrr. VI.

Dioscoreaceae

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin [*Tamus communis* L.] Gatmaimó. Brionia negra. Herbe aux femmes battues. Black bryony. MAT(b),BOSC(h). 1220-1480. rr. V.

Iridaceae

Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. [*C. vernus* var. *neapolitanus* Ker Gawl.; *C. sylvester* Bubani]. ERROR.

Crocus nudiflorus Sm. Safrà bord. Azafrán de montaña. Crocus d'automne. Leafless crocus. PRAT(h). 1500-2230 m. cc. IV-XI.

Crocus vernus (L.) Hill [*C. vernus* subsp. *albiflorus* (Schult.) Ces.] Safrà de muntanya. -. Crocus à fleurs blanches. Purple crocus. PRAT(h). 1400-2300 m. c. III-IV.

Iris germanica L. Lliri blau. -. -. ROC(m). 1300-1450 m. rrr. VI. AL/AC.

Xiphion latifolium Mill. [*Iris latifolia* (Mill.) Voss.] Lliri blau. Lirio de hoja ancha. Iris des Pyrénées. English iris. PRAT. rr. 1600-1900 m. VII-VIII.

Juncaceae

Juncus acutiflorus Hoffm. Jonc acutiflor. Junco de cáliz agudo. Jonc à tépales aigus. Sharp-flowered rush. AQUA(j). 1320-1880 m. VII-VIII.

Juncus alpino-articulatus Chaix subsp. *alpino-articulatus* [*J. alpinus* Vill. subsp. *alpinus*] Jonc alpi. Junco alpino. Jonc alpin. Northern green rush. AQUA(m)(j). 1600-2200 m. c. VII-VIII.

Juncus articulatus L. subsp. *articulatus* Jonc articul. Junco articulado. Jonc articulé. Jointed rush. AQUA(j)(m). 1220-2000 m. cc. VII-VIII.

Juncus balticus Willd. subsp. *pyrenaeus* (Jeanb. & Timb.-Lagr.) P. Fourn. [*J. pyrenaeus* Jeanb. & Timb.-Lagr.] Jonc pirinenc. -. Jonc des Pyrénées. -. AQUA(m). 2080-2200 m. rrr. VII-VIII. PROT. AME/NT. DEC. EA.

Juncus bufonius L. Jonc de galàpet. -. Jonc des crapauds. Toad rush. AQUA(j). 1340 m-2000 m. rr. V.

Juncus bulbosus L. subsp. *bulbosus* AQUA(j),HERB(m). 1400-2000 m. rrr. VII. EA.

Juncus capitatus Weigel PRAT,AQUA(r). 1275 m. rrr. VII. EA.

Juncus conglomeratus L. Jonc conglomerat. Junco aglomerado. Jonc aggloméré. Compact rush. AQUA(j),PRAT(h). 1400-1900 m. c. VII-VIII.

Juncus effusus L. Jonc d'estores. Junco de esteras. Jonc diffus. Soft rush. AQUA(j). 1240-1970 m. ccc. VII-VIII.

Juncus filiformis L. LOC.PROP.

Juncus inflexus L. subsp. *inflexus* Jonquina. Junco glauco. Jonc glauque. Hard rush. AQUA(j),RUD(t). 1200-1820 m. c. VI-VII.

Juncus jacquini L. ERROR.

Juncus tenuis Willd. Jonc tènue. -. -. Slender rush. RUD(t). 1240-1780 m. r. VI-VII. AL/INV.

Juncus triglumis L. subsp. *triglumis* Jonc tribracte. -. Jonc à trois glumes. Three-flowered rush. AQUA(m)(j). 2020 m. rrr. VI. PROT. DEC. EA.

Juncus ×diffusus Hoppe [*J. effusus* × *J. inflexus*] AQUA(j), 1700 m. rrr. NO RETR.

Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. subsp. *alpinopilosa* ERROR.

Luzula campestris (L.) DC. Lúzula campestre. Lúzula de prado. Luzule des champs. Field wood-rush. PRAT,MAT(ac). ccc. 1240-2300 m. V-VII.

Luzula desvauxii Kunth [*L. glabrata* (Hoppe) Desv. subsp. *desvauxii* (Kunth) Buchenau] Lúzula glabra. -. Luzule de Desvaux. -. HERB(m),AQUA(f). 1800-2500 m. c. VI-VII. DEC.

Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC. subsp. *forsteri* ERROR.

Luzula lutea (All.) DC. Lúzula groga. -. Luzule jaune. Yellow wood-rush. PRAT(ac). 2000-2700 m. cc. VI-VIII.

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. *multiflora* PRAT. 1700 m. rrr.

Luzula nivea (L.) DC. Lúzula nívea. -. Luzule blanc de neige. Snowy wood-rush. BOSC,HERB(m) (ac). 1420-1940 m. cc. VI-VII.

Luzula pediformis (Chaix) DC. [*L. nutans* (Vill.) Duval-Jouve] Lúzula nutant. Lúzula colgante. Luzule penchée. -. PRAT(ac). 2000-2650 m. c. VI-VIII.

Luzula spicata (L.) DC. [*L. spicata* subsp. *monsignatica* P. Monts.] Lúzula d'espiga, Lúzula espigada. Lúzula espigada. Luzule d'Espagne. Spiked wood-rush. PRAT(ac). 1980-2680 m. cc. VI-VII.

Luzula sudetica (Willd.) Schult. ERROR.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. *sylvatica* Lúzula selvàtica. -. Grande luzule. Greater wood-rush. BOSC(h),HERB(m). 1480 m. rrr. VI.

Oreojuncus trifidus (L.) Záveská, Drábková & Kirschner [*Juncus trifidus* L.] Herba prima de Rojà, jonc trifid. -. Jonc trifide. Highland rush, three-leaved rush. PRAT(ac). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.

Juncaginaceae

Triglochin palustris L. -. Cinta de agua. Troscart des marais. Marsh arrowgrasses. AQUA(m). 1820 m. rrr. VI. EA.

Liliaceae

Erythronium dens-canis L. Dent de ca. Diente de perro. Dent-de-chien. -. PRAT. 1680-1900 m. rrr. IV.

Fritillaria pyrenaica L. Fritil·lària. -. Fritillaire des pyrénées. -. rrr. NO RETR.(1880).

Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. fil. [*G. fragifera* (Vill.) E. Bayer & G. López; *G. fistulosa* Duby] -. -. Gagée de Liotard. -. rrr. EA.

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. Gàgea groga. -. Gagée jaune. -. 1760 m. rrr. VI. EA.

Lilium candidum L. Lliri de Sant Antoni. Lirio de Sant Antonio. Lis blanc. Madonna lily. RUD,ROC(m). 1240-1300 m. rrr. AL/AC.

Lilium martagon L. Consolta vermella, marcòlic. Martagón. Lis martagon. Martagon lily. BOSC(h),HERB(cl)(v). 1200-2400 m. cc. VII-VIII.

Lilium pyrenaicum Gouan Consolta, consolta groga, marcòlic groc. -. Lis des Pyrénées. Pyrenean lily. PRAT,HERB(m),MAT(bg). 1500-2140 m. r. VI-VII.

Tulipa sylvestris L. subsp. *australis* (Link.) Pamp. Tulipa silvestre. -. Tulipe sauvage méridionale. -. PRAT(r). 1960 m. rrr. VI. EA.

Melanthiaceae

Paris quadrifolia L. Raïm de guineu. Uva de zorra. Parisette à quatre feuilles. Herb Paris. BOSC(h) (per). 1700-1820 m. rr. V-VI.

Veratrum album L. Baladre. -. Véatre blanc. -. BOSC(h),HERB(m)(c),RUD(h). 1200-2300 m. c. VII-VIII.

Nartheciaceae

Narthecium ossifragum (L.) Huds. ERROR.

Orchidaceae

- Anacamptis coriophora** (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [*Orchis coriophora* L. subsp. *fragrans* (Pollini) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase; *O. coriophora* L. subsp. *martinii* (Timb.-Lagr.) Jacquet & Scappat] Abellera olorosa, orquis olorós, orquídia de les xinxes. -. *Orchis punaise*. Bug Orchis. PRAT. 1375-1800 m. rrr. VI-VII.
- Cephalanthera damasonium** (Mill.) Druce Curraiaà groc. -. -. -. PRAT. 1680 m. rrr. VI.
- Cephalanthera longifolia** (L.) Fritsch PRAT. 1230 m. rrr.
- Chamaeorchis alpina** L.C.M. Richard ERROR.
- Coeloglossum viride** (L.) Hartm. Orquis verde. -. *Orchis vert.* -. PRAT(h). 1500-2000 m. r. VI-VII.
- Corallorhiza trifida** Châtel. Orquídia d'arrel de corall. -. Racine-de-corail. - BOSC(h). 1680-1820 m. rrr. VI. PROT. AME/EN. DEC. EA.
- Dactylorhiza fuchsii** (Druce) Soó subsp. *fuchsii* [*Orchis maculata* L. subsp. *meyeri* (Rchb.) O. Bolòs & Vigo] Orquis de Meyer. Orquis manchada común. -. -. PRAT, HERB(v). 1240-1780 m. ccc. VI-VIII.
- Dactylorhiza incarnata** (L.) Soó [*Orchis incarnata* L.]. ERROR.
- Dactylorhiza maculata** (L.) Soó subsp. *maculata* [*Orchis maculata* L.] Orquis maculat. Orquis manchada de turbera. -. -. AQUA(m), PRAT(h). 1420-2200 m. c. VI-VIII.
- Dactylorhiza majalis** (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. *majalis* [*Orchis majalis* Rchb.] Orquis magenc. -. *Dactylorhiza* de mai. -. AQUA(m)(j), PRAT(h). 1440-2100 m. cc. VI-VIII.
- Dactylorhiza sambucina** (L.) Soó [*Orchis sambucina* L.; *O. latifolia* L.] Orquis sambucí. -. -. -. PRAT. 1460-2100 m. r. V-VII.
- Epipactis atrorubens** (Hoffm.) Schultes subsp. *atrorubens* *Epipactis* vermella. *Epipactis* común. *Épipactis* rouge sombre. -. ROC(t). 1200-1800 m. r. VI-VIII.
- Epipactis bugacensis** Robatsch [*E. rhodanensis* Gévaudan & Robatsch] *Epipactis* del Roine. -. *Epipactis* verde. -. BOSC(br), AQUA(m). 1200-1580 m. rr. VI-VIII. DEC. EA.
- Epipactis distans** Arv.-Touv. *Epipactis* de fulles distants. *Epipactis* distante. -. -. HERB(v)(c). 1580-1700 m. VII. DEC. EA.
- Epipactis helleborine** (L.) Crantz *Epipactis* de fulla gran. *Epipactis* mayor. *Épipactis* à larges feuilles. -. BOSC, HERB(v)(c), PRAT. 1240-1750 m. c. VII-VIII.
- var. *minor* (R. Engel) R. Engel. VOR, BOSC. 1340-1700 m. r. VI-VIII. DUBT/TAX.
- Epipactis kleinii** M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera *Epipactis* de Klein. *Epipactis* menor. *Épipactis* à petites fleurs. -. HERB(v)(c). 1340 m. rrr. VII-VIII.
- Epipactis muelleri** Godfery [*E. helleborine* subsp. *muelleri* (Godfery) O. Bolòs, Masalles & Vigo] *Epipactis* de Müller. -. -. -. PRAT. 1380 m. rrr. VII.
- Epipactis phyllanthos** G.E. Sm. [*E. fageticola* (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers] -. *Epipactis* de hayedo. -. -. BOSC(h). 1200-1300 m. rrr. VII-VIII. DEC. EA.
- Epipactis tremolsii** Pau [*E. helleborine* subsp. *tremolsii* (Pau) E. Klein] PRAT, VOR. 1460 m. rrr. VII.
- Goodyera repens** (L.) R. Br. Godiera. Gudiera. Goodyère rampante. -. HERB(v), BOSC(p). 1220-1260 m. rrr. VII. DEC. EA.
- Gymnadenia conopsea** (L.) R. Br. Caputxina olorosa. -. *Gymnadenie* moucheron. -. PRAT. 1230-2100 m. cc. VI-VIII.
- Gymnadenia odoratissima** (L.) Rich. PROT. AME/CR. EX-RE. LOC. PROP. Podria correspondre en tot cas a *Gymnadenia pyrenaica* (Philippe) Giraudias?
- Neotinea ustulata** (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase [*Orchis ustulata* L.] Orquis socarrat. Orquis tostada. *Orchis* brûlé. -. PRAT. 1450-2000 m. c. VI-VII.
- Neottia cordata** (L.) Rich. [*Listera cordata* (L.) R. Br.] *Listera* cordifolia. -. *Listère* à feuilles cordées. -. BOSC(p), MAT(n). 1600 m. rrr. VI-VII. DEC. EA.
- Neottia nidus-avis** (L.) Rich. Magraneta borda. -. *Néottie* nid-d'oiseau. -. BOSC(h). 1240-1800 m. c.
- Neottia ovata** (L.) Bluff & Fingerh. [*Listera ovata* (L.) R. Br.] *Listera* ovada. Hierba de dos hojas. Grande listère. Common twayblade. HERB(v), BOSC, PRAT(h). 1340-1820 m. c. VI-VII.
- Nigritella austriaca** (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez [*Gymnadenia austriaca* (Teppner & E. Klein) P. Delforge subsp. *iberica* (Teppner & E. Klein) L. Sáez & P. Aymerich] *Nigritel·la* d'Àustria. -. -. -. PRAT(h). 1440-2040 m. c. VII-VIII.

Nigritella gabasiana Teppner & Klein [*Gymnadenia gabasiana* (Teppner & E. Klein) Teppner & E. Klein; *N. nigra* (L.) Rchb. subsp. *gabasiana* (Teppner & E. Klein) O. Bolòs, Masalles & Vigo] Nigritel·la de Gabas. Nigritela. -. -. PRAT(h). 1450-2000 m. c. VII-VIII.

Orchis mascula L. Orquis mascle, orquídia mascle. -. Orchis mâle. -. PRAT. 1300-2000 m. c. V-VI.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Platantera de dues fulles. -. -. -. PRAT,HERB(c)(v). 1240-1900 m. c. VI-VII

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Platantera de muntanya. -. -. -. BOSC,PRAT,HERB(c,v). 1400-2100 m. c. V-VIII.

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve subsp. *albida* Orquis blanc. -.-. -. PRAT,HERB(c). 1960-2100 m. rrr. VII-VIII. DEC. EA.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Espirant estival. -. Spiranthe d'été. Summer Lady's-tresses. DUBT.LOC. NO RETR. EA.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Espirant autumnal. -. Spiranthe d'automne. Autumn Lady's-tresses. LOC. PROP.

Poaceae

Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. [*Stipa calamagrostis* (L.) Wahlenb.] Acnàter. -. Calamagrostide argentée. -. ROC(t). 1280-1480 m. rr. VI-VII.

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. var. *pectiniforme* (Roem. & Schult.) H.L. Yang [*Agropyron cristatum* (L.) Gaertn. subsp. *pectinatum* (M. Bieb.) Tzvelev] Agropir pectinat. -. Chiendent pectiné. -. RUD(t). 1240 m. rrr. VI. AL/ESP.

Agrostis canina L. subsp. *canina* Agrostis canina. Agróstide de muntanya. Agrostide canine. -. AQUA(m)(f)(si). 1800-2200 m. rr. VII-VIII.

Agrostis capillaris L. subsp. *capillaris* [*A. tenuis* Sibth.] Agrostis tènue. Agróstide tenue. Agrostide commune. Common bent. PRAT,MAT(ac). 1200-2000 m. ccc. VII-VIII.

Agrostis rupestris All. [*A. rupestris* subsp. *pyrenaica* (Pourr.) Dostal] Agrostis rupestre. -. -. -. AQUA(m)(f)(si). 1940-2770 m. cc. VI-VIII.

Agrostis schraderiana Bech. [*A. agrostiflora* (Beck) Rauschert; *Calamagrostis agrostiflora* G. Beck] HERB(m). 1680-1980 m. rr. VII-VIII.

Agrostis stolonifera L. [*A. alba* auct., non L.] Agrostis estolonífera. Agróstide común. Agrostide blanche. Creeping bentgrass. AQUA(cr),RUD(t)(h). 1220- 2000 m. c. VII-VIII.

Aira caryophyllea L. Nebulosa. -. Canche caryophyllée. -. PRAT(r)(ac). 1410 m. rrr. VI.

Alopecurus arundinaceus Poir. subsp. *arundinaceus* -. -. Vulpin faux-roseau. Creeping Meadow-foxtail. 2650 m. rrr. VIII. EA.

Alopecurus gerardii Vill [*Plantinia tournefortii* Bubani] DUBT. DET.

Alpagrostis alpina (Scop.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester [*Agrostis alpina* Scop.] -. Agróstide alpina. -. -. PRAT(ca). 1920-2500 m. rr. VII-VIII.

Alpagrostis schleicheri (Jord. & Verl.) P.M. Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester [*Agrostis schleicheri* Jord. & Verl.; *A. alpina* subsp. *schleicheri* (Jord. & Verl.) Nyman] -. Agróstide jurásica. -. -. ROC(r)(ca). 1700-2120 m. rr. VII-VIII.

Andropogon distachyos L. LOC.PROP.

Anisantha madritensis (L.) Nevski [*Bromus madritensis* L.] Bromus madrileny. -. Brome de Madrid. Compact brome. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.

Anisantha rigida (Roth) Hyl. [*Bromus rigidus* Roth; *B. diandrus* subsp. *maximus* (Desf.) Soó] RUD,ARV. 1250 m. rrr.VI.

Anisantha sterilis (L.) Nevski [*Bromus sterilis* L.] Margall llarg. Bromo gigante. Brome stérile. -. RUD(t). 1200- 2000 m. cc. VI-VII.

Anisantha tectorum (L.) Nevski [*Bromus tectorum* L.] RUD(t). 1350 m. rrr. V-VII.

Anthoxanthum odoratum L. Gram d'olor. Grama de olor. Flouve odorante. Sweet vernal grass. PRAT(ac). 1200-2100 m. cc.

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl subsp. *elatius* Fromental. Avena descollada. Fromental élevé. Tall oatgrass. PRAT,HERB(v)(r) (h). 1200-1820 m. ccc. VI-VII.

- Avena barbata* Link subsp. *barbata* Civada borda. Avena morisca. Avoine barbue. Slender wild oat. ARV,RUD. 1240 m. rrr. VI.
- Avenella flexuosa* (L.) Drejer [*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.] Pèl de boc, descàmpsia flexuosa. -. Canche flexueuse. -. BOSC,MAT,PRAT (ac). 1260-2400 m. cc. VI-VII.
- Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. subsp. *pubescens* [*Avena pubescens* Hudson; *Helictotrichon pubescens* (Hudson) Pilger] Avenula pubescent. Avénula pelosa. -. -. PRAT(h). 1230-1980 m. c. VI-VII. DEC. EA.
- Bellardiocloa variegata* (Lam.) Kerguélen [*B. violacea* (Bellardi) Chiov.; *Poa violacea* Bellardi] Bel-lardiocloa. -. Pâturin violacé. -. PRAT(ac). 1740-2700 m. cc. VII-VIII.
- Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng [*Dichanthium ischaemum* (L.) Roberty; *Andropogon ischaemum* L.] Albellatge fasciculat. -. Digitale glabre. Wavy hair-grass. PRAT(s). 1200-1490 m. c. VII-IX.
- Brachypodium distachyon* (L.) P. Beauv. Fenàs anual. -. Brachypode à deux épis. -. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
- Brachypodium phoenicoides* (L.) Roem. et Schultes Fenàs de marge. Lastón. Brachypode de Phénicie. False brome. -. PRAT(s),HERB(s). 1220-1720 m. cc. VI-VIII.
- Brachypodium sylvaticum* (Hudson) P Beauv. subsp. *sylvaticum* Fenàs de bosc. Lastón de bosque. Brachypode des bois, Brachypode des forêts. Slender false brome. BOSC(h). 1200-1680 m. ccc. VI-VIII.
- Briza media* L. Belluguets, bellugadís (mitjà). Tembladera mediana. Brize moyenne. Quaking grass. PRAT(h). 1200-2200 m. cc.
- Bromopsis erecta* (Huds.) Fourr. subsp. *erecta* [*Bomus erectus* Huds. subsp. *erectus*] Bromus erecte. Bromo erecto. Brome des prés. Erect brome. PRAT. 1200-1780 m. cc. VI-VII.
- Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub subsp. *inermis* [*Bromus inermis* Leyss. subsp. *inermis*] Bromus inerme. -. Brome inerme. -. RUD. 1240 m. rrr. VII. AL/INV.
- Bromopsis ramosa* (Huds.) Holub [*Bromus ramosus* Huds.] Bromus ramós. Bromo laxo. Brome en grappe. Hairy brome. BOSC,HERB(c)(v). 1240-1450 m. rr. VII.
- Bromus commutatus* Schrad. Bromus pratense. -. Brome variable. Meadow Brome. PRAT,HERB(r). 1280 m. rrr. VI.
- Bromus hordeaceus* L. [*B. mollis* L.] subsp. *hordeaceus* Bromus hordeaci. Bromo suave menor. Brome mou. Soft brome. PRAT(h),RUD. 1220-1700 m. c. VI-VII.
- Bromus racemosus* L. subsp. *racemosus* -. -. Brome en grappe. Smooth brome. PRAT(h). 1240-1260 m. rr. VI.
- Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth -. Calamagróstide arundinácea. Calamagrostide à feuilles de roseau. -. HERB(m),BOSC (ac)(h). 1320-2230 m. r. VII-VIII.
- Calamagrostis villosa* (Chaix) J.F. Gmel. ERROR.
- Catapodium rigidum* (L.) F.T. Hubbard subsp. *rigidum* [*Desmazeria rigida* (L.) Tutin subsp. *rigida*] Escleropoa. Gramilla de puño. Pâturin rigide. Ferngrass. PRAT(s)(r),RUD(t). 1220-1560 m. r. V-VII.
- Ceratocloa cathartica* (Vahl) Herter [*Bromus catharticus* Vahl] Bromus catàrtic. -. Brome cathartique. Grazing brome. RUD(t). 1220-1450 m. c. VI-VIII. AL/INV.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers. Gram. Grama. Chiendent pied-de-poule. Bermuda grass. RUD(t). 1200-1450 m. c. VII-IX.
- Cynosurus cristatus* L. -. Cola de perro fina. Crételle, crételle des prés, crételle à crêtes. Crested dog's-tail. PRAT(h)(t). 1220-1920 m. ccc. VI-VII.
- Cynosurus echinatus* L. Cinosur equinat. Cola de perro común. Crételle épineuse. -. RUD(t),PRAT(r)(s). 1240-1500 m. r. V-VII.
- Dactylis glomerata* L. Dàtil. Dáctilo. Dactyle, dactyle aggloméré, dactyle pelotonné. Cock's-foot. PRAT,HERB(v)(r). 1200-2010 m. ccc. VI-IX.
- Danthonia decumbens* (L.) DC [*Sieglingia decumbens* (L.) Bernh.] Dantònia. Dantonía. Danthonie retombante. Heath grass. PRAT,MAT(ac). 1240-1680 m. cc. VI-VII.
- Deschampsia cespitosa* subsp. *cespitosa* [*D. caespitosa* subsp. *hispanica* Vivant; *D. media* subsp. *hispanica* (Vivant) O. Bolòs, Masalles & Vigo] -. -. Canche moyenne. Tufted hair grass. AQUA(f)(m)(j),PRAT(h). 1370- 2120 m. r.VII-VIII.
- Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [*Panicum sanguinale* L.] Forcadella. Digitaria. Digitale commune. Crabgrass. RUD,ARV. 1220-1560 m. r. VII-IX. AL/ESP.

- Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. Pota de gall. Pata de gallo. Panic des marais. Barnyard millet. ARV,RUD. 1240 m. rrr. VII.
- Eleusine indica* (L.) Gaertn. RUD(t). 1230 m. rrr. X.
- Elymus caninus* (L.) L. [Agropyron caninum (L.) P. Beauv.] Agropir caní. -. Chiendent des chiens. Bearded wheatgrass. HERB(c). 1300-1600 m. r. VI-VII.
- Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens* [Agropyrum repens (L.) P. Beauv.] Xarpolla. Agropiro común. Chiendent rampant. Couch grass. RUD(t),HERB(h). 1240-1320 m. r. VII-VIII.
- Eragrostis barrelieri* Daveau Eragrostis. -. Éragrostide de Barrelier. Love-grass. RUD(t). 1250 m. rrr. VI.
- Eragrostis minor* Host. Eragrostis menuda. -. Éragrostide faux pâturin. Small love-grass. RUD(t). 1240-1450 m. rr. VIII.
- Festuca airoides* Lam. [F. supina Schur] Festuca supina. -. Fétuque fausse canche. -. PRAT. 1920-2900 m. cc. VII-VIII.
- Festuca airoides* subsp. *molineri* (Litard) O. Bolos, Vigo, Masales, & Ninot [F. ovina L. subsp. *molineri* (Litard.) O. Bolos & Vigo; F. ovina var. *molineri* Litardiere; F. niphobia (St.-Yves) Kerguelen] LOC.PROP, DUBT.LOC. EA.
- Festuca alpina* Suter [F. ovina subsp. *alpina* (Suter) Hack.; F. alpina subsp. *riverae* Chas, Kerguelen & Plonka] ROC(ca). 2200-2350 m. rrr. VII.
- Festuca aragonensis* (Willk.) Fuente & Ortúñez [F. indigesta subsp. *aragonensis* (Willk.) Kerguelen; F. ovina var. *aragonensis* (Willk.) O. Bolos & Vigo, F. indigesta var. *aragonensis* Willk.] ERROR.
- Festuca borderei* (Hack.) Hack. [F. ovina subsp. *borderei* Hack.] PRAT(r). 2800 m. rrr. VII.
- Festuca eskia* Ramond ex DC. in Lam. et DC. Gesp. Festuca pirenaica. Fétuque eskia -. PRAT(s). 1700-2700 m. ccc. VII-VIII.
- Festuca gautieri* (Hackel) K. Richter [F. scoparia A. Kerner ex Nyman] Ussona. Festuca erizo. Fétuque de Gautier. -. PRAT(s). 1200-2700 m. ccc. VII-VIII.
- Festuca glacialis* (Miégev. ex Hack.) K. Richter Festuca glacial. -. Fétuque des glaciers. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VIII.
- Festuca halleri* All. [F. ovina subsp. *halleri* (All.) Bonnier & Layens]. LOC.PROP. DUBT.LOC. EA.
- Festuca heterophylla* Lam. subsp. *heterophylla* [F. rubra subsp. *heterophylla* (Lam.) Hack.] Festuca heterofil-la. Festuca atlántica. Fétuque à feuilles variables. -. BOSC(h). 1460-1600 m. rr. VII.
- Festuca indigesta* Boiss. subsp. *indigesta* ERROR.
- Festuca lambinonii* Kerguelen [F. arvernensis subsp. *costei* auct., non F. costei (St.-Yves) Markgr.-Dann; F. hervieri Patzke var. *costei* (St. Yves) Auquier] Festuca arvenica. -. Fétuque de coste. -. PRAT(s)(r),ROC(r)(t). 1450-2000 m. c. VII.
- Festuca liviensis* (Verg.) Markgr.-Dann. [F. ovina subsp. *liviensis* (Verg.) O. Bolos, Masalles & Vigo] Festuca duriúscula. -. -. PRAT(s). 1230-2200 m. cc. VI-VII.
- Festuca marginata* (Hack.) K. Richter subsp. *marginata* [F. timbalii (Hack.) Kerguelen; F. hervieri (St.-Yves) Patzke] PRAT,MAT(s),ROC. 1420-2100 m. c. VII-VIII.
- Festuca nevadensis* (Hack.) Markgr.-Dannenb. (F. rubra subsp. *nevadensis* Hackel) ERROR.
- Festuca nigrescens* Lam. [F. rubra subsp. *commutata* (Gaudin) Markgr.-Dann.; F. microphylla (St.-Yves) Patzke] Festuca rogenca. Festuca oscura. Fétuque noirâtre. -. PRAT(h). 1220-2200 m. cc. VI-VII.
- Festuca rivularis* Boiss. [F. rubra subsp. *rivularis* (Boiss.) O. Bolos, Masalles & Vigo] -. Festuca granadina. -. -. PRAT(h),AQUA(m)(f). 1600-1980 m. rr. VIII.
- Festuca rubra* subsp. *junceae* (Hack.) K. Richt. PRAT(r). 2200-2500 m. rr. VII-VIII.
- Festuca rubra* L. subsp. *rubra*. Pèl de guilla. Festuca rojiza. Fétuque rouge. PRAT(h),AIGUA(m). 1400-2100 m. rr. VII.
- Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin ERROR.
- Festuca varia* Haenke LOC.PROP.
- Festuca yvesii* Sen. et Pau [F. durissima (Hack.) Kerg.; F. duriuscula L. subsp. *durissima* (Hack.) K. Richter; F. ovina L. var. *duriuscula* (L.) Koch subvar. *durissima* Hack.; F. ovina L. subsp. *indigesta* (Boiss.) Hack. var. *durissima* (Hack.) St. Yves] Festuca durissima. -. Fétuque très dure. -. PRAT(s)(c). 1700-2700 m. c. VII.
- Gaudinia fragilis* (L.) P. Beauv. LOC.PROP.
- Glyceria notata* Chevall. [G. plicata (Fr.) Fr.; G. fluitans subsp. *plicata* (Fr.) St.-Lag.] Glicèria. -. Glycérie plissée. Plicate sweet-grass. AQUA(cr). 1220-1810 m. c. VI-VII.

***Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco**

- subsp. ***iberica*** (St.-Yves) Romero Zarco [*Avenula pratensis* subsp. *iberica* (St.-Yves) O. Bolos & Vigo; *A. mirandana* (Sennen) Holub] Avena. -. Avoine ibérique. -. PRAT(s). 1200-1700 m. r. VI-VII.

- subsp. ***pratensis*** [*Avenula pratensis* (L.) Dumort. subsp. *pratensis*; *Avenula pratensis* (L.) Dumort.; *Avenochloa pratensis* (L.) Holub] Avènula pratense. Avénula de prado. Avoine des prés. -. 1240-2100 m. c. VII-VIII.

Helictochloa versicolor* (Vill.) Romero Zarco subsp. *versicolor [*Avenula versicolor* (Vill.) M. Lainz subsp. *versicolor*] Avènula bigarrada. -. Avoine bigarrée. -. PRAT,MAT(c)(ac). 2100-2680 m. r. VII-VIII.

Helictotrichon sedenense* (DC.) Holub subsp. *sedenense [*Avena sedenensis* Clarion ex DC.; *A. montana* Vill.] Avena montana. -. Avoine des montagnes. PRAT(s)(r),ROC(t). 1780-2720 m. cc. V-VII.

***Holcus lanatus* L.** Herba molla. Heno velloso. Houlique laineuse, houque laineuse. Common velvet grass. PRAT(h),HERB(h),AQUA(m)(j). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.

***Holcus mollis* L.** Holcus fi. Heno blanco. Houlique molle. Creeping Soft-grass. BOSC,HERB(v)(ac). 1250-1560 m. rr. VI-VII.

***Hordelymus europaeus* (L.) Harz DUBT.DET.**

Hordeum murinum* L. subsp. *murinum Ordi de Sant Joan. Cebada de ratón. Orge des rats. False barley. RUD(t). 1200-1680 m. cc. VI-VIII.

Koeleria pyramidata* (Lam.) P. Beauv. subsp. *pyramidata [incl. *K. macrantha* (Ledeb.) Schult.; *Koeleria splendens* C. Presl] -. Koeleria ramosa. Koelérie pyramidale. Prairie June grass. PRAT. 1260-2340 m. cc. VI-VIII.

***Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin Gram de gos. Koeleria común. Koelérie du Valais. -. PRAT(r)(s),ROC(r). 1200-2500 m. ccc.**

***Lolium multiflorum* Lam.** [*L. multiflorum* subsp. *italicum* Schinz & R. Keller] Raigràs italià. -. -. ARV,RUD(t). 1240-1280 m. rr. VI

***Lolium perenne* L.** Margall. Ballico. Ivraie vivace. Perennial ryegrass. RUD(t). 1200-2000 m. ccc. VI-VII.

Lolium rigidum* Gaudin subsp. *rigidum Margall dret. Ballico. Ivraie raide. Annual ryegrass. ARV,RUD(t). 1250 m. rr. VI.

***Lolium temulentum* L.** [*L. temulentum* subsp. *arvense* (With.) Tzvelev] ARV. 1460 m. rrr. VII. AL/AC.

Melica ciliata* L. subsp. *ciliata Serrell de muntanya. Mélica pelosa. Mélisque ciliée. -. PRAT(s)(r),ROC(t). 1200-1500 m. rr. VI-VII.

***Melica ciliata* subsp. *magnolii* (Gren. & Godr.) K. Richt. LOC.PROP.**

***Melica uniflora* Retz** Mèlica uniflora. Mélica de bosque. Mélisque à une fleur. Wood melick. BOSC(h). 1320-1510 m. rr. VI-VII.

***Micropyrum tenellum* (L.) Link -. -. Petit nard délicat. -. PRAT,ROC(t)(r)(ac). 1900 m. rrr. VI.**

***Molinia caerulea* (L.) Moench Alba roja. Molinia. Molinie bleue. Purple moor-grass. PRAT,AQUA(m)(j)(h). 1200-2000 m. ccc. VI-IX.**

***Nardus stricta* L.** Pèl caní. Cervuno. Nard raide. Matgrass. PRAT,AQUA(f)(m). 1550-2640 m. cc. VI-VII.

***Oreochloa elegans* Sennen** [*O. blanka* Deyl; *O. disticha* subsp. *blanka* (Deyl) P. Kupfer] Oreòcloa. -. Oréochloa élégant. -. PRAT(r),ROC. 2480-2780 m. rr. VII-VIII.

***Panicum miliaceum* L. subsp. *miliaceum* Mill.** Mijo. Mil d'inde. Common Millet. ARV,RUD. 1250-1290 m- rrr. VIII. AL/ESP.

***Patzkea paniculata* (L.) G.H. Loos**

subsp. ***paniculata*** [*Festuca paniculata* (L.) Schinz et Thell. subsp. *paniculata*; *F. spadicea* L.] Sudorn. Festuca paniculada. Fétuque paniculée. -. PRAT(s). 1600-2400 m. c. VI-VII.

subsp. ***spadicea*** (L.) G.H. Loos [*Festuca paniculata* subsp. *spadicea* (L.) Litard.; *F. consobrina* Timb.-Lagr., *F. paniculata* var. *fallax* (Loret et Barr.) Litard.] Sudorn. -. Fétuque châtain. PRAT(r)(ca). 1475- 1975 m. rrr. VII.

***Phalaris arundinacea* L.** Fàlaris. Garzota de arroyos. Baldingère faux roseau. Reed canary grass. AQUA(b)(h). 1220-1370 m. c. VI-VII.

Phleum alpinum* L. subsp. *alpinum [*P. alpinum* subsp. *commutatum* (Gaudin) K. Richt.; *P. commutatum* Gaud.] Flèum alpi. Fleo alpino. Fléole des Alpes. Alpine cat's-tail. AQUA(m),PRAT(h). 1620-2600 m. c. VI-VIII.

***Phleum rhaeticum* (Humphries) Rauschert** [*P. alpinum* subsp. *rhaeticum* Humphries; *P. alpinum* auct. non L.] ERROR.

***Phleum phleoides* (L.) Karsten** Cua de rata. Fleo alargado. Fléole de Boehmer. Boehmer's cat's-tail. PRAT. 1200-1800 m. c. VI-VIII.

- Phleum pratense* L. [*P. nodosum* L.; *P. bertolonii* DC.; *P. pratense* subsp. *serotinum* (Jord.) Berher] Flèum de prat. Fleo de prado. Fléole des prés, fléole bulbeuse. Timothy. PRAT(h). 1200-1800 m. cc. VI-VIII.
- Poa alpina* L. *Poa alpina*. *Poa alpina*. Pâturin des Alpes. Alpine meadow-grass. PRAT(h). 1300-2600 m. cc. VI-VIII.
- var. *brevifolia* (Gaudin) Godr. [*P. alpina* subsp. *brevifolia* Gaudin] PRAT. 2000-2780 m. rr.
- var. *frigida* (Gaudin) Salis [*Poa frigida* Gaudin] PRAT. 2400 m. rrr. DUBT.DET.
- Poa annua* L. subsp. *annua* Pèl de bou. Espiguilla. Pâturin annuel. Annual bluegrass. RUD. 1200-1670 m. ccc. V-VII.
- Poa bulbosa* L. subsp. *bulbosa*. ERROR.
- Poa cenisia* All. [*P. cenisia* subsp. *sardoa* Schmid; *P. fontqueri* Braun-Blanq.; *P. distichophylla* Gaud.] -. *Poa cenisia*. Pâturin du mont Cenis. -. ROC(t). 2000-2800 m. c. VII-VIII.
- Poa chaixii* Vill. -. *Poa* de montaña. Pâturin de chaix. -. PRAT(ac). 1700-2500 m. r. VII-VIII.
- Poa compressa* L. PRAT(s,a). 1230-1620 m. r. VI-VII.
- Poa glauca* Vahl [*P. nemoralis* L. var. *glauca* (Gaudin) Reichenb. et Reichebn.] ERROR (Vigo 1983). LOC.PROP. (com. pers. Lewin).
- Poa laxa* Haenke subsp. *laxa* *Poa laxa*. -. -. ROC(t)(r)(ac). 2400-2700 m. VII-VIII.
- Poa nemoralis* L. [*P. debilis* Thuill.] Espigueta de bosc. -. Pâturin des bois. Wood bluegrass.
- var. *nemoralis* BOSC(h). 1200-1800. ccc. VI-VII.
- var. *firma* Gaudin. BOSC(h). 1240 m. rrr. VI.
- var. *glauca* (Vahl) Gaudin Reichenb. et Reichebn. F. ROC(r)(m). 1280-2450 m. r. VII-VIII.
- Poa pratensis* L. subsp. *pratensis* [*P. pratensis* var. *angustifolia* (L.) Sm.; *P. angustifolia* L.; *P. pratensis* subsp. *angustifolia* (L.) Dumort.] -. *Poa* de prado. Pâturin des prés. Kentucky bluegrass. PRAT,RUD(t). 1200-2120 m. ccc. V-VIII.
- Poa supina* Schrader [*P. annua* subsp. *varia* Gaudin; *P. annua* subsp. *supina* (Schrader) Link] *Poa supina*. -. -. RUD(t). 1600-2100 m. c. VI-VIII.
- Poa trivialis* L. subsp. *trivialis* -. *Poa* común. Pâturin commun. Rough meadow-grass. PRAT(h),AQUA(j),RUD(h). 1200-2100 m. ccc. VI-VIII.
- ×*Schedololium loliaceum* (Huds.) Holub [*Schedonorus pratensis* × *Lolium perenne*; *Festuca* × *loliacea* Huds.; ×*Festulolium loliaceum* (Huds.) P. Fourn.; *Festulolium* × *ascendens* Asch. & Graebn.] RUD(t). 1250 m. rrr. VII.
- Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumort. subsp. *arundinaceus* [*Festuca arundinacea* Schreb.; *F. elatior* L. subsp. *arundinacea* (Schreb.) Hackel] *Festuca arundinacea*. *Festuca* carrizo. Fétuque faux roseau. -. PRAT(t),RUD(t). 1220-2020 m. ccc. VI-VIII.
- Schedonorus giganteus* (L.) Holub [*Festuca gigantea* (L.) Vill.] *Festuca gigantea*. *Festuca* gigante. Fétuque géante. -. BOSC(r). 1240 m. rrr. VII.
- Schedonorus pratensis* (Huds.) P. Beauv. subsp. *pratensis* [*Festuca pratensis* Huds. subsp. *pratensis*; *F. elatior* subsp. *pratensis* (Huds.) Hack.] *Festuca pratensis*. *Festuca* de prado. Fétuque des prés. -. PRAT(h). 1240-1480 m. c. VI-VII.
- Sesleria caerulea* (L.) Ard. [*S. albicans* Schult.; *S. caerulea* (L.) Ard. subsp. *calcareae* (Celak) Hegi; *S. calcarea* (Pers.) Opiz; *S. varia* (Jacq.) Wettst.] *Sesleria*. -. *Seslérie* bleue. Blue moor grass. PRAT,BOSC(r)(ca). 1250-2200 m. cc. V-VII.
- Setaria viridis* (L.) P. Beauv. Serreig verd. Almorejo. Setaire verte. Green bristle grass. ARV,RUD. 1200- 1980 m. c. VII-IX. AL/ESP.
- Sorghum halepense* (L.) Pers. - Canyota. -. -. RUD(h),PRAT. rr. 1200-1220 m. AL/INV.
- Sporobolus indicus* (L.) R. Br. [*S. poirotii* (Roem. et Schultes) Hitchc.] Cua de rata. Esporobolo. Sporobole tenace. -. RUD(t). 1240-1360 m. rr. VIII-IX. AL/ESP.
- Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. subsp. *flavescens* [*Trisetaria flavescens* (L.) Maire] Fromental petit. Trisetaria dorada. Avoine dorée. Smut grass. PRAT(h). 1230-1810 m. c. VI-VII.
- Vulpia ciliata* Dumort. subsp. *ciliata* -. -. *Vulpie* ciliée. Bearded fescue. PRAT(r). 1240 m. rrr. VI.
- Vulpia myuros* (L.) C.C. Gmel. Cua de guilla, pèl de boc. *Vulpia* fina. *Vulpie* queue-de-rat. Annual fescue.
- subsp. *myuros* [*V. megalura* (Nutt.) Rydb.] PRAT(r). 1240-1360 m. r. VI-VIII. rr.
- subsp. *sciuroides* (Roth) Rouy [incl. *V. bromoides* (L.) Gray; *V. muralis* (Kunth) Nees] PRAT(r). 1220 m. rrr. VI.

Tofieldiaceae

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Tofièdia. -. Tofieldie calyculée. -. AQUA(m)(j). 1530-1980 m. rr. VI-VII.

Typhaceae

Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz. & Thell. Bova borda. Espadaña erizo. Rubanier dressé. Branched Bur-reed. AQUA(cr). 1230 m. rrr.VII.

Typha latifolia L. Balca de fulla ampla. Enea. Massette à larges feuilles. Broad-leaved cat-tail. AQUA(cr). 1230 m. rrr. VI.

AGRAÏMENTS

En Miquel Àngel Marcer ha aportat informació inèdita d'alguns tàxons d'aquesta llista.

BIBLIOGRAFIA

- AYMERICH, P.; TENAS, B. & VIGO, J. 2010. Notes florístiques del Ripollès (Pirineus orientals). *Acta Botanica Barcinonensia*, 2010: 11-26.
- AYMERICH, P. & SÁEZ, LL. 2021. Llista Vermella de la flora vascular de Catalunya. Actualització any 2020. *Monografies de la Institució Catalana d'Història Natural*, 3.
- BOLÒS, O. & J. VIGO 1984-2001. *Flora dels Països Catalans*. Vol. 1-4. Ed. Barcino. Barcelona.
- BOLÒS, O.; VIGO, J.; MASALLES, R.M. & NINOT, J.M. 2005. *Flora Manual dels Països Catalans*. Ed. 3. Edicions 62. Barcelona.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1945. Notes critiques sur la Flore des Pyrénées Orientales. *Com. SIGMA*, 87: 219-236.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1948. La végétation alpine des Pyrénées orientales. *Mon. Estac. Est. Pir. & Inst. Esp. Edaf. Ecol. Fisiol. Veg.* 9. Barcelona.
- BUBANI, P. 1987-1902. *Flora pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta*, I-IV.
- CANALS, J.; GONZÁLEZ-PRAT, F. & HERNÁNDEZ, J. 2016. Orquídies del Ripollès. *Institució Catalana d'Història Natural*.
- CASANOVAS I POCH, L. 1991. Estudi sobre l'estructura i l'ecologia de les molleres pirinenques. *Tesi Doctoral*. Inèdit.
- CADEVALL, J. I COL-LABORADORS, 1913-1937. *Flora de Catalunya*, 6 vols. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
- COSTA, A.C. 1864. *Introducción a la flora de Cataluña*. Imprenta del diario de Barcelona. Barcelona.
- COSTA, A.C. 1877. *Suplemento al Catálogo razonado de plantas fanerógamas de Cataluña*. Imprenta Barcelonesa.
- DEVESA, J.A.; CATALAN, P.; MULLER, J.; CEBOLLA, C. & E. ORTUNEZ 2013. Checklist de *Festuca* L. (*Poaceae*) en la Península Ibérica. *Lagascalia* 33: 183-274.
- FOGGI, B.; PAROLO, G.; SMARDA, P.; COPPI, A.; LASTRUCCI, L.; LAKUSIC, D.; EASTWOOD, R. & ROSSI, G. 2012. Revision of the *Festuca alpina* group (*Festuca* section *Festuca*, *Poaceae*) in Europe. *Bot. J. Linn. Soc.* 170: 618-639.
- FONT, X. 2023. Mòdul Flora i Vegetació. Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya i Universitat de Barcelona. <http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html>
- GAUTIER, G. 1897. *Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées-Orientales*. Publication de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. Perpignan.
- GENALITAT DE CATALUNYA, 2023. RESOLUCIÓ ACC/3929/2023, de 20 de novembre, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, Núm. 9047 - 23.11.2023.
- GUARDIOLA BUFÍ, M. 2019. *Herniaria alpina* (*Caryophyllaceae*) in the Iberian Peninsula. *Anales Jard. Bot. Madrid* 76.
- GUARDIOLA, M.; PETIT, A.; OLIVER, X & SÁEZ, LL. 2009. Distribució i ecologia de *Woodsia alpina* (Bolton) S. F. Gray a Catalunya i als Pirineus. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 2010, 41-48,

- GUARDIOLA, M., ALABAU, M.; OLIVER, X.; CARRERAS, J. & SÁEZ, L. 2018.** Distribució i ecologia d'*Arenaria maschlinii* (Caryophyllaceae) als Pirineus. *Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.* 82: 167–170.
- LEWIN, J.M. 2017.** Contribution à la connaissance des orobanches du département des Pyrénées-Orientales; *Mycologie et Botanique. Bulletin*, 32
- LEWIN, J.M. 2018.** Compléments à la connaissance de la flore des Pyrénées-Orientales (suite 2). *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 33: 46–52.
- LEWIN, J.M. 2020.** Nouvelles contributions à la flore des Pyrénées-Orientales - Observations 2019-2020. *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 35: 39–52.
- LEWIN, J.M. & J. M. TISON 2016.** Redécouverte de *Hieracium compositum* Lapeyr. *Mycol. Bot. Bull. Soc. Mycol. Bot. Catalogne Nord* 31: 59–62.
- MATEO, G. 2005.** Aportaciones al conocimiento del género *Hieracium* L. en España, X. Novedades para el Pirineo Catalán. *Fl. Montiberica* 31: 62–69.
- MATEO, G. 2006A.** Aportaciones al conocimiento del género *Pilosella* en España, VII. *Fl. Montiberica* 32: 51–71.
- MATEO, G. 2006B.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, I. Secciones *Amplexicaulia* y *Lanata*. *Fl. Montiberica* 34: 10–24.
- MATEO, G. 2007A.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, III. Secciones *Oreadea* y *Hieracium*. *Fl. Montiberica* 35: 60–76.
- MATEO, G. 2007B.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, IV. Sect. *Prenanthoidea*, *Glutinosa*, *Barbarta*, *Intybacea*, *Italica* y *Eriophora*. *Fl. Montiberica* 37: 47–62.
- MATEO, G. 2008.** Revisión sintética del género *Hieracium* L. en España, V. Sect. *Cerinthoidea*. *Fl. Montiberica* 38: 25–71.
- MATEO, G. & F. EGIDO 2017A.** Novedades sobre el género *Pilosella* Hill en España, IV. *Fl. Montiberica* 66: 145–153.
- MATEO, G. & F. EJIDO 2017.** Estudio monográfico sobre los géneros *Hieracium* y *Pilosella* en España. Con referencias a Portugal y los Pirineos franceses. *Fl. Montiberica Monogr.* 20: 1–422.
- NÈGRE, R., BAUDIERE, A. & SERVE, L. 1982.** Approche analytique sur les groupements à *Festuca paniculata* est-pyrénéens. *Doc. Phytosoc.* 6: 443–475.
- NÈGRE, R. & SERVE, L. 1979.** Prospection dans les groupements à *Festuca eskia* en Pyrénées Orientales.; *Doc. Phytosoc.*, IV: 731–756.
- OLIVER 2021.** Catàleg d'hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER 2021.** Programa de Seguiment i de Conservació de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER, X. 2021.** Informe sobre l'evolució de la Flora amenaçada de la Garrotxa i del Ripollès, 2020. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 11: 5–68.
- OLIVER 2021.** Catàleg sintètic de flora vascular del municipi de Setcases, 2021. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 10: 133–194.
- OLIVER 2022.** Catàleg sintètic de flora vascular del Ripollès, 2022. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*. <https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/catalegs/>.
- OLIVER, X. 2022.** Evolució dels hàbitats de la Garrotxa i del Ripollès, 2022. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 12: 3–84.
- OLIVER 2013; 2017; 2021.** Llista vermella de la flora vascular del Ripollès, 2013, 2017, 2021. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. Inèdit.
- OLIVER, X. 2020, 202, 2022 i 2023.** Catàleg sintètic de flora vascular de la vall del Catllar, El Ripollès. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 2023. Apatura Iris i delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural.
- OLIVER, X. 2021.** Catàleg sintètic de flora vascular de Setcases. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 10: 133–194.
- OLIVER, X. 2022 i 2023.** Catàleg sintètic de flora vascular de Setcases, el Ripollès. 2022, 2023. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 2023.
- OLIVER, X. 2022.** Catàleg sintètic de flora vascular del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 2022.
- OLIVER 2023.** Catàleg sintètic de flora vascular del municipi de Setcases, 2023. *Catàlegs vius de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*. <https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/catalegs/>.
- SÁEZ, L. 1997.** Atlas pteridològic de Catalunya i Andorra. *Acta Bot. Barcinon.* 44: 39–167.
- SÁEZ, L. 2000.** El complex d'*Asplenium trichomanes* L. (Aspleniaceae) al nord-est de la península Ibèrica. *Orsis* 15: 27–43.

- SÁEZ, L., AYMERICH, P. & C. BLANCHÉ 2010. Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania Editio. Barcelona.
- SÁEZ, L. & MATEO, G. 2016. The genus *Hieracium* (Asteraceae) in Catalonia (northeastern Iberian Peninsula, Spain). *Fl. Montiberica* 65: 88–121.
- SÁEZ, L. & AYMERICH, P. 2021. An annotated Checklist of the Vascular Plants of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula). <https://bibdigital.rjb.csic.es/>.
- SIMETHIS, 2022. https://simethis.eu/src/module_home/login/index.php.
- SUSPLUGAS, J. 1942. Le sol et la végétation dans le haut Vallespir. *Com. SIGMA*, 80.
- TELA BOTANICA, 2021. <https://www.tela-botanica.org/>.
- THOUVENOT, L. 1999. Catalogue des types de stations forestières du Vallespir. Tome 1: Caractères écologiques régionaux et relevés types.; DDAF. Pyrénées-Orientales,
- VAYREDA, E. 1879. Plantas notables por su utilidad o rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 8: 345–462.
- VAYREDA, E. 1880. Plantas notables por su utilidad o rareza que crecen espontáneamente en Cataluña. Segunda parte. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 9: 53–130.
- VAYREDA, E. 1882. Nuevos apuntes para la flora catalana. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 11: 41–151.
- VAYREDA, E. 1902. Plantas de Cataluña. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 30: 491–582.
- VAYREDA, E. 1882. *Catalech de la flora de la Vall de Núria*. Kessinger Publishing.
- VIGO, J. 1979. Consideraciones generales sobre la flora del valle de Ribes. *Collectanea Botanica*, 1979, vol. 11, num. 14, 301–327.
- VIGO, J. 1983. Flora de la vall de Ribes. I. Generalitats. Catàleg florístic. *Acta Bot. Barcinon.* 35: 1–793.
- VIGO, J. & MASALLES, R.M. 1996 El poblament vegetal de la Vall de Ribes Les comunitats vegetals i el paisatge ; Mapa de vegetació 1:50 000. Institut Cartogràfic de Catalunya.